

انجمن پزشکی بریتانیا



راهنمای پزشکی خانواده

دائرة المعارف دارويی خانواده



ترجمه : دکتر رضا محمودی

تألیف : انجمن پزشکی بریتانیا



دایرۃالمعارف

کاروی خانواده

ایران آباد و سربلند
با مصرف کالای ایرانی

آیا می دانید با مصرف یک کالای
فارجی چند کارگر ایرانی بیکار می شوند؟

ما نیز کاغذ ایرانی مصرف می کنیم.

Henry, John

هنری، جان آنتونی. ۱۹۳۶ - م

دانره المعارف دارویی خانواده / مؤلف انجمن پزشکی بریتانیا [تصحیح جان هنری]؛ ترجمه رضا محمودی . -- قم : آینه دانش، ۱۳۸۹ .

ISBN : 978-600-5756-79-1

۳۰۲ ص.

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.

عنوان روی جلد : راهنمای پزشکی خانواده : دانره المعارف دارویی خانواده .

عنوان اصلی : **The British medical Association guide to medicines and drugs, 2001.** کتاب حاضر از مجموعه کتابهای انجمن پزشکی بریتانیا است .

۱. داروها — دستنامه‌ها — به زبان ساده . الف. محمودی ، رضا ، ۱۳۴۹ . مترجم . ب. انجمن پزشکی بریتانیا **British Medical Association** ج. عنوان . د. عنوان : راهنمای پزشکی خانواده : دانره المعارف دارویی خانواده .

۶۱۵/۱

RM ۳۰۱ / ۱۵ / ۵۹۵۲

۱۳۸۵

۱۱۷۳۴ - م ۸۵

کتابخانه ملی ایران

مرکز پژوهش: تهران، اتوبار آهندگ، پ ۵۴

۰ ۲۱-۳۳۴۳۱۴۵۲

۰ ۹۱۲۱۵۳۰۰۷۱

aiedenedanesh@yahoo.com

دایرة المعارف دارویی خانواده

انجمن پزشکی بریتانیا (با تصحیح هنری جان آنتونی)

ترجمه: رضا محمودی

ناشر: آینه دانش

ناشر همکار: فن افزار، علم آفرین، پگاسوس

ناظر چاپ: حمید دهقانی

نوبت چاپ: اول ۱۳۸۹

قیمت: ۳۹۰۰ تومان

شمارگان: ۵۰۰ جلد

لیتوگرافی: صیام قم

چاپخانه: جعفری

شابک: ۱-۷۹۵۶-۵۷۵۶-۰۰۶-۹۷۸ * * *

ISBN: 978-600-5756-79-1

بخش اول

گروههای دارویی

۱۹	مغز و اعصاب
۲۶	قلب و دستگاه گردش خون
۳۳	دستگاه گوارش
۳۹	عضلات، استخوانها و مفاصل
۴۵	آلرژی
۴۷	عفونت‌ها و آلودگی‌های انگلی
۵۶	تغذیه
۶۰	هورمون‌ها و دستگاه غدد درون ریز
۶۹	دستگاه تنفس
۷۳	بدخیمی‌ها و بیماری‌های دستگاه ایمنی
۷۸	دستگاه شنوایی و دستگاه بینایی
۸۲	دستگاه تناسلی و ادراری
۹۱	پوست

بخش دوم

داروهای رایج

۱۰۳	۱. آسیکلولوویر Aciclovir ضد ویروس
۱۰۳	۲. آ - سی - آ . C . A . ضد درد و تب
۱۰۴	۳. استامینوفن Acetaminophen ضد درد و تب
۱۰۴	۴. استامینوفن کدئین Acetaminophen codein ضد درد
۱۰۴	۵. استازولامايد Acetazolamid ادرار آور
۱۰۵	۶. ادلات کلد (سرماخوردگی بزرگسالان) Adult Cold
۱۰۵	۷. استات الومینیم Aluminium Acetate ضد التهاب و خارش
۱۰۵	۸. الومینیم ام . جی Mg Aluminium ضد اسید
۱۰۶	۹. الومینیم ام - جی - اس Mgs Aluminium ضد اسید و ضد نفخ
۱۰۶	۱۰. آلوپورینول Allopurinol ضد نقرس
۱۰۷	۱۱. آپروستادیل Alprostadil ضد ناتوانی جنسی
۱۰۸	۱۲. هیدروکسید الومینیم Alluminium Hydroxide ضد اسید
۱۰۸	۱۳. آماتادین Amantadine ضد ویروس و ضد پارکینسون
۱۰۹	۱۴. آمینو اسید Aminoacid تغذیه داخل وریدی ، ماده کالریزا
۱۰۹	۱۵. آمیلورايد Amiloride ادرار آور ، نگهدارنده پتابسیم
۱۱۰	۱۶. آمی تریپتیلین Amitriptyline ضد افسردگی سه حلقه‌ای
۱۱۱	۱۷. آموکسیسیلین Amoxicillin آنتی بیوتیک

۱۱۲. آمفوتريسين Amphotericin ضد قارچ
۱۱۳. آمپیسيلين Ampicillin آنتی بيوتيك
۱۱۳. آميل نيتريت Amyl Nitrite گشادکننده رگ ها
۱۱۳. آنتى هموروئيد Antihemorroid ضد بواسير
۱۱۴. آنتى هيستامين دكونثسان Antihistamine Decongesant ضد احتقان
۱۱۴. آرتيفيكال تيرز Artifical Tears اشك مصنوعى
۱۱۴. آ - اس - آ كدئين (آسپيرين كدئين) A . S . A Codine ضد درد ، ضد تب ، ضد التهاب
۱۱۴. اسيد اسكوربيك (ويتمين C) Ascorbic Acid از گروه ويتمين های محلول در آب
۱۱۵. آسپيرين Aspirin مسكن غير مخدّر
۱۱۶. آتروپين Atropine آنتى كولييرز يك
۱۱۷. آزاتيوبيرين Azathioprine مهارکنندة دستگاه ايمنى و ضد روماتيسىم
۱۱۷. باكلوفن Baclofen شل کنندة عضلات
۱۱۸. سولفات باريوم Barium Sulfate مادة حاجب دستگاه گوارش
۱۱۹. ب كمپلکس B Complex از ويتمين های گروه ب
۱۱۹. بکلومتاژون Beclomethasone كورتون
۱۲۰. بکلومتاژون دی پروپيونات Beclomethason Dipropionate كورتون استنشاقى
۱۲۰. بلادونا - پى بي pb - Beladona تسکین بخش ، ضد اسپاسم ، آنتى كولييرز يك
۱۲۰. بنزوکائين Benzocain بي حس کنندة موضعى
۱۲۰. بنزوئيل پروكسايد Benzoyl Peroxid ضد آكنه ، ضد عفونت های قارچي پوست
۱۲۱. بتاهيستين Betahistine ضد منيز
۱۲۲. بتامتاژون Betamethasone كورتون
۱۲۳. بيزاكوديل Bisacodyl مسهل محرك روده
۱۲۳. بيسموت ساب سيترات Bismuth Subcitrate ضد زخم معده و روده ، ضد اسهال
۱۲۳. برم هگزين Bromhexine خلط آور
۱۲۴. بروموكريپتين Bromocriptine ضد پاركينسونيزم
۱۲۵. پماد سوختگى Burn ضد سوختگى
۱۲۵. كالامين - دى Calamine - D ضد خارش موضعى
۱۲۵. كلسيم فورت Calcium Forte افزايش دهنده كلسيم خون ، جانشين كلسيم
۱۲۵. گلوكونات كلسيم Calcium Gluconate جانشين كلسيم ، داروى كمکى در تعادل الكتروليت ها
۱۲۶. كلسيم پانتوتونات Calcium Pantothenate مکمل غذائي
۱۲۶. مکمل كلسيم Calcium Supplements افزايش دهنده كلسيم خون
۱۲۶. كاربامازپين Carbamazepine ضد تشنج
۱۲۷. كربى مازول Carbamazepine ضد تشنج
۱۲۸. كاستر اويل (روغن كرچك) Castor Oil مسهل محرك
۱۲۸. سفازولين سديم Cefazolin Sodium آنتى بيوتيك
۱۲۸. سفوتاكسيم سديم Cefatoxime Sodium آنتى بيوتيك

۱۲۹	سفتی زوکسیم سدیم Ceftizoxime Sodium آنتی بیوتیک .۵۴
۱۲۹	سفتریاکسون سدیم Ceftriaxone Sodium آنتی بیوتیک .۵۵
۱۲۹	سفالکسین Cephalexin آنتی بیوتیک .۵۶
۱۳۰	سفالوتین سدیم Cephalothin Sodium آنتی بیوتیک .۵۷
۱۳۰	زغال فعال Charcoal Activated ضد اسهال و نفخ ، پادزه ر .۵۸
۱۳۱	چیلدرن کلد (سرماخوردگی اطفال) Children Cold ضد احتقان و درد و حساسیت .۵۹
۱۳۱	کلرام芬یکل Chloramphenicol آنتی بیوتیک .۶۰
۱۳۲	کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide ضد اضطراب .۶۱
۱۳۳	کلروکین Chloroquine ضد مalaria و روماتیسم .۶۲
۱۳۴	کلرفنامین - کلرفنیرامین Chlorpheniramin / Chlorphenamin آنتی هیستامین .۶۳
۱۳۴	کلرپرومایزین Chlorpromazine ضد استفراغ و ضد جنون .۶۴
۱۳۵	ویتامین D _۲ (Vitamin D _۲) Cholecalciferol ویتامین .۶۵
۱۳۶	کلستیرامین Cholestiramine ضد چربی خون .۶۶
۱۳۶	سایمتیدین Cimetidine ضد زخم معده .۶۷
۱۳۷	سیناریزین Cinarizin ضد استفراغ و آنتی هیستامین .۶۸
۱۳۸	سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin ضد باکتری .۶۹
۱۳۹	سیتالوپرام Citalopram ضد افسردگی .۷۰
۱۳۹	کلماستین فومارات Clemasetine Fumarate ضد آرزوی ، ضد احتقان .۷۱
۱۳۹	کلیدنیوم سی C - Clidinium آرامبخش ، ضد اسپاسم مجاری گوارشی .۷۲
۱۴۰	کلیندامایسین Clindamycin HCL آنتی بیوتیک .۷۳
۱۴۰	کلوبتاژول Clobetasol کورتون موضعی .۷۴
۱۴۱	کلوبوتینول Clobutinol HCL ضد سرفه .۷۵
۱۴۱	کلوفیبرات Clofibrate ضد چربی خون .۷۶
۱۴۱	کلومیفن Clomiphene ضد نازایی .۷۷
۱۴۲	کلومپرامین Clomipramine ضد افسردگی سه حلقه‌ای .۷۸
۱۴۳	کلونازپام Clonazepam ضد تشنج .۷۹
۱۴۴	کلوتریمازول Clotrimazole ضد قارچ .۸۰
۱۴۴	کلوگزاسیلین Cloxacillin آنتی بیوتیک .۸۱
۱۴۵	کو - آموکسی کلاو Co - Amoxiclave Co آنتی بیوتیک .۸۲
۱۴۵	کل تار Coaltar ضد شوره سر ، ضد پسوریاژیس .۸۳
۱۴۵	کلشیسین Colchicine ضد نقرس .۸۴
۱۴۶	کدئین Codeine ضد درد ، ضد اسهال ، ضد سرفه .۸۵
۱۴۷	کلستیرامین Colestyramine ضد چربی خون .۸۶
۱۴۸	کنتراسپتیو ال - دی و اج - دی Contraceptive HD and LD ضد بارداری خوراکی .۸۷
۱۴۸	کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive triphasic ضد بارداری خوراکی چند مرحله‌ای .۸۸
۱۴۸	استروژن کانژوکه Conjugated estrogens هورمون جنسی زنانه .۸۹

۹۰. کوتريموکسازول Co - trimoxazole ضد باکتری ۱۴۹
۹۱. کرومولین سدیم Cromolin Sodium پیشگیری کننده از آسم ۱۵۰
۹۲. سپروهپتادین Cyprohrptadine HCL آنتی هیستامین ، ضد خارش ۱۵۰
۹۳. سیکلیزین Cyclizine HCL آنتی هیستامین ۱۵۱
۹۴. سپروترون استات Cyproterone Acetate ضد آندروژن ۱۵۱
۹۵. سپروترون کامپاند Cyproterone Compound ضد بارداری ، ضد آندروژن ۱۵۱
۹۶. دانازول Danazole مورد استفاده در بیماری های قاعدگی ۱۵۲
۹۷. دفروکسامین مزیلات Deferoxamine Mesylate پادزهر آهن ۱۵۲
۹۸. دسموپرسین Desmopressin مورد استفاده در درمان دیابت بی مزه ۱۵۳
۹۹. دگزامتازون Dexamethasone کورتون ۱۵۴
۱۰۰. دکس کلرفنیرامین Dexchlorpheniramine آنتی هیستامین ، ضد خارش ۱۵۴
۱۰۱. دکسترومتروفان HBr Dextromethorphan ضد سرفه ۱۵۵
۱۰۲. دکسترومتروفان - پی P - Dextromethorphan ضد سرفه و احتقان ۱۵۵
۱۰۳. دکستروز Dextrose جانشین مایعات و تأمین کننده کالری ۱۵۵
۱۰۴. دیازپام Diazepam ضد تشنج و اضطراب ۱۵۶
۱۰۵. دیکلوفاک Diclofenac ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی ۱۵۷
۱۰۶. دی سیکلامین Dicyclomine مورد استفاده در سندروم روده تحریک پذیر ۱۵۷
۱۰۷. دایجستیو Digestive آنزیم گوارشی ۱۵۸
۱۰۸. دیمن هیدرینات Dimenhydrinate آنتی هیستامین ، ضد استفراغ ، ضد سرگیجه ۱۵۸
۱۰۹. دایمیتیکن Dimethicone ضد نفخ ۱۵۹
۱۱۰. دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramin Compound ضد سرفه ۱۵۹
۱۱۱. دیفن هیدرامین HCL Diphenhydramin آنتی هیستامین ، ضد استفراغ ، ضد سرفه ، خواب آور ۱۵۹
۱۱۲. دیفنوكسیلات Diphenoxylate ضد اسهال اوپیوئیدی ۱۶۰
۱۱۳. دی پیریدامول Dipyridamol ضد پلاکت ۱۶۱
۱۱۴. دامپریدون Dompridon ضد استفراغ ۱۶۱
۱۱۵. دانپزیل Donepezil ضد دمانس (زوال عقل) ۱۶۲
۱۱۶. داسولپین Dosulepin ضد افسردگی سه حلقه ای ۱۶۳
۱۱۷. دگزازوسین Doxazosin ضد فشارخون ، گشاد کننده رگ ها ۱۶۳
۱۱۸. دیدروژسترلون Didrogestrone هورمون جنسی زنانه ۱۶۴
۱۱۹. داکسی سیکلین Doxycycline آنتی بیوتیک گروه تتراسیکلین ۱۶۵
۱۲۰. امتین Emetine HCL ضد آمیب ۱۶۵
۱۲۱. انالاپریل Enalapril گشاد کننده عروق ، ضد فشارخون ۱۶۶
۱۲۲. افرین Ephedrine ضد احتقان ، گشاد کننده برونش ها ۱۶۷
۱۲۳. اپی نفرین (آدرنالین) Epinephrine مورد استفاده در احیاء قلبی و شوک آنافیلاکسی ۱۶۸
۱۲۴. ارگوتامین Ergotamine ضد میگرن ۱۶۸
۱۲۵. اریترومایسین Erythromycin آنتی بیوتیک ۱۶۹

۱۲۰. استرادیول Estradiol هورمون جنسی زنانه
۱۲۱. اتینیل استرادیول Ethinyl estradiol هورمون جنسی زنانه و ضد بارداری خوارکی
۱۲۲. اتیدرونات Etidronate مورد استفاده در بیماری‌های استخوانی
۱۲۳. اتوسوكسیماید Ethosuximide ضد تشنج
۱۲۴. اوکالپیتوس Eucalyptus بخور
۱۲۵. اسپکتورانت Expectorant خلط‌آور، ضد سرفه، ضد احتقان بینی
۱۲۶. فاموتیدین Famotidine ضد زخم معده و مهار کننده ترشح اسید معده
۱۲۷. فن فلورامین Fenfeluramine کم کننده اشتها (ضد چاقی)
۱۲۸. فرسوس فومارات (فومارات آهن) Ferrous Fumarate فرآورده آهن
۱۲۹. فرسوسولفات (سولفات آهن) Ferrous Sulfate داروی خونساز، آهن خوارکی
۱۳۰. فیناستراید Finasteride مورد استفاده در بیماری‌های دستگاه ادراری
۱۳۱. فلوئوسینولون Fluocinolone Acetonide کورتون موضعی
۱۳۲. فلوکونازول Fluconazole داروی ضد قارچ
۱۳۳. فلوفنازین Fluphenazine ضد جنون
۱۳۴. فلوکستین Fluoxetine ضد افسردگی
۱۳۵. فلوبنتیکسل Flupentixol ضد جنون
۱۳۶. فلورازپام HCL Flurazepam HCL خواب‌آور
۱۳۷. فلوتیکازون Fluticasone کورتون
۱۳۸. اسید فولیک (Vitamine B₉) Folic Acid از ویتامین‌های گروه B
۱۳۹. فوزینوپریل Fosinopril گشادکننده‌رگ‌ها، ضد فشارخون
۱۴۰. فورزماید Forsemide ضد فشارخون، ادرار‌آور
۱۴۱. فورازولیدون Furazolidone ضد باکتری، ضد تک یاخته
۱۴۲. جم فیبروزیل Gemfibrozil ضد چربی خون
۱۴۳. جنتامایسین Gentamicin آنتی بیوتیک
۱۴۴. گلیبنکلامید Glibenclamid ضد دیابت خوارکی
۱۴۵. گلیکلازید Gliclazide ضد دیابت خوارکی
۱۴۶. گلیسیریل تری نیترات Glyceril Trinitrate ضد آنژین
۱۴۷. گلد سدیم (ملح طلا) Gold Sodium Thiomalate ضد روماتیسم
۱۴۸. گریپ میکچر Gripe Mixture ضد اسپاسم، ضد نفخ
۱۴۹. گریزووفولوین Griseofulvin ضد قارچ
۱۵۰. گایافنزین Guaifensin خلط‌آور
۱۵۱. هالوپریدول Haloperidol ضد جنون
۱۵۲. هماتینیک Hematinic خون‌ساز
۱۵۳. هپارین Heparine ضد انعقاد خون
۱۵۴. هُم‌اتروپین Homatropine HBr گشادکننده مردمک چشم
۱۵۵. هیدروکورتیزون Hydrocortisone کورتون

۱۶۲. هیوسین Hyocine مورد استفاده در تهوع و استفراغ و سندرم روده تحریک‌پذیر ۱۹۱
۱۶۳. پروکسید هیدروژن (آب اکسیژن) Hydrogen Peroxide ضد عفونی کننده موضعی ۱۹۲
۱۶۴. هیدروکینون Hydroquinone بی‌رنگ کننده پوست ۱۹۲
۱۶۵. هیدروکسی کلروکین Hydroxy Chloroquin ضد التهاب ، ضد مالاریا ۱۹۲
۱۶۶. هیدروکسیزین HydroxyZine HCL ضد خارش ، ضد استفراغ ، ضد اضطراب ، آنتی هیستامین ۱۹۳
۱۶۷. آیوبروفن Ibuprofen ضد درد ، ضد التهاب غیر استروئیدی ۱۹۳
۱۶۸. ایمیپرامین Imipramine ضد افسردگی سه حلقه‌ای ۱۹۴
۱۶۹. ایندومتاسین Indomethacine ضد تب ، ضد درد ، ضد التهاب غیر استروئیدی ۱۹۵
۱۷۰. ایندورامین Indoramin ضد فشارخون ، مورد استفاده در احتیاط ادرار ۱۹۵
۱۷۱. اینسولین Insuline ضد دیابت ۱۹۶
۱۷۲. یدوکلر هیدروکسی کین Iodochlorhydroxy Quin ضد آمیب ، ضد قارچ ۱۹۷
۱۷۳. یدوکینول Iodoquinol ضد آمیب ، ضد تک یاخته ۱۹۷
۱۷۴. کمپلکس آیرون دکستران Iron Dextran Complex ضد کم خونی ۱۹۸
۱۷۵. ایزو نیازید Isoniazid ضد سل ۱۹۸
۱۷۶. ایزو سور باید دی نیترات / مونونیترات Isosorbide dinitrate / mononitrate ضد آنژین ۱۹۹
۱۷۷. ایزوترتینوین Isotretinoin ضد آکنه ۲۰۰
۱۷۸. کتوکونازول Ketoconazole ضد قارچ ۲۰۱
۱۷۹. لاکتولوز Lactulose مسهّل ۲۰۲
۱۸۰. لاموتریزین Lamotrigine ضد تشنج ۲۰۲
۱۸۱. لانزپرازول Lansoprazole ضد زخم معده ۲۰۳
۱۸۲. لاما میزول Levamisole ضد کرم ۲۰۴
۱۸۳. لو دوپا Levodopa ضد پارکینسون ۲۰۴
۱۸۴. لو فلوكساسین Levofloxacin ضد باکتری ۲۰۵
۱۸۵. لو نورژسترول Levonorgestrel هورمون جنسی زنانه و ضد بارداری خوراکی ۲۰۶
۱۸۶. لو تیروکسین Levothyroxine هورمون تیروئید ۲۰۶
۱۸۷. لیدوکائین Lidocaine بی‌حس کننده موضعی - مخاطی ۲۰۷
۱۸۸. لیدوکائین Lidocaine HCL ضد آریتمی (بی‌نظمی قلبی) ، بی‌حس کننده موضعی ۲۰۷
۱۸۹. لیندان Lindan ضد جرب ، ضد شیپش ۲۰۷
۱۹۰. لیزینوپریل Lisinopril گشادکننده رگ‌ها ، ضد فشارخون ۲۰۸
۱۹۱. لوفپرامین Lofepramine ضد افسردگی سه حلقه‌ای ۲۰۹
۱۹۲. لوپرامید Lopramide ضد اسهال ۲۰۹
۱۹۳. لوراتادین Loratadine ضد هیستامین ۲۱۰
۱۹۴. لورازپام Lorazepam ضد اضطراب ، آرامبخش ، خواب‌آور ۲۱۱
۱۹۵. لو استاتین Lovastatin ضد چربی خون ۲۱۱
۱۹۶. مافنید استات Mafenid Acetate ضد عفونت ، ضد سوختگی ۲۱۱
۱۹۷. هیدروکسید منیزیم Magnesium Hydroxide مسهّل ، ضد اسید ۲۱۲

۱۹۸	سولفات منیزیم Magnesium Sulfate ضد تشنج
۱۹۹	مالاتیون Malathion ضد انگل‌های پوستی
۲۰۰	مبندازول Mebendazole ضد کرم
۲۰۱	مدروکسی پروژستررون Medroxy Progesterone هورمون جنسی زنانه
۲۰۲	مدروکسی پروژستررون استات Medroxy Progesterone Acetate ضد بارداری و تنظیم قاعدگی
۲۰۳	مفنامیک اسید Mefnamic Acid ضد التهاب غیر استروئیدی
۲۰۴	مفلوکین Mefloquin ضد مalaria
۲۰۵	ملوکسی کام Meloxicam ضد التهاب غیر استروئیدی
۲۰۶	منوتروپین (HMG) Menotropins گنادوتروپین انسانی
۲۰۷	منتول سالیسیلات Menthol Salicylate ضد درد موضعی
۲۰۸	مسالازین Mesalazin ضد التهاب روده
۲۰۹	متفورمین Metformin ضد دیابت خوراکی
۲۱۰	متادون Methadone ضد درد آپیوئیدی
۲۱۱	متیمازول Methimazole ضد تیروئید
۲۱۲	متوکاربامول Methocarbamol شل کننده عضلانی
۲۱۳	متوترکسات Methotrexate ضد روماتیسم ، ضد سرطان ، ضد پسوریازیس
۲۱۴	متوکسالن (سیستمیک) Methoxsalen ضد پسوریازیس
۲۱۵	متوکسالن (موضعی) Methoxsalen ضد پسوریازیس
۲۱۶	متیل سلولز Methylcellulose ملین حجیم کننده مدفع
۲۱۷	متیل دوبا Methyldopa ضد فشارخون
۲۱۸	متیل فنیدات Methyl Phenidate HCL محرک تنفسی و مغزی
۲۱۹	متیل پردنیزولون استات Methyl Prednisolone Acetate ضد التهاب ، گلیکوکورتیکوئید
۲۲۰	متیل سالیسیلات Methyl Salicylate ضد درد موضعی
۲۲۱	متیل تستوسترون Methyltestosterone جایگزین هورمون جنسی مردانه
۲۲۲	متوکلورپرامید Methoclopramide ضد استفراغ
۲۲۳	مترونیدازول Metronidazol ضد باکتری و ضد تک یاخته
۲۲۴	میکونازول Miconazol ضد قارچ
۲۲۵	مینرال اویل Mineral Oil نرم کننده مدفع ، ملین
۲۲۶	مینوسیکلین Minocycline آنتی بیوتیک
۲۲۷	مینوکسیدیل Minoxidil ضد فشارخون ، ضد ریزش مو
۲۲۸	میزوپروستول Misoprostol ضد زخم معده
۲۲۹	مومتازون Mometasone کورتون‌ها
۲۳۰	مونتلوكاست Montelukast ضد آلرژی
۲۳۱	مورفین - دیامورفین Morphine / Diamorphine ضد درد آپیوئیدی
۲۳۲	نفازولین Nafazolin HCL or Nitrate ضد احتقان و آنتی هیستامین
۲۳۳	نفازولین - آنتازولین Nafazolin - Antazoline ضد احتقان و آنتی هیستامین

۲۳۴. نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid آنتی بیوتیک ، ضد عفونت‌های مجاری ادراری ۲۳۳
۲۳۵. نالوکسان HCL آنتاگونیست داروهای مخدر ۲۳۳
۲۳۶. ناندرولون Nandrolone هورمون آنابولیک ۲۳۴
۲۳۷. ناپروکسن Naproxen ضد نقرس ، ضد التهاب غیر استروئیدی ۲۳۴
۲۳۸. نیکلوزامید Niclosamide ضد کرم ۲۳۵
۲۳۹. نیکوراندیل Nicorandil ضد آثرین ۲۳۶
۲۴۰. نیکوتین Nicotine داروی مورد استفاده در ترک سیگار ۲۳۶
۲۴۱. اسید نیکوتینیک (نیاسین) Nicotinic Acid ضد چربی خون ۲۳۷
۲۴۲. نیفیدپین Nifedipine ضد آثرین ، ضد فشارخون ۲۳۷
۲۴۳. نیتروفورانتوئین Nitrofurantion ضد عفونت مجاری ادراری ۲۳۸
۲۴۴. نیتروفورازون Nitrofurazone آنتی بیوتیک موضعی ۲۳۹
۲۴۵. نیتروگلیسرین Nitro Glycerin ضد آثرین صدری ۲۳۹
۲۴۶. نانوکسی نول - ۹۹ - Nonoxynol اسپرم کش ، ضد حاملگی ۲۳۹
۲۴۷. نور اپی‌نفرین Norepinephrine تنگ کننده رگ‌ها ۲۴۰
۲۴۸. نورتریپتیلین Nortriptyline ضد افسردگی سه حلقه‌ای ۲۴۰
۲۴۹. نیستاتین Nystatin ضد قارچ ۲۴۱
۲۵۰. افلوکساسین Ofloxacin آنتی بیوتیک (از دسته کینولون‌ها) ۲۴۱
۲۵۱. تری گلیسرید « أمگا - ۳ مارین » Omega - ۳ Marine Triglyceride چربی‌های اشباع نشده ۲۴۲
۲۵۲. امپرازول Omeprazol ضد زخم معده ۲۴۲
۲۵۳. اوندانسترون Ondansetron ضد استفراغ ۲۴۳
۲۵۴. اورلیستات Orlistat داروی مورد استفاده در درمان چاقی ۲۴۳
۲۵۵. آر - اس (سرم خوارکی) ORS جبران کننده آب و املاح از دست رفته در اسهال حاد ۲۴۴
۲۵۶. اگزازپام Oxazepam ضد اضطراب ، خواب‌آور ، آرامبخش ۲۴۴
۲۵۷. اکسی بوتینین Oxybutynin مورد استفاده در بیماری‌های ادراری ۲۴۵
۲۵۸. اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride ضد اسپاسم ، آنتی کولینرژیک ۲۴۶
۲۵۹. اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline آنتی بیوتیک ۲۴۶
۲۶۰. اکسی توسین Oxytocin مورد استفاده در زایمان ۲۴۶
۲۶۱. پانکراتین Pancreatin آنزیم پانکراس ، هضم کننده ۲۴۷
۲۶۲. پارا آمینو بنزوئیک اسید (PABA) Para Amino Benzoic Acid ضد آفات ۲۴۷
۲۶۳. پاراستامول (استامینوفن) Paracetamol ضد درد غیر اوپیوئیدی ۲۴۷
۲۶۴. پارموماسین Parmomycin Sulfate ضد آمیب ، آنتی بیوتیک ۲۴۸
۲۶۵. پاروکستین Paroxetine ضد افسردگی ۲۴۸
۲۶۶. پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe ضد سرماخوردگی کودکان ۲۴۹
۲۶۷. پنی سیلامین Penicilamine ضد روماتیسم ۲۵۰
۲۶۸. پنی سیلین Penicillin ۶,۳,۳-۳ پنی سیلین طبیعی ، آنتی بیوتیک ۲۵۰
۲۶۹. پنی سیلین جی Penicillin G پنی سیلین طبیعی ، آنتی بیوتیک ۲۵۰

۲۷۰. پنی سیلین جی بنزاتین (پنی سیلین بلند اثر) (Penicillin G Benzathine)
پنی سیلین طبیعی ، آنتی بیوتیک بتا - لاکتام ۲۵۱
۲۷۱. پنی جی پروکائین (Penicillin G Procaine) پنی سیلین طبیعی ، آنتی بیوتیک بتا لاکتام ۲۵۱
۲۷۲. پنی سیلین وی (Penicillin V Potassium) پنی سیلین طبیعی ، آنتی بیوتیک بتا لاکتام ۲۵۲
۲۷۳. پرمترین (Permetrin) ضد انگل های پوستی ۲۷۳
۲۷۴. پرفنازین (Perphenazine) ضد استفراغ ، ضد جنون ۲۵۳
۲۷۵. فنازوپریدین (Phenazopyridine HCL) ضد درد مجرای ادراری ۲۵۳
۲۷۶. فنوباربیتال (Phenobarbital) ضد تشنج ۲۵۳
۲۷۷. فنیل افرين کامپاند (Phenylephrine Compound) ضد احتقان ۲۵۴
۲۷۸. فنیل افرين (مخصوص بینی) (Phenylephrine HCL) تنگ کننده رگ ها ، ضد احتقان ۲۵۴
۲۷۹. فنیل افرين (چشمی) (Phenylephrine) گشاد کننده مردمک ها ، ضد احتقان ۲۵۵
۲۸۰. فنیل پروپانول آمین (Phenyl Propanol Lamine) ضد احتقان ۲۵۵
۲۸۱. فنی توئین (Phenytoin) ضد تشنج ۲۵۶
۲۸۲. پیلوکارپین (Pilocarpine) مورد استفاده در درمان گلوکوم ۲۵۷
۲۸۳. پیرازین (Piperazine Hexahydrate) ضد کرم ۲۵۸
۲۸۴. پیراستام (Piracetam) محرک مغزی ۲۵۸
۲۸۵. پیروکسیکام (Piroxicam) ضد نقرس ، ضد التهاب غیر استروئیدی ۲۵۹
۲۸۶. پیزوتفین (Pizotifen) ضد میگرن ۲۵۹
۲۸۷. پودوفیلین (Podophyllin) داروی پوستی ۲۶۰
۲۸۸. پلی میکسین ب (Polymyxin B) آنتی بیوتیک ۲۶۱
۲۸۹. پوویدون آیودین (Povidone Iodine) ضد عفونی کننده ۲۶۱
۲۹۰. پراواستاتین (Pravastatine) ضد چربی خون ۲۶۲
۲۹۱. پرازوسین (Prazosin) فشارخون ، گشاد کننده عروق ۲۶۲
۲۹۲. پردنیزولون (Prednisolone) کورتون ۲۶۲
۲۹۳. پروکائین آمید (Procainamide HCL) ضد بی نظمی قلبی ۲۶۴
۲۹۴. پروکلرپرازین (Prochlorperazine) ضد جنون و ضد استفراغ ۲۶۴
۲۹۵. پروژسترون (Progesterone) پروژستین (هورمون جنسی زنانه) ۲۶۵
۲۹۶. پرومایزین (Promazine) ضد اضطراب ۲۶۵
۲۹۷. پرومیتازین (Promethazine) ضد استفراغ و ضد هیستامین ۲۶۶
۲۹۸. پروپرانولول (Propranolol) ضد اضطراب ، بتا بلکر ۲۶۷
۲۹۹. پروپیل تیوراسیل (Propylthiouracil) ضد تیروئید ۲۶۸
۳۰۰. سودوافدرين (Pseudoephedrine HCL) آگونیست آلفا و بتا آدرنرژیک ، ضد احتقان ۲۶۸
۳۰۱. پسیلیوم (Psyllium) ملین حجیم کننده مدفوع ۲۶۹
۳۰۲. پیرانتل پاموات (Pyrantel Pamoate) ضد کرم ۲۶۹
۳۰۳. زینک پیریتیون (Pyrithione Zinc) ضد سبوره ۲۶۹
۳۰۴. پیروینیوم پاموات (Pyrvonium Pamoate) ضد کرم ۲۷۰

۳۰۵. کینین Quinine ضد مalaria ، شل کننده عضلانی	۲۷۰
۳۰۶. رالوکسی芬 Raloxifene مورد استفاده در بیماری های استخوانی	۲۷۱
۳۰۷. رانیتیدین Ranitidine ضد زخم معده	۲۷۱
۳۰۸. ریفامپیسین Rifampicin ضد سل	۲۷۲
۳۰۹. رینگر Ringers جانشین مایعات و الکترولیت ها	۲۷۳
۳۱۰. رینگر لاکتات Ringer Lactate جانشین مایعات و الکترولیت ها	۲۷۳
۳۱۱. ریواستیگمین Rivastigmine ضد دمانس (زوال عقل)	۲۷۴
۳۱۲. ساخارین سدیم Saccharin Sodium شیرین کننده مصنوعی	۲۷۴
۳۱۳. سالبوتامول Salbutamol گشاد کننده مجرای هوایی ریه	۲۷۵
۳۱۴. سالمترول Salmeterol گشاد کننده مجرای هوایی ریه	۲۷۶
۳۱۵. سلنیم سولفاید Selenium Sulfide ضد عفونت ، آنتی بیوتیک ، ضد قارچ	۲۷۶
۳۱۶. سیلدنافایل Sildenafil مورد استفاده در ناتوانی جنسی	۲۷۷
۳۱۷. سولفادیازین نقره Silver Sulfadiazine ضد عفونت ، سولفانامید	۲۷۸
۳۱۸. سیم فیبرات Simfibrate پایین آورنده کلسترول سرم (ضد چربی)	۲۷۸
۳۱۹. پماد ساده چشمی Simple Eye Ointment نرم کننده چشم	۲۷۸
۳۲۰. سیمواستاتین Simvastatin پایین آورنده چربی خون	۲۷۸
۳۲۱. کلرید سدیم (نرمال سالین) Sodium Chloride جانشین سدیم و کلر	۲۷۹
۳۲۲. سدیم کروموجلیکات Sodium Cromoglicate ضد آرژی	۲۸۰
۳۲۳. سدیم فلوراید Sodium Fluoride ماده معدنی پیشگیری کننده از فساد دندان	۲۸۱
۳۲۴. والپروات سدیم Sodium Valproate ضد تشنج	۲۸۱
۳۲۵. سوماتروپین Somatropin هورمون ، محرك رشد	۲۸۲
۳۲۶. سوربیتول Sorbitol شیرین کننده ، ملين	۲۸۲
۳۲۷. اسپکتینومایسین Spectinomycin آنتی بیوتیک	۲۸۳
۳۲۸. استرپتوكیناز Streptokinase ضد لخته شدن خون در رگ ها	۲۸۳
۳۲۹. استرپتومایسین Streptomycin Sulfate آنتی بیوتیک ، ضد سل	۲۸۴
۳۳۰. سوکرالفات Sucralfate ضد زخم معده	۲۸۴
۳۳۱. سولفاتامید Sodium Sulfacetamide آنتی بیوتیک چشمی	۲۸۵
۳۳۲. سولفاسالازین Sulfasalazine ضد روماتیسم ، مورد استفاده در بیماری های التهابی روده	۲۸۵
۳۳۳. سولفور Sulfur ضد آکنه ، ضد سبوره ، ضد گال (جرب)	۲۸۶
۳۳۴. سوماتریپتان Sumatriptan ضد میگرن	۲۸۶
۳۳۵. تمپازپام Tempazepam ضد میگرن	۲۸۷
۳۳۶. تربوتالین Terbutaline گشاد کننده مجرای هوایی	۲۸۸
۳۳۷. ترفناذین Terfenadine آنتی هیستامین	۲۸۹
۳۳۸. تستوسترون Testosterone هورمون جنسی مردانه	۲۸۹
۳۳۹. تتراسیکلین Tetracycline آنتی بیوتیک	۲۹۰
۳۴۰. تئوفیلین / آمینوفیلین Theophylline / Aminophylline گشاد کننده مجرای هوایی ریه	۲۹۰

۳۴۱. تیابندازول Thiabendazole ضد کرم ۲۹۱
۳۴۲. تیامین (ویتامین B_۱) Thiamine HCL ویتامین گروه B ۲۹۲
۳۴۳. تیروکسین Thyroxine هورمون های غده تیروئید ۲۹۲
۳۴۴. تیبولن Tibolone هورمون جنسی زنانه ۲۹۳
۳۴۵. تیمالول Timolol بتا بلکر ، مورد استفاده در بیماری گلوکوم (آب سیاه) ۲۹۳
۳۴۶. ترانگرامیک اسید Tranexamic Acid بندآورنده خون ۲۹۴
۳۴۷. ترازودون Trazodone ضد افسردگی ۲۹۴
۳۴۸. ترتینوین Tretinoïn ضد آکنه ، ضد پسوریازیس ۲۹۵
۳۴۹. تریامسینولون استوناید (سیستمیک) Triamcinolone Acetonide ضد التهاب ، مهارکننده دستگاه ۲۹۶
- ایمنی
۳۵۰. تریامسینولون استوناید (موضعی) Triamcinolone Acetonide ضد التهاب ، کورتون موضعی ۲۹۶
۳۵۱. تریامسینولون G . N . N . کورتون ، ضد قارچ و ضد باکتری موضعی ۲۹۶
۳۵۲. تری فلوبرازین Trifluoperazine Dihydrochloride ضد جنون ، آرامبخش ۲۹۷
۳۵۳. تری هگزیفنیدیل Trihexyphenidyl HCL ضد پارکینسون ، ضد اسپاسم ۲۹۷
۳۵۴. تریمتوپریم Trimethoprim ضد باکتری ۲۹۷
۳۵۵. تریپل سولفا Triple Sulfa آنتی بیوتیک ، سولفانامید ۲۹۸
۳۵۶. وانکومایسین Vancomycin ضد عفونت ، آنتی بیوتیک ۲۹۸
۳۵۷. ورآپامیل Verapamil ضد آرثیزین ، ضد فشارخون ، ضد بی نظمی قلب ۲۹۹
۳۵۸. وازوپرسین Vasopressin ضد ادرار ، هورمون هیپوفیز خلفی ۳۰۰
۳۵۹. ویتامین - آ (رتینول) Vitamin A ویتامین محلول در چربی ۳۰۰
۳۶۰. ویتامین آ + د Vitamin A + D ویتامین محلول در چربی ۳۰۰
۳۶۱. ویتامین ب - E Vitamin B_۶ از ویتامین های گروه B ۳۰۱
۳۶۲. ویتامین ب - C Vitamin B_{۱۲} از ویتامین های گروه B ۳۰۲
۳۶۳. ویتامین ای Vitamin E از گروه ویتامین ها ۳۰۲
۳۶۴. ویتامین K (فیتونادیون) Vitamin K_۱ شکل مصنوعی ویتامین K ۳۰۲
۳۶۵. وارفارین Warfarin ضد انعقاد خون ۳۰۲
۳۶۶. زینک اکساید (اکسید روی) Zinc Oxide محافظ و ضد عفونی کننده پوست ۳۰۳
۳۶۷. زینک سولفات (سولفات روی) Zinc Sulfate مکمل غذایی ، ضد عفونی کننده پوست ۳۰۳
۳۶۸. زوپیکلون Zopiclone خواب آور ۳۰۴

تقدیم به

والدین فداکاره که آموزگار اولین درس‌های زندگیم بودند.

مقدمهٔ مترجم

تاریخ تکامل علم طب را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره طب سنتی، دوره طب مدرن و دوره طب پسامدرن. در عصر طب سنتی، دانش پزشکی در انحصار افراد محدودی بود و کسانی که به حرفة طب اشتغال داشتند در رشته‌های دیگری نیز صاحب تبحر بودند. در این دوره بیماری‌های مسری و تغذیه‌ای شیوع بسیار داشتند، توانایی جراحان در درمان بیماری‌ها بسیار محدود بود و مردم نیز آگاهی علمی چندانی از دانش پزشکی نداشتند، گرچه به خود اجازه مداوای همه بیماری‌ها را می‌دادند!

با کشف واکسن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای بیهوشی و نیز پی بردن به علت بسیاری از بیماری‌ها، طب وارد دوره جدیدی شد که عصر پزشکی مدرن نامیده می‌شود. در این دوره بیماری‌های عفونی مهار شدند، بهداشت گسترش یافت و امیدهای زیادی برای درمان بیماری‌هایی مثل سرطان ایجاد شد.

با مشخص شدن محدودیت‌های پزشکی جدید در درمان بسیاری از بیماری‌های مژمن و بروز بیماری‌های جدیدی مثل ایدز، پزشکی جدید برخی روش‌های طب قدیم را مجددأً به رسمیت شناخت و پزشکی مدرن نیز از بسیاری ادعاهای خود عقب نشست که این دوره مشخصاً عصر طب پسامدرن نامیده می‌شود. هم در عصر طب مدرن و هم در دوره پزشکی پسامدرن مجموعه آگاهی‌های عمومی در خصوص دانش طب گسترش حیرت‌آوری یافته است و آموزش مهارت‌ها و آگاهی‌های مرتبط با طب به مردم عادی، جایگاه بر جسته‌ای پیدا کرده است، به نحوی که یکی از ویژگی‌های بر جسته دوره فعلی، اعتقاد به آموزش مسائل علمی در حوزه طب و داروشناسی به مردم عادی است.

البته در خصوص آموزش مسائل علمی مربوط با طب و داروشناسی به مردم عادی، دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه معتقد است این کار سطح تفکر علمی را در مردم بالا می‌برد، انتظارات آنها را از دانش پزشکی تعديل می‌کند، به نشر بیشتر این علم و تصحیح روند درمان کمک می‌کند، دیدگاه غیرعلمی و اسطوره‌ای -

تخیلی آنان را اصلاح می‌کند، اعتماد مردم را به داروها و درمان‌های پزشکی افزایش می‌دهد و التزام آنها را به فرامین بهداشتی و درمانی تقویت می‌کند. گروه دیگر معتقدند آموزش پزشکی و داروشناسی به مردم عادی باعث ایجاد غرور کاذب و حس خودپزشکانگاری در آنان شده، رازآلود بودن حرفه و دانش طب را از بین می‌برد، جرأت و جسارت خوددرمانی را در آنان بالا می‌برد، التزام آنان به فرامین بهداشتی و درمانی را سست می‌کند و از منزلت اطبّاً و طب می‌کاهد. مجموعه تجربیات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم برخی عوارض و پیامدها، دیدگاه اول به صواب نزدیک‌تر است و برکات و فوائد افزایش بصیرت علمی و بالینی مردم عادی بر زیان‌های احتمالی آن می‌چربد.

هدف مترجم این کتاب برداشتن گامی هرچند کوتاه در این راه نو و متعالی است، راهی که در کشور ما هنوز رهروان زیادی ندارد و باید برای پررهو و کردن آن تلاش بسیار کرد.

درباره این کتاب و نحوه استفاده صحیح از مطالب آن:

این کتاب ترجمه و تلخیصی است از کتاب «راهنمای مختصر و فشرده دارو و درمان» که توسط انجمن پزشکی بریتانیا (BMA) به نگارش درآمده است. ترجمه پیش روی شما از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول در دوازده فصل تنظیم شده که هر کدام، یکی از اعضای بدن را توضیح می‌دهند و در انتهای هر مبحث، لیستی از داروهای موجود در بازار ارائه می‌شود و برخی از داروهای مهم این لیست‌ها در بخش دوم شرح مفصل داده شده‌اند و شما می‌توانید با مطالعه این جزئیات به درکی عمیق و علمی از نحوه تأثیر داروها بر بدن دست یابید.

بخش دوم شامل جزئیات داروهای رایج و پرکاربرد مورد استفاده در درمان بیماری‌های مختلف است.

قسمت عمده داروهای بخش دوم کتاب از منبع انگلیسی آن ترجمه شده‌اند و در مورد هر کدام نکات مهمی شامل: گروه دارویی، نیاز دارو به تعویز پزشک، میزان خطر در مصرف اضافی، زمان و دفعات مصرف، زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت

آن در بدن ، موارد منع مصرف و احتیاط ، عوارض ناخواسته ، تداخل‌های دارویی و مصرف آن در شیردهی و بارداری شرح داده شده‌اند . در این دسته از داروها ، شربت ، الگزیر و سایر اشکال سیال دارو تحت عنوان شکل مایع ذکر شده‌اند .

تعداد دیگری از داروها که در لیست متن اصلی نبودند برای تکمیل مطالب کتاب از منابع فارسی از جمله کتب داروهای ژنریک ایران جمع‌آوری و تلخیص شده‌اند که در مورد هر کدام نکات مهمی شامل : نام دارو ، اشکال دارویی موجود در ایران ، مقدار و روش مصرف ، موارد عمده استعمال دارو و عوارض جانبی مهم ، شرح داده شده‌اند . البته مقدار داروی مصرفی بر مبنای نیاز بالغین ذکر شده است . هر دو دسته داروهای فوق براساس حروف الفبا در فهرست واحدی تنظیم شده‌اند و شما با نگاه کردن به عناوین جزئیات ، متوجه می‌شوید که داروها متعلق به متن اصلی هستند یا توسط مترجم به فهرست اضافه شده‌اند .

از خوانندگان این کتاب انتظار می‌رود بعد از مطالعه آن نه آنچنان دچار وسواس و احتیاط شوند که نتوانند اطلاعات موجود آن را مورد استفاده عملی قرار دهند و نه آنچنان دچار غرور و خودپژشک‌بینی شوند که خود را از مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی بی‌نیاز بینند و به خوددرمانی و حتی درمان اطرافیان بپردازنند !

این کتاب نه برای تکمیل دکوراسیون منزل شما است و نه جایگزین آزمایشگاه ، بیمارستان ، مطب و پزشک است بلکه هدف آن تکمیل دانش و اطلاعات شما در خصوص کاری است که در مراکز درمانی توسط پزشکان و پرایپزشکان انجام می‌شود . همچنین این کتاب به شما کمک می‌کند آنچه را که به شما دستور داده‌اند با آگاهی و بصیرت بیشتر و خطای کمتری به کار ببرید . سالم و کامیاب باشید .

بخش اول

گروههای دارویی

۱۹	مغز و اعصاب
۲۶	قلب و دستگاه گردش خون
۳۳	(دستگاه گوارش
۳۹	عفلات، استخوان‌ها و مفاصل
۴۵	آلرژی
۴۷	عفونت‌ها و آلودگی‌های انگلی
۵۶	تغذیه
۶۰	هورمون‌ها و دستگاه غدد درون‌ریز
۶۹	(دستگاه تنفس
۷۳	بدفیمی‌ها و بیماری‌های دستگاه ایمنی
۷۸	(دستگاه شنوایی و دستگاه بینایی
۸۲	(دستگاه تناسلی و ادراری
۹۱	پوست

مخز و اعصاب

بیماری‌های مغز و سیستم عصبی، خود را به صورت ضایعات و عوارض جسمی نشان می‌دهند. علایم جسمی می‌تواند به وسیله بیماری‌های متنوع مغز و دستگاه عصبی ایجاد شود. مرگ سلول‌های عصبی در اثر گردش ناکافی خون در مغز می‌تواند منجر به فلچ اندامها شود. اختلال جریان الکتریسیته در رشته‌های عصبی مغز می‌تواند باعث تشنج شود. تغییرات موقتی گردش خون در مغز و اطراف آن، می‌تواند باعث ایجاد سردردهای میگرنی شود. بیماری پارکینسون در اثر کمبود تولید یک واسطه شیمیایی به نام دوپامین به وسیله سلول‌های تخصص یافته مغز ایجاد می‌شود. اگرچه برای بیماری‌های روانی و عاطفی علتی شناخته نشده ولی نقص در کارکرد سلول‌های عصبی می‌تواند در بروز این بیماری‌ها مؤثر باشد.

داروهایی که در این قسمت شرح داده می‌شود بیماری‌های دستگاه عصبی را از بین نمی‌برند بلکه ارتباط سیگنال‌ها را در سیستم عصبی اصلاح می‌کنند. به همین دلیل، این داروها باعث بهبود علایم بیماری شده یا کارکرد دستگاه عصبی را به حالت عادی بر می‌گردانند.

گروه‌های دارویی عمدۀ در درمان بیماری‌های مغز و دستگاه عصبی عبارتند از :

- داروهای ضددرد
- داروهای خواب‌آور
- داروهای ضداضطراب
- داروهای ضدافسردگی
- داروهای ضدجنون
- داروهای ضدمانیا (بیماری شیدایی)
- داروهای ضدتشنج
- داروهای ضدپارکینسون
- داروهای ضددمانس
- داروهای محرک سیستم عصبی
- داروهای ضدمیگرن
- داروهای ضداستفراغ

داروهای ضددرد

ضددردها داروهایی هستند که باعث تسکین درد می‌شوند اما از آن‌جا که درد یک بیماری نیست، بلکه علامت بیماری است، شفای کامل درد، بستگی به درمان بیماری ایجاد‌کننده درد دارد. در صورتی

که بیماری اصلی قابل درمان نباشد ، ممکن است نیاز به استفاده بلندمدت از داروی ضددرد باشد . برای مثال : ضددرد باعث تسکین دندان درد می شود اما بهبودی اصلی زمانی حاصل می شود که بیماری دندان معالجه شود . ضدالتهاب های غیراستروئیدی مدت زیادی است که برای درمان درد و التهاب استفاده می شوند ، مانند آسپرین . ضددردهای مخدر از مشتقات ماده ای به نام تریاک هستند که از گل خشخاش به دست می آید . این ترکیبات روی چند ناحیه از دستگاه عصبی به طور مستقیم اثر می کنند . بی حس کننده های موضعی جهت جلوگیری از درد ، در جراحی های کوچک استفاده می شوند .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

- اوپیوئیدها شامل : کوکودامول Co-codamol - کوکوداپرین Co-codaprin - کدئین Codeine کودیدرامول Co-dydramol - کوپروکسامول Co-proxamol - مورفین Morphine - دیپی پانون Dipipanone - فنتانیل Fentanyl - میپتازینول Meptazinol - متادون Methadone - پنتازوسین Pentazosin . ترامadol Tramadol - فنازوسین Phenazocine - پتیدین Pethidine - پنتازوکین Pentazocin ضدالتهاب های غیراستروئیدی (NSAIDs) شامل : آسپرین Aspirin - دیکلوفنائک Ibuprofen - اتودولاک Etodolac - فن بوفن Fenbufen - دیکلوفنائک Diclofenac Mefenamic - کتوپروفن Ketoprofen - کتروولاک Ketorolac - مفنامیک اسید Indomethacin - ناپروکسن Naproxen - پیروکسیکام Piroxicam . داروهای دیگر شامل : نفوبام Nefopam - پاراستامول (استامینوفن) Paracetamol

داروهای خواب آور

اشکال در به خواب رفتن یا ادامه خواب علل زیادی دارد . برخی از مردم دچار نگرانی های موقتی یا ناراحتی های ناشی از یک بیماری جزئی می شوند اما بی خوابی مداوم می تواند ناشی از ناراحتی های روانی مانند اضطراب ، افسردگی یا ناراحتی ناشی از بیماری های جسمی باشد . برای رفع بی خوابی های موقتی ، اقداماتی مانند نوشیدن شیر گرم یا دوش گرفتن با آب گرم ، درمان مناسبی هستند . درمان با داروهای خواب آور ، زمانی صورت می گیرد که روش های غیردارویی مانند آنچه که ذکر شد ، شکست خورده باشد .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

بنزودیازوپین ها شامل : لورمتازepam Loprazolam - نیترازepam Nitrazepam . تمازepam Temazepam . باربیتورات ها شامل : آمورباربیتال Amobarbital . مشتقات کلر شامل : کلرال بتائین Chlral Betaine - کلرال هیدرات Chlral Hydrat

- داروهای دیگر شامل: کلرمتیازول **Chlormethiazole** - دیفن هیدرامین **Diphenhydramine** . زولپیدم **Zolpidem**

داروهای ضد اضطراب

مقدار کمی استرس جهت تحریک فرد برای فعالیت‌های عادی روزمره مفید است اما اگر مقدار استرس افزایش یابد حالتی پیش می‌آید که به آن اضطراب می‌گویند. شخص مضطرب به چیزهایی توجه می‌کند یا از چیزهایی می‌ترسد و نگران چیزهایی است که اصلاً واقعیت ندارد. اضطراب زمانی ایجاد می‌شود که تعادل برخی واسطه‌های شیمیایی در مغز به هم بخورد. اگر بخواهیم اضطراب را به طور اساسی درمان کنیم باید به درمان بیماری اصلی منتهی به اضطراب پردازیم.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- بنزو دیازپین‌ها شامل: کلر دیازپوکساید **Chlordiazepoxide** - دیازepam **Diazepam** - لورا زepam **Lorazepam**

- . بتا بلوکرهای شامل: آتنولول **Atenolol** - اوکسپرنولول **Oxprenolol** - پروپرانولول **Propranolol** . پرومazine **Promazine** - بو سپیرون **Buspirone**

داروهای ضد افسردگی

حزن و اندوه و دلگیر شدن که گاه اتفاق می‌افتد طبیعی است و به سرعت رفع می‌گردد ولی افسردگی شدید، می‌تواند از اتفاقات مختلف زندگی مانند: از دست دادن عزیزان، بیماری‌های مختلف و گاه بدون علت خاص ایجاد شود. در بیماران افسرده، تولید برخی واسطه‌های شیمیایی کاهش می‌یابد که مصرف داروهای ضد افسردگی، سطح این مواد را در مغز به حالت عادی بر می‌گرداند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای TCAs شامل: آمی‌تریپتیلین **Amitriptyline** - آموکساین **Amitriptyline** - کلومپرامین **Clomipramine** - داسولپین **Dosulepin** - دوکسپین **Doxepine** - ایمی‌پرامین **Imipramine** - لوفپرامین **Lofepramine** - نورتریپتیلین **Nortriptyline** - پروتریپتیلین **Protriptyline** - تریمیپرامین **Trimipramine**

- مهارکننده‌های بازجذب انتخابی سروتونین SSRIs شامل: سیتالوپرام **Citalopram** - فلوکستین **Fluoxetine** - فلوكسامین **Fluvoxamine** - پاروکستین **Paroxetine** - سرتالین **Sertraline**

- مهارکننده‌های آنزیم مونو‌آمین‌اکسیداز MAOIs شامل: ایزوکربوکسازید **Isocarboxazid** - موكلوبمايد **Moclobemide** - فنلزین **Phenelzine**

داروهای دیگر شامل: فلوبنتیکسل Flupentixol - مaprotoتیلین Maprotiline - میانسرین Mianserin - Reboxetine - میرتازپین Mirtazepine - نفازودون Nefazodone - ربوکستین Robeksitin - ترازوودون Trazodone - ونلافاکسین Venlafaxine - ویلوکسازین Viloxazine.

داروهای ضدجنون

واژه سایکوز (جنون) برای توصیف مجموعه‌ای از بیماری‌های روانی که باعث مختل شدن تفکر منطقی، رفتار عاقلانه و درک واقعیات می‌شود به کار می‌رود. این بیماری‌ها شامل: اسکیزوفرنی، بیماری دوقطبی (مانیک - دپرسن) و پارانویا می‌باشند. اگرچه علت دقیق این بیماری‌ها مشخص نیست اما استرس، وراثت و ضایعات مغزی در ایجاد آن‌ها دخیل هستند. گاهی نیز جنون گذرا در افراد استفاده کننده از داروهای روان‌گردان و نیز کسانی که مصرف الکل را به طور ناگهانی قطع کرده‌اند دیده می‌شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- Fluphenazine - کلرپرومازین Chlorpromazine - فلوفنازین Flufenazine
- Pipotiazine - پرفنازین Perphenazine - متواتریمپرازین Methotriimeprazine
- تیوریدازین Thioridazine - تریفلوپرازین Trifluoperazine
- . بوتیروفون‌ها شامل: بنپریدول Benperidol - دروپریدول Droperidol - هالوپریدول Haloperidol
- داروهای دیگر شامل: آمیسولپراید / سولپیراید Amisulpride / Sulpiride - کلوزاپین Clozapine - فلوبنتیکسل Flupentixol - اولانزاپین Olanzapine - اکسیپرتین Oxpertine
- پریسیازین Pericyazine - پیموزاید Pimozide - کوتیاپین Quetiapine - ریسپریدون Risperidone
- . زوتپین Zotepine - زوکلوبنتیکسل Risperidone

داروهای ضدهافیا

تغییرات خلق تا حدی طبیعی است اما وقتی تغییرات خلقی شکلی غیرعادی به خود گرفت و با تغییرات متناوبی بین دو حالت سرخوشی بیش از حد و افسردگی توأم شد، ایجاد نوعی بیماری شده که مانیک دپرسن نامیده می‌شود. این بیماری به وسیله املاح لیتیم درمان می‌شود.

داروهای شایع این گروه عبارتند از:

. Carbamazepine - کاربامازپین Lithium - لیتیم

داروهای ضدتشنج

پیام‌های الکتریکی در مغز به خوبی هماهنگ شده و باعث حرکت طبیعی دست‌ها و پاها می‌شوند. این پیام‌ها می‌توانند نامنظم و آشفته شوند و منجر به حرکت‌های بیمارگونه اندام‌ها و تغییرات روانی

شوند که به عنوان تشنج شناخته می‌شوند. شایع‌ترین علت تشنج عود کننده، بیماری صرع می‌باشد که اغلب معلول بیماری‌ها یا ضایعات مغزی می‌باشد. تشنج در اثر مسمومیت با برخی داروها ایجاد می‌شود. در کودکان زیر ۷ سال، تب بالا باعث بروز تشنج می‌شود. داروهای ضدتشنج برای پیش‌گیری از حمله‌های صریعی به کار می‌روند و نیز تشنج را متوقف می‌کنند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

کاربامازپین Carbamazepine - کلوبازام Clobazam - کلومتیازول Clomethiazole - کلونازیام Clonazepam - دیازپام Diazepam - اتوسوکسیماید Ethosuximide - گاباپنتین Gabapentin - لاموتریزین Lamotrigine - لورازپام Lorazepam - فنوباربیتال Phenobarbital - فنی‌توئین Sodium Valproate - پریاستام Primidone - والپروات سدیم Phenytoin - پیراستام Piracetam - توپیرامات Topiramate - ویگاباترین Vigabatrin - تیاگاین Tiagabine

داروهای ضدپارکینسون

پارکینسونیزم یک واژه کلی است و به حالتی که در آن مجموعه علایم لرز سر و اندام‌ها، سفتی ماهیچه، چهره بی‌حالت و بی‌احساس و ناتوانی در شروع یا کنترل حرکات وجود دارد اطلاق می‌شود. پارکینسونیزم علل متنوعی دارد اما شایع‌ترین علت آن بیماری پارکینسون است که در اثر آن سلول‌های سازنده ماده‌ای به نام دوپامین در مغز، آسیب می‌یابند. عوارض داروهای ضدجنون و نیز باریک شدن رگ‌های خونی داخل مغز، از دیگر علل پارکینسونیزم هستند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- داروهای آنتی‌کولینرژیک شامل: بنزهگزول Benzhexole - بنزتروپین Benztrapine باپریدین Biperidine - اورفنادرین Orphenadrine - پروسیکلیدین Procyclidine - آماتادین Amantadine - دوپامین Dopamine - اپومورفین Apomorphine - برومومکریپتین Bromocriptine - کابرگولین Cabergoline - لودوپا Levodopa - لیزوراید Lisuride - سلژیلین Selegiline - روپینیرول Ropinirole - پرامیپکسل Pramipexol

داروهای ضددهافس (زوال عقل)

دمانس کاهش پیش رونده کارکرد مغز بوده و شدت آن به حدی است که فعالیت‌های عادی، شغلی و اجتماعی فرد مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دمانس ممکن است ناشی از کاهش گردش خون مغز یا بیماری مالتیپل اسکلروز یا ام‌اس باشد. مهم‌ترین علت دمانس، بیماری آلزایمر است.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

دانپزیل Donepezil - ریواستیگمین Rivastigmine

داروهای هرک دستگاه عصبی

وضعیت هوشیاری شخص در طول روز تغییر می‌کند و این تغییرات تحت کنترل واسطه‌های شیمیایی موجود در مغز به ۲ گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول اثری مهارکننده و کاهنده روی هوشیاری دارند و گروه دیگر اثر محرک و افزاینده‌ای روی هوشیاری دارند و باعث افزایش بیداری می‌شوند. وضعیت خاصی وجود دارد که در آن شخص تمایل غیرعادی و شدید به خواب دارد که نارکولپسی نامیده می‌شود.

در شخص مبتلا به این وضعیت از داروهای محرک استفاده می‌شود. شایع‌ترین فراورده خانگی افزاینده هوشیاری، کافئین است که در قهوه و چای یافت می‌شود. باید توجه داشت که مصرف این داروها در افراد دارای مشکلات روانی مضر است.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

محرك‌های دستگاه تنفس شامل: دگزابرام Doxapram - تئوفیلین / آمینوفیلین / Aminophylline

. داروهای دیگر شامل: کافئین Caffeine - متیل فنیدات Methylphenidate - مدافینیل Modafinil

داروهای ضدمیگرن

میگرن واژه‌ای است برای توصیف نوعی سردرد شدید که عودکننده بوده و یک طرف سر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری در اثر تغییرات در عروق مغز و اطراف سر اتفاق می‌افتد و ممکن است با تهوع و استفراغ توأم باشد. میگرن با عالیم هشدار دهنده‌ای مانند احساس یک نور خیره کننده، حالت کرختی، احساس سوزش در بازو و اختلال در تکلم همراه است. اگرچه علت میگرن ناشناخته است اما عواملی چون ورزش، فعالیت سنگین فیزیکی، ضربه به سر، غذاها یا داروهای خاص، استرس، شوک، فشار روحی و علل ارثی می‌توانند باعث شروع یک حمله میگرنی شوند. این داروهای علت اصلی را برطرف نمی‌کنند. میگرن می‌تواند خود به خود بهبود یابد و در بسیاری از افراد نیز با یک مسكن رفع می‌شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

داروهای پیش‌گیری‌کننده از وقوع میگرن شامل: آمی‌تریپتیلین Amitriptyline - کلونیدین Clonidine - سیپروهپتادین Cyproheptadine - متی‌سرجید Methysergide - پیزووتیفن Pizotifen

بروپرانولول Propranolol - وراپامیل Verapamil - نیفیدیپین Nifdipine

- اگونیست‌های HT₁ شامل: ناراتریپتان Naratriptan - ریزاتریپتان Rizatriptan

. سوماتریپتان Sumatriptan - زولمی‌تریپتان Zolmitriptan

داروهای ضد استفراغ

ضد استفراغ‌ها برای پیش‌گیری از تهوع و استفراغ یا درمان آن‌ها به کار می‌روند. استفراغ واکنش بدن به مواد مضر جهت خارج کردن آن‌ها از دستگاه گوارش است. استفراغ می‌تواند علامت برخی از بیماری‌ها باشد. تهوع و استفراغ می‌تواند در اثر مسافرت، عفونت مجاری گوارشی، بارداری و سرگیجه ایجاد شود یا جزء آثار جانبی شیمی‌درمانی، رادیوتراپی و نیز داروهای بیهودگی باشد. داروهای ضد استفراغ باید بیش از چند روز مصرف شوند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- داروهای آنتی‌هیستامین شامل: سیناریزین Cinarizine - سیکلیزین Cyclizine - دیمن هیدرینات Dimenhydrinate - مکلوزین Meclozine - پرومتاژین Promethazine
- فنوتیازین‌ها شامل: کلرپروممازین Chlorpromazine - پرفنازین Perphenazine - پروکلرپرازین Prochlorperazine
- آنتاگونوسترهای ۳HT5 شامل: گرانیسترون Granisetrone - اوندانسترون Ondansetron - تروپیسترون Tropisetron
- بوتیروفنون‌ها شامل: هالوپریدول Haloperidol
- داروهای دیگر شامل: بتا‌هیستین Betahistine - دامپریدون Domperidone - هیوسین هیدروبروماید Nabilone - متوكلوپرامید Metoclopramide - نابیلون Hyoscine Hydrobromide

قلب و دستگاه گردش خون

خون ، اکسیژن ، مواد غذایی و گرما را در داخل بدن منتقل می کند همچنین مواد زائد بدن جهت دفع در کلیه‌ها ، داروها و پیام‌های شیمیایی توسط خون منتقل می‌شوند . خون موجود در سیاهرگ‌ها توسط قلب به ریه‌ها پمپ شده و بعد از اکسیژن‌گیری در ریه‌ها به وسیله قلب به اندام‌های مختلف بدن مثل مغز و دستگاه گوارش پمپ می‌شود . عواملی مانند ضعف پمپ قلب ، افزایش خیلی زیاد ضربان قلب و بی‌نظمی ضربان قلب می‌توانند باعث گردش ناکافی خون در بدن شوند . رسوب چربی در دیواره رگ‌ها باعث انسداد و تنگی آن‌ها می‌شود .

تنگ شدن رگ‌ها ، منجر به کاهش خون در مغز ، اندام‌ها و عضله‌های قلبی می‌شود . باریک شدن رگ‌های قلبی باعث آنژین صدری شده و در چنین شرایطی اگر لخته خونی در رگ‌ها به وجود آید ، ممکن است باعث انسداد عروق دیواره عضلانی قلب شود .

از آنجا که مبتلایان به بیماری‌های قلبی بیش از یک مشکل دارند ، بیش از یک دارو در درمان آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد .

گروه‌های دارویی عمدۀ در درمان بیماری‌های قلب و عروق عبارتند از :

- داروهای دیجیتالی
- بتابلوکرها
- گشادکننده‌های رگ‌ها
- دیورتیک‌ها
- داروهای ضدآریتمی
- داروهای ضدآنژین
- داروهای ضدفسارخون
- داروهای پایین‌آورنده چربی خون
- داروهای مؤثر بر فرآیند لخته شدن خون

داروهای دیجیتالی

ترکیبات دیجیتالی ، ترکیباتی هستند که از برگ‌های گیاهان خانواده انگشتان‌های به دست می‌آید و در درمان بیماری‌های قلبی به کار می‌روند . این داروها ، بیماری‌های قلبی را درمان نمی‌کنند بلکه فعالیت پمپ قلب را اصلاح کرده و منجر به از بین رفتن علایم ناشی از ضعف کارکرد قلب می‌شوند . مصرف

ترکیبات دیجیتالی ، باعث بهبود علایم نارسایی قلبی مانند خستگی ، تنگی نفس و ورم پا می‌شوند ؛ همچنین این ترکیبات ظرفیت فعالیت فیزیکی را در شخص مبتلا به نارسایی قلبی افزایش می‌دهند . این داروها آثار سمی دارند . افزایش سطح این داروها در خون باعث بروز علایم مسمومیت با داروهای دیجیتالی می‌شود . دیگوکسین و دیجیتوکسین از مهم‌ترین ترکیبات دیجیتالی به شمار می‌روند .

داروهای متداول این گروه عبارتند از :

. **Digitoxin** – دیگوکسین

بتابلوکرها

داروهایی هستند که انتقال تحریکات از راه گیرنده‌های بتا را در بدن مهار می‌کنند ؛ گیرنده‌های بتا به دو نوع بتا یک « B_1 » و بتا دو « B_2 » تقسیم می‌شوند . گیرنده‌های بتا یک « B_1 » در عضله‌های قلبی و گیرنده‌های بتا دو « B_2 » در مجاری هوایی و رگ‌های خونی یافت می‌شوند . بتابلوکرها برای درمان آنژین صدری ، فشارخون بالا ، بی‌نظمی ضربان قلب بعد از حمله قلبی برای جلوگیری از ضربان غیرطبیعی قلب یا جلوگیری از ضایعات بیشتر عضله‌های قلبی ، اصلاح کارکرد قلب در بیماری عضلات قلب ، جلوگیری از سردد میگرنی ، کاهش علایم فیزیکی اضطراب ، کنترل علایم پرکاری تیروئید و به صورت قطره چشمی برای کاهش فشار چشم در بیماری (گلوکوم) به کار می‌روند . مهم‌ترین خطر در مصرف بتابلوکرها ، تشدید اختلالات تنفسی ناشی از برونشیت ، آسم و سایر بیماری‌های تنفسی است .

داروهای متداول این گروه عبارتند از :

داروهای انتخابی قلب شامل : آتنولول **Atenolol** – بتاکسولول

. **Bisoprolol** – سلیپرولول **Celiprolol** – متیپرولول

داروهای غیر انتخابی قلب شامل : اسبوتولول **Acebutolol** ، کارودیلول **Carvedilol** – لابتالول

– نادولول **Nadolol** – پنیدولول **Pindolol** – پروپرانولول **Propranolol** – سوتالول **Labetalol** . **Timolol** – تیمولول

داروهای گشادکننده رگ‌ها

این داروها باعث گشادترشدن رگ‌ها می‌شوند و مورد استفاده عمده آن‌ها زمانی است که تنگ شدن رگ‌ها باعث کاهش گردش خون در جایی مثل عضلات قلب و کاهش اکسیژن‌رسانی شود . همچنین از گشادکننده‌های عروقی برای کاهش فشارخون و درمان آنژین استفاده می‌شود . خطر عمده گشادکننده‌های عروق ، کاهش زیاد فشارخون است . این امر می‌تواند باعث سرگیجه هنگام ایستادن ، به خصوص در افرادی که دچار بی‌ثباتی فشارخون هستند ، شود .

داروهای متداول این گروه عبارتند از :

معارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین شامل : کاپتوپریل Captopril - سیلازابریل Lisinopril - انالاپریل Enalapril - فوزیناپریل Fosinopril - لیزیناپریل Cilazapril - موکسیپریل Moexipril - پرینداپریل Perindopril - کیناپریل Quinapril - رامیپریل Ramipril . ترندالاپریل Trandolapril

بازکننده کانال پتابسیم شامل : نیکوراندیل Nicorandil .

آلگابلوکرها شامل : دگزازوسین Doxazosin - ایندورامین Indoramin - پرازووسین Trazosin .

مسدوکننده‌های کانال کلسیم شامل : آملودیپین Amlodipine - دیلتیازم Diltiazem - فلودیپین Lercanidipine - ایسرادیپین Isradipine - لاسیدیپین Lacidipine - لرکانی‌دیپین Felodipin . نیکاردیپین Nicardipine - نیفیدیپین Nifedipine - وراپامیل Verapamil .

بلوک‌کننده‌های آنژیوتانسین دو شامل : کاندسارتان Candesartan - ایربسارتان Irbesartan - ولسارتان Losartan - والسارتان Valsartan .

نیترات‌ها شامل : گلیسریل تری‌نیترات Glyceryltrinitrate - ایزوسورباید دی‌نیترات / مونونیترات Isosorbide Dinitrate / Mono nitrate .

داروهای دیگر شامل : هیدرالازین Hydralazine - مینوکسیدیل Minoxidil .

دیورتیک‌ها

دیورتیک‌ها آب اضافی بدن را به صورت ادرار دفع می‌کنند و باعث کاهش ورم و بهبود کارکرد پمپ قلب می‌شوند و نیز بر روی کلیه که عضو کنترل کننده آب بدن است اثر می‌کنند . دیورتیک‌ها می‌توانند باعث اختلال در مواد شیمیایی خون شوند که مهم‌ترین آن‌ها ، کاهش پتابسیم خون است . مصرف هم‌زمان دیورتیک‌ها با دیجیتال‌ها ، خطر ریتم غیرطبیعی قلب را تشدید می‌کند . برخی دیورتیک‌ها سطح اوره در خون را افزایش داده باعث افزایش خطر نقرس می‌شوند . برخی دیگر سطح قندخون را بالا برده و برای افراد دیابتی خطرساز می‌شوند .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

دیورتیک‌های لوپ هنله شامل : بومتاناید Bumetanide - اتاکرینیک اسید Ethacrynic acid . فورازماید Furosemide - تورازماید Torasemide .

دیورتیک‌های تگهدارنده پتابسیم شامل : آمیلوراید Amiloride - اسپیرونولاکتون Triamterene - سپرونولاكتون Spironolactone .

- **تیازیدها شامل** : بندروفلومتازید **Bendroflumethazide** - کلروتیازید **Chlorothiazide** کلرالتالیدون **Chlortalidone** - هیدروکلروتیازید **Hydrochlorothiazide** - هیدروفلومتازید **Mefruside** - ایندپامید **Indapamide** - مفروزاید **Hydroflumethiazide** . **Xipamide** - گزپامید **Polythiazide** - پلیتیازید **Metolazone**

ضد آریتمی‌ها

قلب دارای دو حفره فوقانی و دو حفره تحتانی است که دهلیز و بطن نامیده می‌شوند. فعالیت پمپی این چهار حفره از راه دستورها و پیام‌های الکتریکی تنظیم می‌شود که به وسیله گره پیش‌آهنگ در قلب تولید می‌شود و به وسیله مسیر هدایتی قلب به بخش‌های مختلف آن فرستاده می‌شود. اگر این هماهنگی مختل شود حالتی ایجاد می‌شود که به آن آریتمی می‌گویند.

علل آریتمی

نقایص مادرزادی، بیماری‌های عروقی، بیماری‌های قلبی، پرکاری تیروئید، مصرف داروهایی مانند کافئین و آنتی‌کولینرژیک باعث ایجاد آریتمی می‌شوند. در صورتی که آریتمی کارکرد قلب را تحت تأثیر قرار دهد و باعث نارسایی گردد خون شود درمان آن ضرورت دارد. در صورت بروز آریتمی شدید و ناگهانی تجویز داروهای ضدآریتمی به صورت تزریقی لازم است.

این داروها از بروز علایم آریتمی جلوگیری می‌کنند و حتی منجر به ریتم عادی قلب می‌شوند. این داروها به همان اندازه که آریتمی را کنترل می‌کنند، ممکن است باعث افت کارکرد قلب شوند و از این راه منجر به سرگیجه در حالت ایستاده و تنگی نفس در هنگام فعالیت شوند.

داروهای متداول این گروه عبارتند از :

بتابلوکرها : مراجعه شود به صفحه ۲۷

مسدودکننده‌های کانال کلسیم شامل : وراپامیل **Verapamil**

داروهای دیجیتالی شامل : دیگوکسین **Digoxin** - دیجیتوکسین **Digitoxin**

داروهای دیگر شامل : آدنوزین **Adenosine** - آمیودارون **Amiodarone** - برتیلیوم **Bertylium**

داروهای دیگر شامل : فلکائینید **Disopyramide** - لیگنوکائین **Lignocaine** - مگزیلتین **Mexiletine** - موراسیزین **Moracizine** - پروکائین آمید **Procainamide** - پروپافنون **Propafenone** - کینیدین **Quinidine**

داروهای ضد آنژین

آنژین عبارت است از درد در ناحیه قفسه سینه که در اثر نارسایی در اکسیژن‌رسانی به عضله‌های قلب ایجاد می‌شود. علت آنژین تنگ شدن سرخرگ‌های دیواره عضلانی قلب است. تنگ شدن این

رگ‌ها باعث کاهش خون‌رسانی و اکسیژن‌رسانی به عضله‌های قلب می‌شود. افرادی که مصرف چربی بالایی دارند و نیز افراد سیگاری، بیشتر در معرض رسوب چربی در دیواره سرخرگ‌های دیواره عضلانی قلب و در نتیجه ابتلا به آنژین می‌باشند.

وقوع مکرر آنژین صدری می‌تواند باعث ناتوانی شخص شود و در صورتی که درمان صورت نگیرد خطر وقوع حمله قلبی افزایش می‌یابد. در صورتی که آنژین با دارو کنترل نشود، ممکن است عمل جراحی برای بهبود جریان خون عضله‌های قلب ضرورت داشته باشد.

داروهای متداول این گروه عبارتند از:

بتابلوکرها: مراجعه شود به صفحه ۲۷

- **Amlodipine** - آملودیپین **Nifedipine** - نیفیدیپین **Nicardipine** - نیکاردیپین **Diltiazem** دیلتیازم

نیترات‌ها شامل: گلیسریل تری‌نیترات - ایزوسورباید دی‌نیترات / مونو‌نیترات **Isosorbide dinitrate / Mononitrate**

بازکننده‌های کانال پتاسیم شامل: نیکوراندیل **Nicorandil**

داروهای دیگر شامل: آسپرین **Aspirine** - سیمواستاتین **Simvastatin** - هپارین **Heparin**.

داروهای ضد فشارخون

فشارخون عبارت از مقدار نیرویی است که به وسیله جریان خون به دیواره سرخرگ‌ها وارد می‌شود. فشارخون دارای یک حداقل و یک حداکثر است که فشارخون حداکثر در طی انقباض بطن‌ها و فشارخون حداقل در هنگام استراحت و انبساط بطن‌ها ایجاد می‌شود. فشارخون بالا، زمانی است که در ۳ زمان مختلف فشارخون شخص بالاتر از حد معمول باشد و تنها یک بار اندازه‌گیری نمی‌تواند بالا بودن فشارخون شخص را اثبات کند. فشارخون گاه در اثر یک بیماری خاص ایجاد می‌شود. گروه‌های خاصی در معرض افزایش فشارخون قرار دارند که عبارتند از دیابتی‌ها، افراد با چربی خون بالا، افراد دارای ضایعات قلبی مادرزادی و افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند.

سفیدپوستان کمتر دچار فشارخون هستند تا سیاهپوستان و افرادی که نمک مصرفی آن‌ها زیاد است بیشتر دچار فشارخون می‌شوند. داروهای ضد فشارخون باعث از بین رفتن فشارخون نمی‌شوند بلکه در هنگام مصرف آن‌ها فشارخون کاهش می‌یابد. نحوه درمان دارویی فشارخون بستگی به شدت فشارخون دارد. در ابتدای شروع درمان فشارخون خفیف و متوسط به طور معمول از یک دارو استفاده می‌شود.

داروهای متدائل این گروه عبارتند از :

مغارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آتریوتانسین (ACE) : مراجعه شود به صفحه ۲۸

بتابلوکرها : مراجعه شود به صفحه ۲۷

مسدودکننده‌های کانال کلسیم : مراجعه شود به صفحه ۲۹

دیورتیک‌ها : مراجعه شود به صفحات ۲۸ و ۲۹

داروهای ضدفشارخون مؤثر بر اعصاب مرکزی شامل : کلونیدین Clonidine – موکسونیدین

. Metyldopa Moxonidine

آلفابلوکرها شامل : دگرازوسین Doxazosin – ترازوسین Terazosin – پرازوسین Prazosin

داروهای پایین آورنده چربی خون

در خون چند نوع چربی وجود دارد که برای کارکرد طبیعی بدن ضروری است اما بالا رفتن غلظت آن‌ها در خون می‌تواند ضرر داشته باشد . غلظت بالای کلسترول زیان بارتر از موارد دیگر است و غلظت بالای چربی ، می‌تواند منجر به رسوب آن در سرخرگ‌ها و ایجاد آرتریوسکلروز شود . داروهای ضدچربی خون زمانی استفاده می‌شوند که اقداماتی مانند رژیم غذایی کم‌چربی مؤثر واقع نشود . داروها ، چربی رسوب کرده را حل می‌کنند و از ایجاد رسوبات بیشتر نیز جلوگیری می‌کنند . نوع داروی مورد استفاده بستگی دارد به اینکه سطح کدام نوع چربی در خون بالا رفته باشد .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

فیبرات‌ها شامل : بزاویبرات Bezafibrate – سیپروفیبرات Ciprofibrate – فنوفیبرات

. Gemfibrozil Fenofibrate

استاتین‌ها شامل : اتورواستاتین Atorvastatin – فلورواستاتین Fluvastatin – پراواستاتین

. Simvastatin – سیمواستاتین Pravastatin

داروهایی که به املاح صفرایی می‌چسبند شامل : کلستیرامین Colestyramine – کلستیپول

. Ispaghula Colestipol

اسید نیکوتینیک و مشتق‌های آن شامل : آسی‌پیموکس Acipimox – نیکوتینیک اسید Nicotinic acid

داروهای دیگر مؤثر بر کبد شامل : تری‌گلیسریدهای امگا سه مارین Omega 3 marine

. triglycerides

داروهای مؤثر بر لخته شدن خون

وقتی در اثر ضایعه یا جراحی خونریزی ایجاد می‌شود بدن به طور طبیعی سعی می‌کند خونریزی را متوقف کند. این کار در دو مرحله صورت می‌گیرد: ابتدا سلول‌هایی که پلاکت نامیده می‌شوند در محل ضایعه تجمع کرده و به صورت یک توده درمی‌آیند، سپس ماده‌ای شیمیایی از پلاکت‌ها ترشح می‌شود که منجر به فعال شدن فاکتورهای انعقادی خون شده و در نهایت به تشکیل ماده پروتئینی فیبرین می‌انجامد. ویتامین K هم در این فرآیند نقش مهمی دارد.

برخی بیماری‌ها بر فرآیند لخته شدن خون اثر می‌گذارند و منجر به تشکیل بیش از حد لخته یا کاهش لخته شدن خون می‌شوند. افزایش لخته شدن خون می‌تواند باعث مسدود شدن رگ‌های خونی و عدم خون رسانی به قسمت‌های حیاتی بدن شود و کاهش لخته شدن، خطر از دست رفتن زیاد خون را در پی دارد.

لخته خونی که در اثر جراحت یا جراحی به وجود می‌آید می‌تواند در جریان خون حرکت کرده و با گیر کردن در مسیر رگ‌های خون رسان، برای اعضای حیاتی بدن مثل قلب و مغز مشکلاتی ایجاد کند. ضدانعقادها یا از تشکیل لخته جلوگیری می‌کنند و یا باعث ثبیت لخته موجود و جلوگیری از آزاد شدن و شناور شدن آن‌ها در جریان خون می‌شوند. این داروهای خوراکی و تزریقی تقسیم می‌شوند که خوراکی بعد از چند روز و تزریقی بلافاصله اثر می‌کند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

فакتور هشت VIII - فاکتور نه IX - فاکتور VIIa - داروی کلوبیدوگرل Clopidogrel

- داروهای ضدتجزیه فیبرین یا داروهای هموستاتیک شامل: Aprotinin

اتامسیلات Tranexamic acid - ویتامین K - فیتومنادیون Phytomenadione

. داروهای ضدپلاکت شامل: آسپیرین Aspirin - دی‌پیریدامول Dipyridamole

ترکیبات خانواده هپارین شامل: سرتوپارین Certoparin - دالتپارین Dalteparin - داناباروید

. Heparin - انوكسازپارین Enoxaparin - تینازاپارین Tinazaparin - هپارین Danaparoid

داروهای ترومبوولیتیک شامل: آلتیپلاز Alteplase - آنیسترپلاز Anistreplase - رتپلاز

. Streptokinase - اوروکیناز Reteplase

ضدانعقادهای خوراکی شامل: نیکوملون Nicoumelone - وارفارین Warfarin

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش مجرایی است که مواد غذایی ضمن عبور از قسمت‌های مختلف آن برای جذب به وسیله بدن آماده می‌شوند. این مسیر از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده که عبارتند از: دهان، مری، معده، دوازده، روده کوچک و روده بزرگ. روده بزرگ از دو قسمت کولون و راست روده تشکیل شده است. بخش انتهایی دستگاه گوارش مقعد است که در انتهای راست روده قرار گرفته و مجرای خروجی دستگاه گوارش را تشکیل می‌دهد. اعضای دیگر دستگاه گوارش عبارتند از: غدد بزاقی، کبد، کیسه صفرا و پانکراس (لوزالمعده). دستگاه گوارش مواد غذایی را که شامل مولکول‌های درشت و پیچیده چربی، قند و پروتئین هستند به ذرات کوچک‌تر و ساده‌تری تبدیل می‌کنند که می‌توانند جذب بدن شده و مورد استفاده قرار گیرند. میکروب‌ها و انگل‌ها گاه ممکن است باعث التهاب مخاط روده و معده شوند.

محتویات اسیدی معده و اختلال در کار دستگاه اینمی می‌تواند باعث التهاب روده و معده و حتی زخم معده شود. گشاد شدن سیاهرگ‌های ناحیه مقعد و راست روده می‌تواند باعث ایجاد بواسیر شود. سندروم روده تحریک‌پذیر، اسهال و یبوست از دیگر مشکلات شایع دستگاه گوارشی هستند که در اثر مختل شدن حرکت‌های طبیعی لوله گوارشی ایجاد می‌شوند.

گروه‌های دارویی عمدہ در درمان بیماری‌های گوارشی عبارتند از:

- ضداسیدها
- داروهای ضدزخم معده
- داروهای ضداسهال (شامل داروهای مورد استفاده در سندروم روده تحریک‌پذیر)
- مسهل‌ها
- داروهای مورد استفاده در بیماری‌های التهابی روده
- داروهای مورد استفاده در بیماری‌های مقعد و راست روده
- داروهای مؤثر بر سنگ‌های صفراء

ضداسیدها

دیواره معده آنزیم و اسید ترشح می‌کند که به روند هضم غذا کمک می‌کند. سطح داخلی معده به وسیله لاکه موکوسی ضخیمی که به طور دائم به وسیله مخاط معده تولید می‌شود پوشانده شده، مخاط را از گزند اسید معده محافظت می‌کند. اگر اسید معده بیش از حد عادی تولید شود می‌تواند لاکه دفاعی معده را از بین برد و باعث ایجاد ضایعاتی در دیواره معده شود. ضداسیدها، ترکیبات قلیایی متوسطی

هستند که اسید معده را خنثی کرده و باعث بهبود علایمی مانند درد و سوءهاضمه ناشی از آسیب دیدگی به وسیله اسید معده می شوند . عواملی مانند اضطراب ، استعمال دخانیات ، خوردن قهوه و مصرف الکل باعث افزایش ترشح اسید معده می شوند . طعم گچی ضد اسیدها ، به وسیله برخی انسان‌ها اصلاح و قابل تحمل می شود . پزشکان از ضد اسیدها برای بهبود سوءهاضمه و سوزش سر دل در بیماری‌هایی چون التهاب یا زخم مری ، معده و دوازدهه استفاده می کنند . مصرف منظم ضد اسیدها ، باعث خنثی شدن اسید معده و بهبود التهاب یا زخم ایجاد شده به وسیله اسید می شود .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

ضد اسیدها شامل : هیدروکسید الومینیم **Aluminium hydroxide** - کربنات کلسیم **Calcium carbonate** - هیدروکسید منیزیم **Hydrotalcite** - هیدروکسید متالسیت **Carbonate bicarbonates Sodium** . دی‌متیکون **Dimeticone** عوامل ضد نفع شامل : دایمیتیکون

داروهای ضد زخم معده

سطح داخلی معده ، روده و دوازدهه ، در شرایط عادی به وسیله یک لایه موکوسی حفاظت می شود که اگر این لایه محافظت از بین برود یا مقدار اسید تولید شده به وسیله معده افزایش یابد می تواند منجر به ایجاد ضایعه شده و ایجاد زخم معده کند . زخم ایجاد شده اگر جزی باشد خود به خود ممکن است بهبود یابد اما اگر زخم وسعت بیشتری داشته باشد نیاز به درمان خواهد داشت . زخم معده می تواند باعث ایجاد علایمی مانند دل درد ، استفراغ و تغییر اشتها شود . علت واقعی زخم معده مشخص نیست اما عواملی مانند کشیدن سیگار ، مصرف مداوم آسپیرین و زمینه‌های ارثی در این امر دخیل هستند و نیز نوعی میکروب به نام « هلیکو باکتر پیلوری » در معده بسیاری از مبتلایان یافت می شود که حاکی از نقش آن در ایجاد زخم معده است .

اگرچه ضد اسیدها درد ناشی از زخم معده را تسکین می دهند اما فرآیند ترمیم زخم آهسته است . اگر زخم معده بدون درمان رها شود ، می تواند باعث سوراخ شدن دیواره معده یا دوازدهه شود . درمان جراحی برای مواردی چون ایجاد انسداد ، خونریزی ، سوراخ شدن دیواره معده یا دوازدهه و زمانی که احتمال کانسر معده وجود دارد ، تجویز می شود .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

محارکننده‌های پمپ پروتون شامل : امپرازول **Omeprazole** - پانتوپرازول **Pantoprazole** . رابپرازول **Rabeprazole**

- **Famotidine** - فاموتیدین **Cimetidine** - سایمتیدین **H₂ شامل** : بلوک کننده های گیرنده **Ranitidine** - رانیتیدین **Nizatidine** - نیزاتیدین **داروهای دیگر شامل** : آنتی بیوتیک ها و ضد اسیدها که در قسمت های دیگر ذکر شده اند - **Bismuth** - کاربنوکسولون **Carbenoxolone** - میزوپروستول **Misoprostol** - سوکرالفات **Sucralfate** - رانیتیدین بیسموت سیترات **Ranitidine bismuth citrate**

دروهای ضد اسهال

اسهال یعنی افزایش تعداد دفعات دفع مدفع و افزایش درجه آبکی بودن آن . اسهال یک مکانیزم دفاعی برای دفع مواد مضری است که وارد دستگاه گوارش شده اند . شایع ترین علت اسهال عفونت های ویروسی ، انگل ها ، مسمومیت های غذایی و اسهال مسافرین است .

اسهال همچنین ممکن است در اثر مصرف برخی داروها و نیز برخی بیماری ها ایجاد شود . اضطراب نیز می تواند باعث اسهال شود . در بیشتر موارد اسهال خود به خود و بدون دارو برطرف می شود اما این نکته اهمیت دارد که به شخص مبتلا به اسهال مقدار کافی غذا و مایعات فراوان داده شود تا از کم شدن آب بدن و اختلال تعادل املاح جلوگیری شود . اسهال شدید جذب داروها را مختل می کند . ضد اسهال ها زمانی تجویز می شوند که اقدامات ساده اولیه مؤثر واقع نشوند و علل عفونی اسهال مطرح نباشند .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

داروهای ضد اسپاسم شامل : **Atropine** - آتروپین **Hyosine** - هیوسین **Dicycloverine** - دی سیکلوفورین

اوپیوئیدها شامل : **Codeine** - کدئین **Diphenoxylate** - دیفنوکسیلات **Loperamide** - لوپرامید **داروهای حجم کننده مدفع و عوامل جاذب** (جذب کننده های گازها و مواد مضر از محتویات روده) **شامل** : **Ispaghula** - کائولین **Kaolin** - متیل سلولز **Methyl Cellulose** - سرم خوراکی **ORS** .

دروهای هورد استفاده در سندروم روده تحریک پذیر

سندروم روده تحریک پذیر عارضه ای است که در آن انقباضات آرام و منظم عضلات روده برای حرکت دادن آرام محتویات روده ، حالت شدید ، نامنظم و دردناکی پیدا می کنند . اگرچه تنظیم مقدار فیبر موجود در مواد غذایی می تواند باعث بهبود علایم شود اما ممکن است استفاده از دارو نیز ضرورت داشته باشد . این بیماری ارتباط نزدیکی با استرس های عصبی دارد .

داروهای متداول این گروه عبارتند از :

داروهای ضد اسپاسم شامل : **Mebeverine** - میبورین **Dicycloverine** - دی سیکلوفورین

. Loperamide : لوپرامید اوپیوئیدها شامل

. Peppermint Oil : روغن پپرمینت داروهای دیگر شامل

مسهلهای

وقتی روده شما همانند شرایط عادی تحرک نداشته باشد ، مدفع شما سفت و دفع آن مشکل می‌شود که در این حالت شما دچار بیوست هستید . شایع‌ترین علت بیوست کاهش فیبر در رژیم غذایی است و ساده‌ترین اقدام برای رفع آن مصرف آب فراوان و غذاهای حاوی فیبر است . فیبر باعث نرم شدن مدفع و دفع راحت آن می‌شود . با این وجود ، گاه در کنار این اقدام مصرف داروهای مسهل نیز مورد نیاز است . تأخیر در دفع مدفع باعث آب‌گیری بیشتر و کمتر شدن حجم مدفع شده و منجر به بیوست می‌شود . در مبتلایان به بواسیر و فتق ، مصرف مسهلهای نیاز به افزایش زیاد فشار شکم جهت عمل دفع را کاهش می‌دهند . بعد از به دنیا آوردن بچه و عمل جراحی ممکن است این داروها تجویز شوند . برای خالی کردن روده جهت مقاصد تشخیصی و نیز در افراد بستری و بی‌تحرک ، از این داروها استفاده می‌شود . مهم‌ترین عارضه مسهلهای ، وابستگی شخص به آن‌ها برای فعالیت عادی روده است . لذا نباید به صورت غیر ضروری و بلندمدت از این داروها استفاده شود . مصرف بلندمدت این داروها در جذب برخی ویتامین‌ها مداخله می‌کند .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

- **Co - danthramer** : بیزاکودیل Bisacodyl - کودانترامر
- **Co - dantrosate** : داکوسات Senna - سنا
- **Methylcellulose** : ایسپاچولا Ispaghula - متیل سلولوز
- **Sodium Alginate** : آلرینات

عوامل نرم‌کننده مدفع : پارافین مایع Liquid paraffin - سدیم داکوسات Sodium docusate .

- **Magnesium Sulfate** : لاکتولوز Lactulose - سولفات منیزیم Sodium acid phosphate

داروهای مورد استفاده در بیماری‌های التهابی روده

واژه بیماری التهابی روده به بیماری‌هایی اطلاق می‌شود که در آن التهاب دیواره روده منجر به طیفی از علایم شامل یک اسهال جزیی تا یک بیماری مادام‌العمر می‌شود . این بیماری ممکن است با اسهال خونی مکرر ، احساس ناخوشی عمومی و درد عود کننده توأم باشد . کاهش اشتها و کاهش جذب غذا در این بیماران ، ممکن است منجر به کاهش وزن شود .

علت اصلی بیماری‌های التهابی روده مشخص نیست اما عواملی چون استرس، عفونت‌ها، رژیم غذایی و عوامل ژنتیکی می‌توانند مؤثر باشند. استفاده از رژیم غذایی مناسب و زندگی کم استرس به بهبود بیماری کمک می‌کند، با این وجود استفاده از دارو ضروری است. وقتی از این داروها برای درمان حمله حاد بیماری استفاده می‌شود علایم ظرف چند روز فروکش می‌کنند و بهبود حال عمومی مریض ظرف چند هفته حاصل می‌شود. در ضمن داروهای خداسهال نباید در این افراد به طور منظم تجویز شوند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

کورتون‌ها شامل: بودسوناید Hydrocortisone – هیدروکورتیزون Budesonide – پردنیزولون Prednisolone

مهارکننده‌های ایمنی شامل: آزاتیوپرین Azathioprine

مرکاپتوپورین Mercaptopurine – متوترکسات Methotrexate

آمینو سالیسیلات‌ها شامل: بالسالازاید Mesalazine – مسالازین Balsalazide – اولسالازین Olsalazine

Sulfasalazine – سولفاسالازین

داروهای هورد استفاده در بیماری‌های مقعد و راست روده

شایع‌ترین بیماری مقعد و راست روده (قسمت انتهایی روده بزرگ) بواسیر (هموروئید) است. این بیماری زمانی ایجاد می‌شود که سیاهرگ‌های هموروئیدی در این ناحیه به علت افزایش فشارهای موضعی در اثر عواملی مانند بارداری و مشاغلی که با نشستن طولانی همراه هستند، تحریک، گشاد یا متورم می‌شوند. هموروئید می‌تواند باعث تحریک و درد در ناحیه مقعد به ویژه در هنگام باز بودن آن هنگام دفع شود. هموروئید در اثر بیوست یا کشیدگی مقعد بدتر می‌شود. در برخی افراد، هموروئید ممکن است دچار خونریزی شود و در مواردی نیز در سیاهرگ‌های گشاد شده هموروئیدی، لخته تولید شده و با گیر کردن در مسیر رگ‌های این ناحیه، باعث درد شدید می‌شود که به این پدیده هموروئید ترومبوze می‌گویند.

دیگر بیماری‌های این ناحیه خارش اطراف مقعد و شقاق‌های دردناک در مقعد می‌باشد. داروهایی که برای درمان هموروئید به کار می‌روند به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول داروهایی هستند که به صورت شیافها و کرم‌های مختلف به طور موضعی جهت بهبود تورم و آسیب‌دیدگی و تحریک ناشی از هموروئید به کار می‌روند و دسته دوم برای تصحیح بیوست که هم در ایجاد هموروئید و هم در تشدید ناراحتی‌های حاصل از آن نقش دارد به کار می‌روند. هموروئیدهای بزرگ به وسیله عمل جراحی یا بستن حلقه بهبود می‌یابند. استفاده از درمان‌های یاد شده ناراحتی حاصل از این بیماری را به ویژه در هنگام حرکت روده بهبود می‌بخشد.

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

عوامل تنگ کننده عروق شامل : افرین Ephedrine

کورتون های موضعی شامل : هیدروکورتیزون Hydrocortisone
بی حس کننده های موضعی که در بخش های دیگر ذکر شده اند :
مسعل ها که در بخش های دیگر ذکر شده اند .

Aluminium acetate استات Aluminium acetate شامل : آلومینیم Soothing and astring agents - بیسموت Zinc oxide - اکسید روی Preu balsam - پریوبالزم Bismuth

داروهای مورد استفاده در درمان سنگ های صفوایی

به وجود آمدن سنگ صفرا ، شایع ترین بیماری کیسه صفرا عصاره تولید شده به وسیله کبد را ذخیره کرده و سپس برای کمک به هضم چربی آن را به داخل روده می ریزد . مایع صفوایی شامل رنگ دانه های صفوایی ، اسید های صفوایی و املاح صفوایی است . همچنین مقدار مشخصی کلسترول در مایع صفوایی وجود دارد که در اسید صفوایی حل می شود . اگر مقدار کلسترول افزایش یابد یا مقدار اسید صفوایی کاهش یابد ، کلسترول اضافی و غیرقابل حل ، رسوب کرده و طی فرآیندی تشکیل سنگ کیسه صفرا را می دهد . سنگ صفرا ممکن است سال ها بدون علامت باقی بماند اما گاهی باعث التهاب و عفونت در کیسه صفرا شود . سنگ صفرا می تواند در مجرای صفوایی گیر کرده ، باعث بسته شدن این مجرأ شود و در نهایت منجر به برگشت صفرا به خون و ایجاد یرقان گردد . درمان دارویی فقط زمانی که سنگ ها کوچک بوده ، از جنس کلسترول باشند و انجام عمل جراحی نیز مشکل باشد تجویز می شود .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

داروهای مورد استفاده در درمان کیسه صفرا شامل : کنودیوکسی کولیک اسید Chenodeoxy

cholic acid - اورودیوکسی کولیک اسید Urodeoxy cholic acid

آنزیم های پانکراس شامل : آمیلاز Amylase - لیپاز Lipase - پانکراتین Pancreatin

. Protease پروتئاز

عضلات ، استخوان‌ها و مفاصل

اساس ساختمان بدن بر ۲۰۶ قطعه استخوان ، ۶۰۰ عدد ماهیچه و دسته‌جات پیچیده‌ای از بافت‌های دیگر استوار است که در مجموع سیستم عضلانی - اسکلتی بدن را تشکیل داده و شخص را قادر به حرکت‌های مؤثر و مفید می‌کند .

مفاصلی چون لگن ، زانوها ، مج پا و ستون فقرات که وزن بدن را تحمل می‌کنند ، بیشتر در معرض فرسایش و آسیب‌دیدگی هستند . غضروفی که سطح انتهای استخوان‌ها را پوشانده ، ممکن است آسیب ببیند . مفاصل در اثر بیماری‌هایی مانند روماتیسم و نقرس می‌توانند دچار آسیب‌دیدگی شوند . انتقال پیام‌های عصبی از رشته‌های عصبی به ماهیچه‌ها در اثر بیماری می‌استنی گراو مختل می‌شود و استخوان‌ها به علت کمبود هورمون‌ها ، مواد معدنی و ویتامین‌ها ضعیف می‌شوند .

یک داروی ضدالتهاب یا یک ضددرد می‌تواند باعث بهبود درد و تورم حاصل از عوارض یاد شده شود . ولی در صورت شدت التهاب ممکن است پزشک یک ضدالتهاب قوی مانند یک کورتون تزریقی را به صورت موضعی تزریق کند .

گروه‌های دارویی عمدۀ در درمان بیماری‌های دستگاه اسکلتی - عضلانی عبارتند از :

□ ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی NSAIDs

□ داروهای ضدروماتیسم

□ کورتون‌های مورد استفاده در درمان روماتیسم

□ داروهای ضدنقرس

□ داروهای شلکننده عضلات

□ داروهای مورد استفاده در بیماری می‌استنی گراو

□ داروهای مورد استفاده در بیماری‌های استخوان

ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی (NSAIDs)

از این داروها در بیماری‌هایی مثل آرتربیت روماتوئید و استئوآرتربیت که در آن‌ها عضلات ، مفاصل و استخوان‌ها ، دردناک و متورم می‌شوند استفاده می‌شود . استفاده از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی علایم بیماری را بهبود می‌بخشد اما جلوی پیشرفت آن را نمی‌گیرد ، بنابراین ممکن است نیاز به استفاده از داروهای دیگری نیز باشد که در آرتربیت روماتوئید اهمیت بارزتری دارند . NSAIDs ها به طور شایع برای مداوای کمردرد ، سردردهای مختلف ، نقرس ، دردهای قاعده‌گی ، دردهای خفیف بعد از جراحی و آسیب‌دیدگی بافت‌های نرم مثل کشیدگی و پارگی تاندون‌ها به کار می‌روند .

داروهای شایع گروه NSAIDs (ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی) عبارتند از :

اسکلوفناک Aceclofenac - اسمتاسین Aspirine - آسپیرین - آزابروپازون
 - بنوریلات Benzydamine - سلکوکسیب Azapropazone
 - فلیناک Felbinac - اتودولاک Diflunisal - دیفلونیزال
 - فنیوفن Ibuprofen - فنوبروفن Fenbufen - فلور بیبروفن - ایوبروفن
 - ایندومتاسین Indomethacine - کتوپروفن Ketoprofen - مفنامیک اسید Mefenamic acid
 ملوکسیکام Meloxicam - نابومتن Nabumetone - ناپروکسن Naproxen - فنیل بوتاژون Phenylbutazone
 - پیروکسیکام Piroxicam - رفکوکسیب Rofecoxib - سولینداک Sulindac - تنوكسیکام Tenoxicam
 . تیاپروفنیک اسید Tiaprofenic acid

مهارکنده‌های سیکلواکسیژناز - ۲ (COX - 2 Inhibitors)

NSAID‌ها فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز را که شکلی از پروستاگلاندین‌ها است متوقف کرده باعث تسکین التهاب می‌شوند . تحقیقات نشان می‌دهند که دو نوع آنزیم سیکلواکسیژناز وجود دارد که در قسمت‌های مختلف بدن پراکنده‌اند .

NSAID‌ها عموماً هر دو نوع آنزیم تیپ (I) و تیپ (II) را مهار می‌کنند ، به همین دلیل تأثیر این داروها بر روی آنزیم تیپ (I) که در معده وجود دارد باعث تحريك معده می‌شود . جدیداً NSAID‌هایی تولید می‌شود که فقط روی آنزیم تیپ (II) اثر می‌کنند و اثر سوء دیگر را روی معده ندارند و تحريك گوارشی ایجاد نمی‌کنند . رفکوکسیب Rofecoxib و سلکوکسیب Celecoxib از این دسته داروها هستند .

داروهای ضدروماتیسم

این داروها در بیماری‌های مختلف روماتیسمی به کار می‌روند . شایع‌ترین بیماری روماتیسمی ، روماتیسم مفصلی است . در این بیماری ، دستگاه ایمنی بدن که باید علیه عفونت‌ها فعالیت کند علیه بافت‌های مفصلی بدن خود بیمار وارد عمل شده و منجر به درد ، سفتی و تورم مفاصل می‌شود . مرحله شدید روماتیسم مفصلی باعث خستگی ، کاهش اشتها و بدی حال عمومی بیمار می‌شود . درمان روماتیسم مفصلی (آرتربیت روماتوئید) شامل بی‌حرکت کردن مفصل ، فیزیوتراپی ، تغییر رژیم غذایی و مصرف دارو است . این اقدامات باعث از بین رفتن اصل بیماری نمی‌شوند اما در بسیاری از افراد از ایجاد ناتوانی همیشگی جلوگیری می‌کند . گاهی روماتیسم مفصلی ، خود به خود برای مدت‌ها فروکش می‌کند . هدف از درمان دارویی بهبود علایم سفتی و درد مفاصل ، حفظ قابلیت حرکت و جلوگیری از تغییر شکل مفاصل است . دو دسته دارو برای درمان وجود دارد :

۱- آسپیرین و سایر NSAID ها که باعث بهبود علایمی مثل درد و سفتی می‌شوند.

۲- گروهی از داروها که سیر بیماری را متوقف یا آهسته می‌کنند.

صرف طولانی داروهای ضدروماتیسم، اثر مشخصی در بهبود بیماری ایجاد کرده و منجر به تسکین درد، افزایش قابلیت حرکت مفاصل و بهبود حال عمومی بیمار می‌شوند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- **Cyclophosphamide** - آزاتیوپرین Azathioprine - سیکلوفسفاماید Cyclosporin - متوتركسات Methotrexate

. Sodium aurothiomalate - اورانوفین Auranofin - سدیم اوروتیومالات

- **Hydroxy chloroquine** - هیدروکسی کلروکین Chloroquine - پنی‌سیلامین Penicillamine - سولفاسالازین Sulfasalazine

کورتون‌های مورد استفاده در درمان روماتیسم

کورتون‌ها دسته‌ای از داروها هستند که کار هورمون‌های قشر خارجی غده فوق کلیوی را تقلید می‌کنند. این هورمون‌ها روی تنظیم سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها و مواد معدنی در بدن تأثیر داشته و بر روی فعالیت دستگاه ایمنی نیز اثر دارند. این داروها موارد استفاده متعددی دارند. کورتون‌های تزریقی زمانی مفیدند که بیماری، استئوارتیت یا آرتریت روماتوئید باشد و یک یا تعداد کمی از مفاصل درگیر باشند و علایم بیماری مثل درد و التهاب به وسیله داروهای دیگر بهبود نیافته باشند. کورتون تزریقی را در موضع آسیب‌دیده می‌توان تزریق کرد. این داروها را برای تاندون‌ها، عضلات و لیگامان‌هایی که دچار گرفتگی یا کشیدگی شده‌اند مانند بیماری آرنج تنیس بازان می‌توان تجویز کرد.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- **Prednisolone** - هیدروکورتیزون Hydrocortisone - پردنیزولون Dexamethasone . میتل پردنیزولون Teriamcinolone

داروهای ضدنقرس

نقرس نوعی بیماری است که در اثر بالا رفتن غلظت اسید اوریک که یکی از محصولات فرعی سوخت و ساز عادی بدن است ایجاد می‌شود. افزایش غلظت این ماده در خون، منجر به رسوب کریستال‌های آن در نقاط مختلف بدن؛ در کلیه‌ها منجر به ایجاد سنگ‌های اسید اوریکی، در بافت‌های نرم باعث ایجاد جسمک‌های سفید رنگی به نام «تافی» و در مفاصل پا به خصوص انگشت بزرگ پا، زانو، لگن و دست‌ها باعث ورم و درد شدید در این نواحی می‌شود که آرتریت نقرسی نامیده می‌شود.

زمینه‌های ارثی در بروز نقرس مؤثر است. نقرس در مردان بیشتر از زنان است. غذاهایی مانند گوشت قرمز، مصرف زیاد الکل، چاقی، ماهی آنچوی و ساردین، مصرف دل و جگر و کله پاچه احتمال بروز نقرس را افزایش می‌دهند. کاهش مصرف الکل و تغییر در رژیم غذایی، بخش مهمی از درمان نقرس است. دیورتیک‌های تیازیدی و ضدسرطان‌ها می‌توانند باعث بروز نقرس شوند.

داروهای ضدنقرس، سطح اسید اوریک خون را کم کرده و به صورت بلندمدت برای جلوگیری از نقرس به کار می‌روند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

داروهای مورد استفاده در حمله حاد نقرس شامل: کلشیسین Colchicine - NSAID ها به جز آسپیرین.

داروهای مورد استفاده در جلوگیری از حمله نقرس شامل: الوبورینول Allopurinol - پروبنساید Sulfinpyrazone - سولفینپیرازون Probenecid

شل کننده‌های عضلات

اسپاسم عضلات عبارت است از انقباض دردناک و غیرارادی یک ماهیچه یا دسته‌ای از ماهیچه‌های بدن. این عارضه می‌تواند باعث سفتی دستها و پاها شود و حتی باعث راست نشدن کمر گردد. اسپاسم در اثر وارد آمدن یک ضایعه، مجاورت عضله با مفصل دردناک مبتلا به استئوارتریت و یا به دلایل نامشخصی ایجاد می‌شود.

اسپاسم عضلانی ناشی از آسیب‌دیدگی مستقیم می‌تواند به وسیله یک NSAID یا مسکن معمولی درمان شود. با این وجود در صورت شدید بودن اسپاسم، استفاده از یک شل کننده عضله به صورت کوتاه مدت ضرورت دارد. اسپاستیسیتی (spasticity) نوع دیگری از سفتی عضلات است که به نظر می‌رسد در برخی بیماری‌های دستگاه عصبی ایجاد می‌شود. در اسپاستیسیتی، سفتی پاها ممکن است چنان شدید و غیرقابل کنترل باشد که قدم زدن را مشکل کند، در این صورت از داروهای شل کننده عضلانی استفاده می‌شود تا امکان فیزیوتراپی بلندمدت برای بهبود عالیم فراهم شود. شل شدن بیش از حد عضلات در اثر داروی زیاد می‌تواند باعث ضعف ماهیچه‌ها شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

- داروهای مؤثر بر اعصاب مرکزی شامل: باکلوفن Beclufen - کاریزپرادول Carisprodol
- سیکلوبنزایپرین Cyclobenzaprine - دیازپام Diazepam - اورفنادرین Orphenadrine
متوكاربامول Methocarbamol

داروهای دیگر شامل: تیزانیدین Tizanidine - سم بوتولینیم Botulinum toxin - داترولن Dantrolene - کینین Quinine

داروهای ضد میاستنی گراو

این بیماری زمانی اتفاق می‌افتد که دستگاه اینمی بدن آنتی‌بادی‌های علیه گیرنده‌های حساس به پیام‌های عصبی موجود در دیواره سلول‌های عضلانی تولید می‌کند و باعث از بین رفتن این گیرنده‌ها و در نتیجه کاهش حساسیت عضلات به تحريكات عصبی می‌شود. این عارضه باعث ضعف عضلانی می‌شود که در ابتدا عضلات چشم، پلک‌ها، حنجره و حلق در گیر می‌شوند و در اثر پیشرفت بیماری عضلات دست و پا نیز مبتلا می‌شوند. علایم مشخصه این بیماری عبارتند از افتادگی پلک، تضعیف صدا و دوینی که در طول روز تشديد می‌شود. داروهای مؤثر در این بیماری‌ها با مهار کردن آنزیمی که واسطه‌های شیمیایی تولید شده به وسیله انتهای رشتة عصبی را از بین می‌برد، باعث افزایش غلظت واسطه شیمیایی در انتهای عصب و کارکرد مؤثرتر گیرنده‌های باقی‌مانده موجود در سطح سلول عضلانی می‌شود. با وجود مصرف دارو ممکن است ضعف عضلانی تشید شود که نباید مصرف دارو را زیاد کرد زیرا باعث ضعف بیشتر می‌شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از: آزاتیوپرین Azathioprine – ادروفونیوم Edrophonium

دی‌ستیگمین Distigmine – نئوستیگمین Neostigmine – پیریدوستیگمین Pyridostigmine و کورتون‌ها.

داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های استخوان

استخوان یک بافت زنده است. کیفیت سخت و معدنی آن در اثر فعالیت سلول‌های استخوانی ایجاد می‌شود. این سلول‌ها به طور مرتب کلسیم و فسفر را که در شبکه پروتئینی لانه زنبور مانندی به نام ماتریکس ذخیره می‌شود رسوب می‌دهند یا برداشت می‌کنند.

چون در افراد بالغ رسوب کردن و برداشته شدن کلسیم و فسفر متوازن و متعادل است، استخوان پایدار می‌ماند. سرعت رسوب کردن یا برداشته شدن مواد در استخوان بستگی به عواملی چون تحرک روزانه، میزان جذب کلسیم و ویتامین D از رژیم غذایی، فشار ناشی از وزن بدن و سطح کلسیم خون دارد. هورمون‌ها نیز در این امر نقش دارند. تغییر در سوت و ساز بدن منجر به انواع بیماری‌های استخوانی می‌شود. ویتامین D و تعدادی از ترکیبات مربوط با آن در درمان بیماری‌های استخوانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در بیماری پوکی استخوان، سرعت حل شدن بخش معدنی شده استخوان از سرعت رسوب مواد معدنی در آن پیشی می‌گیرد. این امر باعث کاهش تراکم و استحکام استخوان می‌شود. در بسیاری از مردم، کاهش تدریجی تراکم استخوان از ۳۰ سالگی به طور طبیعی اتفاق می‌افتد، ولی عواملی چون: بی‌حرکتی، کاهش هورمون استروژن در زنان یائسه، مصرف کورتون‌ها به صورت بلندمدت و نیز تولید زیاده از حد هورمون‌های غده تیروئید و آدرنال، باعث تشید روند پوکی استخوان می‌شوند. در پوکی استخوان، احتمال شکستن استخوان‌های لگن، ران و مج زیاد است. برای جلوگیری از پوکی استخوان،

تغذیه مناسب و تحرک کافی مفید است . درمان دارویی ، اصل بیماری پوکی استخوان را درمان نمی کند ولی به بهبود شکستگی و جلوگیری از ضایعات بیشتر کمک می کند ، اگرچه برای افرادی که کلسیم و ویتامین D در غذای آن ها کم است تجویز جبرانی آن ها مؤثر است اما اثر آن محدود بوده و برای مهار پروسه پوکی استخوان معمولاً تجویز دارو ضرورت دارد .

راشیتیزم و نرخ استخوان

در نرمی استخوان کمبود ویتامین D باعث کاهش کلسیم استخوان و نرمی آن می شود . این عارضه باعث درد ، حساسیت و کاهش قدرت عضلات شده خطر شکستگی استخوان یا تغییر شکل آن را نیز بالا می برد . نرمی استخوان در کودکان را راشیتیزم گویند که باعث کند شدن رشد کودک می شود . شایع ترین علت نرمی استخوان ، کمبود ویتامین D است که می تواند به وسیله عواملی مانند : تغذیه ناکافی ، قرار نگرفتن کافی در معرض نور آفتاب ، عدم توانایی جذب ویتامین D از دستگاه گوارش و بیماری های مزمن کلیه ایجاد شود . بیماری های کلیوی ، علت مهم راشیتیزم در کودکان و استئومالاسی در افراد بالغ است . بهبود بیماری در بلندمدت ، بستگی به درمان علت اصلی دارد . در مواردی ممکن است نیاز به درمان مادام العمر باشد .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

آلندرونات Alendronate - آلفا کلسیدل Alfacalcidol - کلسیتونین Calcitonin - کلسیتریول Conjugated estrogens - Calcium carbonate - استروژن کونژوگه Calcitriol - ارگوکلسیفرون Ergocalciferol - اتیدرونات Etidronate - فلوراید fluoride - سالکاتونین Salcatonin - ویتامین D .

آلرژی

آلرژی یعنی حساسیت به ماده‌ای معین که یکی از واکنش‌های دستگاه ایمنی بدن است. دستگاه ایمنی از بدن در مقابل عوامل خارجی مانند: باکتری‌ها و ویروس‌ها دفاع می‌کند. یکی از راه‌های فعالیت دستگاه ایمنی تولید آنتی‌بادی‌ها (پادتن‌ها) است.

وقتی یک ماده خارجی یا آلرژن وارد بدن می‌شود نوعی از گلbul‌های سفید خون به نام لنفوسيت پادتن‌هایی علیه آن تولید می‌کند.

یکی از شایع‌ترین بیماری‌های آلرژیک تب یونجه است که در اثر واکنش آلرژیک به گرده‌های گیاهی ایجاد شده و منجر به التهاب، تورم و تحریک مجرای بینی و آب ریزش چشم و بینی می‌شود. پر حیوانات، انگل‌های خیلی کوچک و غبار منزل، در افراد مستعد باعث واکنش‌های آلرژیک می‌شوند. دیگر واکنش‌های آلرژیک عبارتند از: کهیر، انواع راش‌های پوستی، برخی اشکال اگزما و درماتیت.

گروه‌های عمدۀ دارویی مورد استفاده در درمان آلرژی عبارتند از:

۱- آنتی‌هیستاهین‌ها

آنتی‌هیستامین‌ها پرکاربردترین داروها در درمان واکنش‌های آلرژیک هستند. این داروها، براساس ساختمان شیمیایی به چند زیرگروه که هر کدام تفاوت مختصری با هم دارند (از نظر فعالیت و خصوصیات) تقسیم می‌شوند.

کارکرد عمدۀ این داروها، مقابله با اثر هیستامین است که در واکنش‌های آلرژیک آزاد می‌شود. آنتی‌هیستامین‌هایی که در این بحث به عنوان داروهای مؤثر بر آلرژی مطرح هستند روی گیرنده H₁ اثر می‌کنند. این داروها در جلوگیری از رینیت آلرژیک کاربرد وسیعی دارند. آنتی‌هیستامین‌ها برای درمان خارش، ورم و قرمزی ناشی از واکنش‌های آلرژیک تجویز می‌شوند. برای تسکین اثر نیش حشرات و نیز برای بهبود تحریکات ناشی از آبله مرغان، از آنتی‌هیستامین‌ها می‌توان استفاده کرد. مصرف برخی آنتی‌هیستامین‌ها در دوز بالا برای کودکان باعث تشنج و هذیان می‌شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

آنتی‌هیستامین‌های غیر آرامبخش شامل: اکریواستین Acrivastine – ستیریزین Cetirizine

فکسوفنادین Fexofenadine – لوراتادین Loratadine – میزولاستین Mizolastine .

آنچه هیستامین‌های آرامبخش شامل:

آزاتادین Azatadine – برومفنیرامین Brompheniramine – کلرفنیرامین Chlorpheniramine

کلماستین Clemastine – دیمن هیدرامین Dimenhydrinate – دیمن هیدرینات Diphenhydramine

- Promethazine - دوکسی‌لامین Doxylamine - پرمتازین DiphenylPyraline . Triprolidine - تریپرولیدین Trimeprazine .
۲- درمان‌های دیگر شامل :

الف) لوکوترین‌ها

لوکوترین‌ها نیز مانند هیستامین در بدن تولید شده و به نظر می‌رسد نقش مهمی در آسم داشته باشند .

ب) گورتون‌ها

گورتون‌های مورد استفاده در درمان آسم و رینیت آلرژیک به صورت استنشاقی تجویز می‌شوند .

ج) سدیم کروموجلیکات

از آزاد شدن هیستامین جلوگیری می‌کند . به صورت استنشاقی برای جلوگیری از حمله رینیت و آسم و به صورت قطره جهت درمان بیماری‌های آلرژیک چشم مورد استفاده قرار می‌گیرد .

د) حساسیت‌زاداین

در وضعیت‌هایی مانند رینیت آلرژیک یا حساسیت به نیش حشرات ، هنگامی که استفاده از داروهای مختلف مؤثر نباشد و آزمایش‌ها نشان دهد که شخص به آلرژن مشخصی حساسیت دارد این کار انجام می‌شود که البته وقت‌گیر بوده و بهبودی ناقصی ایجاد می‌کند .

عفونت‌ها و آلودگی‌های انگلی

بدن انسان محیط مناسبی برای رشد انواع مختلف میکرووارگانیزم‌ها (موجودات زنده خیلی کوچک) مانند باکتری ، قارچ ، ویروس ، مخمر و جانوران تک سلولی است و نیز میزبان انگل‌هایی چون حشرات ، کرم‌ها و کرم‌های پهنه می‌باشد .

انتقال میکروب‌ها از شخصی به شخص دیگر از راه‌های گوناگونی مثل تماس مستقیم ، استنشاق هوای آلوده به میکروب و مصرف غذا و آب آلوده صورت می‌گیرد . در حالت عادی دستگاه دفاعی بدن در مقابل هجوم میکروب‌ها از بدن دفاع کرده و قبل از آن که میکروب‌ها تکثیر شده و باعث بیماری جدی شوند آن‌ها را می‌کشد .

آلودگی‌های انگلی

تهاجم انگل‌هایی که در سطح بدن زندگی می‌کنند (مثل شپش) یا انگل‌هایی که در داخل بدن زندگی می‌کنند (مثل کرم‌های نواری) به بدن انسان ، آلودگی انگلی نامیده می‌شود . وقتی دفاع بدن در مقابل هجوم انگل‌ها کافی نباشد از داروهای ضدانگل استفاده می‌شود .

آلودگی‌های انگلی ارتباط نزدیکی با آب و هوای گرمسیری و سطح پایین بهداشت دارند . علت تهاجم میکروب‌ها می‌تواند اینمی کم یا فقدان اینمی بدن در مقابل میکروب مهاجم باشد یا ممکن است تعداد میکروب‌های مهاجم به قدری زیاد باشد که دفاع بدن نتواند در مقابل آن‌ها مقاومت کند . برخی قسمت‌های بدن مثل مجاري هوایی بیشتر در معرض عفونت هستند . برخی داروها میکروب‌ها را می‌کشند و برخی دیگر از تکثیر و رشد میکروب‌ها جلوگیری می‌کنند . استفاده غیر ضروری از آنتی‌بیوتیک‌ها ، باعث ایجاد مقاومت در میکروب‌ها نسبت به آن‌ها می‌شود . ضدانگل‌ها برای درمان آلودگی انگلی ناشی از کرم و کرم پهنه مورد استفاده قرار می‌گیرند .

گروه‌های داروینی عمدۀ در درمان عفونت‌ها و آلودگی‌های انگلی عبارتند از :

- داروهای آنتی‌بیوتیک و آنتی‌باکتریال
- داروهای ضدویروس
- واکسن‌ها و ایمن‌سازی
- داروهای ضدتک‌یاخته (آنتی‌پروتوزوال)
- داروهای ضدقارچ
- داروهای ضدکرم

آنتی بیوتیک‌ها

این داروها در درمان عفونت‌های میکروبی جزئی تاعفونت‌های خطرناکی مانند پنومونی و منژیت مؤثرند. کارکرد آنتی بیوتیک‌ها با داروهای آنتی باکتریال مشابه است. آنتی بیوتیک‌ها منشأ طبیعی مانند قارچ‌ها دارند، اگرچه بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها امروزه به صورت مصنوعی تهیه می‌شوند. برخی آنتی بیوتیک‌ها روی طیف وسیعی از میکروب‌ها اثر می‌کنند و برخی دیگر روی میکروب‌های خاص مؤثرند. در درمان اولیه، چند آنتی بیوتیک هم‌زمان با هم تجویز می‌شوند تا طیف وسیع‌تری از میکروب‌های احتمالی را پوشش دهند. در صورتی که شدت بیماری عفونی زیاد باشد شروع درمان با آنتی بیوتیک‌های تزریقی خواهد بود. جهت درمان عفونت‌های موضعی پوست، چشم و گوش از فرآورده‌های موضعی استفاده می‌شود.

تأثیر آنتی بیوتیک‌ها بر بدن

آن‌تی بیوتیک‌ها ظرف چند روز بسیاری از انواع عفونت‌ها را متوقف می‌کنند. آنتی بیوتیک‌ها به طور مستقیم علایم عفونت مثل درد را متوقف نمی‌کنند، بنابراین هم‌زمان با آنتی بیوتیک‌ها ممکن است نیاز به مصرف داروهای مسکن یا ضدتب نیز باشد.

تکمیل کردن دوره درمان با آنتی بیوتیک‌ها اهمیت زیادی دارد، حتی اگر علایم بعد از مدت کوتاهی از شروع درمان فروکش کرده باشند، چون ممکن است با وجود فروکش کردن علایم بیماری هنوز میکروب‌ها در بدن موجود بوده و باعث عود علایم عفونت شوند.

مقاومت میکروب‌ها در برابر آنتی بیوتیک‌ها

پزشکان سعی می‌کنند از بروز مقاومت میکروب‌ها در مقابل آنتی بیوتیک‌ها جلوگیری کنند. برای این کار برای هر عفونت، آنتی بیوتیکی تجویز می‌کنند که میکروب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن نابود کنند. همچنین تکمیل نکردن دوره درمان عفونت در بروز مقاومت مؤثر است و می‌تواند منجر به رشد مجدد شکل مقاوم میکروب شود.

خطرهای و احتیاط‌های ضروری

اگر سابقه حساسیت به یک آنتی بیوتیک را دارید، باید از دیگر داروهای هم‌گروه و هم خانواده آن نیز دوری کنید. خطر دیگر مصرف آنتی بیوتیک‌ها به ویژه به صورت بلندمدت، به هم خوردن تعادل میکروب‌های طبیعی بدن مثل میکروب‌های موجود در روده است.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

آمینوگلیکلوزیدها شامل: آمیکاسین Amikacin - جنتامایسین Gentamicin - نئومایسین Neomycin . توبرامایسین Tobramycin - استرپتومایسین Streptomycin - نتیلمایسین Netilmycin

سفالوسپورین‌ها شامل: سفادروکسیل Cefadroxil - سفالکسین Cefaclor - سفالکسین Cefixime - سفامندول Cefamandole - سفازولین Cefazolin - سفیکسیم Cefalexin سفودیزیم Cefodizime - سفوکسیتین Cefpodoxime - سفپودوکسیم Cefotaxime - سفرادین Ceftazidime - سفتازیدیم Cefradine لینکوزامیدها شامل: کلیندامایسین Clindamycin ماگرولیدها شامل: آزیترومایسین Azithromycin - کلاریترومایسین Clarithromycin اریترومایسین Erythromycin پنی‌سیلین‌ها شامل: آموکسی‌سیلین Amoxicillin - آمپی‌سیلین Ampicillin - آزلوسیلین Benzylpenicillin - آزترئونام Aztreonam - بنزیل پنی‌سیلین Benzylpenicillin - کو آموکسی‌کلاو Co - fluampicil - کوفلوآمپی‌سیل Flucloxacillin - ایمپی‌پنم Phenoxytmethylpenicillin - فنوکسی متیل پنی‌سیلین Imipenem تتراسیکلین‌ها شامل: داکسی‌سیکلین Doxycycline - اکسی‌تتراسیکلین Tetracycline تتراسیکلین Fusidic acid - فوژیدیک اسید Colistin - کلیستین Chloramphenicol - کلامفنیکل Rifampicin - ریفامپیسین Metronidazole - مترونیدازول Spectinomycin - اسپکتینومایسین Vancomycin - وانکومایسین Teicoplanin - تریمتوبیریم Trimethoprim

داروهای مورد استفاده در درمان هنریت (التهاب پرده‌های مغز)

منزهیت التهاب پرده‌هایی است که مغز و نخاع را در بر گرفته‌اند. این بیماری هم به وسیله باکتری‌ها و هم توسط ویروس‌ها می‌تواند ایجاد شود. منزهیت باکتریال می‌تواند ظرف چند ساعت شخص سالم را که از قبل مشکلی نداشته به کام مرگ بفرستد.

به افرادی که با مبتلایان به منزهیت ناشی از هموفیلوس آنفلوانزا یا «نایسریا منزهیتیدیس» تماس داشته‌اند توصیه می‌شود یک دوره آنتی‌بیوتیک (به ویژه ریفامپین)، جهت پیش‌گیری از منزهیت مصرف کنند.

داروهای ضدباکتری

این داروها از نظر کارکرد شبیه آنتی‌بیوتیک‌ها هستند، ولی از نظر مبدأ و منشأ با آن‌ها متفاوتند. آنتی‌بیوتیک‌ها در ابتدا به صورت طبیعی از مخمرها و قارچ‌ها به دست آمدند اما ضدباکتری‌ها به صورت مصنوعی و شیمیایی تهیه شدند. خیلی از داروهای ضدباکتری از راه جلوگیری از رشد و تکثیر باکتری‌ها،

باعث از بین رفتن عفونت می‌شوند. این داروها به طور معمول چند روز طول می‌کشد تا اثر خود را بروز دهند لذا ممکن است از داروهای مسکن و ضدتب برای کنترل علایم عفونت استفاده شود. داروهای ضدباکتری نیز مانند آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند واکنش‌های آلرژیک در بدن افراد مستعد ایجاد کنند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

- **Ciprofloxacin** - سینوگزاسین **Cinoxacin** - سیپروفلوکسازین **Nalidixic acid** - گرپافلوکسازین **Grepafloxacin** - لووفلوگزاسین **Ofloxacin** - اوفلوکسازین **Norfloxacin** - نورفلوکسازین **Sulfadiazine Co** - **trimoxazole** - سولفادیازین **Sulfadimidin** سولفادیمیدین

ضد عفونی کننده‌های مجاری ادراری شامل : نیتروفورانتوئین **Nitrofurantoin**.

- **Dapsone Clofazimine** - داپسون **Trimethoprim Tinidazole** - تینیدازول **Metronidazol**

درمان دارویی در بیماری هانسن (جذام)

این بیماری یک عفونت باکتریایی است که به وسیله « مایکوباتریوم لپرا » ایجاد می‌شود. این بیماری به آهستگی رشد می‌کند و ابتدا اعصاب محیطی را درگیر می‌کند و باعث از بین رفتن حس در پاهای و دست‌ها می‌شود. سپس عصب صورت ممکن است تحت تأثیر این عفونت قرار گیرد. جهت درمان از سه دارو به طور همزمان استفاده می‌شود تا از بروز مقاومت احتمالی جلوگیری شود. به طور معمول این سه دارو : داپسون ، ریفارمیپین و کلوفازیمین هستند و حدود ۲ سال باید مصرف شوند.

داروهای ضد توبرکولوز (بیماری سل)

سل یک بیماری عفونی مسری است که علت باکتریایی دارد و به طور معمول در دوره کودکی از راه استنشاق باسیل‌هایی که در اثر عطسه یا سرفه افراد مبتلا به عفونت فعال سل وارد هوا می‌شوند شخص به آن آلوده می‌شود.

باسیل سل از راه شیر آلوده گاو مبتلا به سل نیز منتقل می‌شود. ابتدا یک ریه به باسیل آلوده می‌شود و سپس عفونت سل به ریه مقابل منتقل می‌شود. در ۹۰ - ۹۵ درصد افراد مبتلا به عفونت اولیه سل، دستگاه ایمنی بدن می‌تواند باعث مهار عفونت سل شود اما نمی‌تواند باسیل‌های سل را بکشد.

مشکل جدی بیماری در بزرگسالان نوع مخرب و پیش رونده بیماری است که در اثر فعالیت دوباره سل اولیه مهار شده ایجاد می‌شود. این شکل از بیماری در ۱۰ - ۵ درصد افرادی که سابقاً

عفونت اولیه سلی را داشته‌اند ایجاد می‌شود. شخص مبتلا به سل ممکن است توسط ۳ یا ۴ نوع دارو تحت مداوا قرار گیرد که این امر از بروز مقاومت میکروبی جلوگیری می‌کند. دوره درمان در افرادی که مشکلاتی مانند ضعف دستگاه ایمنی دارند می‌تواند ۹ ماه تا دو سال طول بکشد.

پیش‌گیری از بیماری سل

واکسنی که به صورت تزریقی بوده و از رده ضعیف شده‌ای از باکتری «توبرکولوز» حیوانات تهیه می‌شود از راه تحریک مقاومت طبیعی بدن در مقابل بیماری منجر به ایمنی بدن نسبت به بیماری سل می‌شود.

داروهای رایج مورد استفاده در درمان سل و جذام عبارتند از:

کاپرئومایسین Capreomycin - سیکلوسرین Cycloserine - اتابمبوتل Ethambutol - ایزوپنیازید Isoniazid - پیرازین آمید Rifampicin - ریفامپیسین Pyrazinamide - ریفابوتین Rifabutin - استرپتومایسین Streptomycin - کلوفازیمین Clofazimin - داپسون Dapsone .

داروهای ضدویروس

ویروس‌ها کوچک‌تر و ساده‌تر از میکروب‌ها هستند و به طور مستقل زندگی نمی‌کنند بلکه برای رشد و تکثیر خود نیاز به یک سلول زنده دارند. وقتی که یک ویروس در داخل سلول زنده تکثیر شد، سلول زنده می‌میرد، ویروس‌ها آزاد می‌شوند و باعث آلوده‌شدن سلول‌های دیگر می‌شوند. انواع مختلفی از ویروس وجود دارد و هر کدام عفونتی با عالیم متفاوت ایجاد می‌کنند. شدت عفونت در هر ویروس متفاوت است. عفونت‌های ویروسی شایع عبارتند از سرماخوردگی، آنفلوانزا، بیماری شبی آنفلوانزا، گلودرد و آبله مرغان و اوریون در کودکان.

برخی از عفونت‌های ویروسی می‌توانند به وسیله واکسن پیش‌گیری شوند. داروهای ضدویروس، شدت و مدت بیماری ویروسی را کم می‌کنند اما باعث از بین رفتان آن نمی‌شوند. ضدویروس‌ها به صورت خوارکی و موضعی تجویز می‌شوند. شکل تزریقی دارو در مواردی مانند جلوگیری از آبله مرغان می‌تواند تجویز شود که باستی زیر نظر پزشک صورت گیرد. توقف تکثیر ویروس باعث عدم انتشار آن به سلول‌های سالم می‌شود و به سرعت منجر به بهبود عالیم بیماری می‌گردد.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

آسیکلولویر Aciclovir - آماتادین Amantadine - سیدوفوویر Cidofovir - فامسیکلولویر Famciclovir - فوسکارت Foscarnet - گان‌سیکلولویر Ganciclovir - ایدوکسوریدین Idoxuridine - پرنسیپس Penciclovir - اینوسین پرانوبکس Inosine pranobex - ایترافرون Interferon - پن سیکلولویر Interferon - وال آسیکلولویر Valaciclovir - زنامیویر Zanamivir .
داروهای ضد ایدز (AIDS) نیز جزء ضدویروس‌ها هستند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

- مهارکننده‌های آنزیم Nucleoside reverse transcriptase شامل: دیدانوزین Didanosine - استاودین Zidovudine - زالسیتابین Zalcitabine - لامیوودین Lamivudine
- مهارکننده‌های آنزیم Non-nucleoside transcriptase شامل: افاویرنز Efavirenz - نویراپین Nevirapine

معارکننده‌های آنزیم پروتئاز شامل: ایندیناویر Indinavir - نلفیناویر Nelfinavir - ریتوناویر Ritonavir - ساکیناویر Saquinavir

واکسن‌ها و ایمن‌سازی

خیلی از عفونت‌ها شامل بسیاری از عفونت‌های ویروسی فقط یک بار بدن را مبتلا می‌کنند؛ به این دلیل که آنتی‌بادی‌هایی که به وسیله دستگاه ایمنی علیه عامل عفونت تولید می‌شود در بدن باقی‌مانده و در آینده، حمله‌های احتمالی عامل بیماری‌زایی را که بدن نسبت به آن ایمن شده است دفع می‌کند. مدت ایمنی بدن در مقابل عوامل ایجادکننده عفونت متفاوت است و ممکن است در تمام عمر باقی بماند. برای این منظور، واکسن‌های مختلفی برای ایمن کردن بدن در مقابل عفونت‌های گوناگون تهیه می‌شود. هر میکروبی باعث تولید یک نوع خاص از آنتی‌بادی در بدن می‌شود، لذا برای هر عفونت واکسن جدایی تولید می‌شود. ایمن‌سازی حتی می‌تواند باعث ریشه‌کن شدن بعضی از بیماری‌های عفونی شود، همان‌طور که بیماری آبله در جهان ریشه کن شده است. هر واکسن ممکن است عوارض جانبی خاصی ایجاد کند که این عوارض خفیف بوده و خیلی زود ناپدید می‌شوند. قرمزی و برجستگی خفیف در ناحیه تزریق واکسن و نیز تب خفیف یا ناراحتی و مریضی شبیه آنفلوآنزا که یک یا دو روز طول می‌کشد، علایم شایعی هستند. بچه‌هایی که به بیماری‌های قدری شدیدتر از سرماخوردگی معمولی مبتلا هستند واکسینه نمی‌شوند تا بیماری آن‌ها بهبود یابد، همچنین در واکسیناسیون کودکانی که سابقه تشنج دارند (واکسن سرخک و سیاه سرفه) باید احتیاط شود. در زنان باردار و افراد دچار ضعف ایمنی، واکسن‌های زنده نباید تجویز شود.

ایمونو گلوبولین‌ها

آنتی‌بادی‌هایی که به وسیله دستگاه ایمنی بدن در مقابل سم حشرات یا مار تولید می‌شوند یا در اثر مواجهه بدن با عوامل عفونی تولید می‌شوند در سرم خون یافت می‌شوند، سرم تغییط شده افرادی که در معرض عفونت یا سموم حشرات یا مارهای زهری قرار گرفته و جان سالم به در برده‌اند ایمونو گلوبولین نامیده می‌شود.

برخی از ایمونو گلوبولین‌ها از خون اسب که در مقابل دوزهای مکرر سم قرار گرفته باشد استخراج می‌شوند. اثر ایمونو گلوبولین‌ها ظرف ۳ یا ۴ هفته از بین می‌رود. برخی از افراد به گلوبولین‌های

اسب حساس هستند و یک هفته بعد از تزریق آن دچار تب ، راش ، التهاب مفاصل و درد می‌شوند که مجموع علایم فوق بیماری « سرم » نامیده می‌شود .

واکسیناسیون در همسافرت

شما در بسیاری از کشورهای جهان در معرض عفونت‌های مختلف قرار می‌گیرید و انجام واکسیناسیون جهت پیشگیری از بیماری‌های احتمالی کار عاقلانه‌ای است . مثلاً اگر به مناطقی که در آن « تب زرد » شایع است مسافرت می‌کنید ، به یک گواهینامه بین‌المللی واکسیناسیون نیاز دارید . دوره واکسیناسیون باید تکمیل شود تا بتوان از ایجاد اینمنی کامل اطمینان حاصل کرد . گرچه واکسن‌هایی که لازم است شما هنگام مسافرت دریافت کنید ، بستگی به مناطقی دارد که می‌خواهید به آن‌ها سفر کنید اما برخی بیماری‌ها هستند که در هر نقطه‌ای از جهان احتمال ابتلاء آن‌ها وجود دارد ، مثل کزار و فلچ اطفال .

داروهای ضدتک‌باخته

تک‌باخته‌ها موجوداتی هستند تک‌سلولی که در آب و خاک زندگی می‌کنند و می‌توانند از راه آب و غذای آلوده یا نیش حشرات از انسانی به انسان دیگر منتقل شوند . انواع مختلفی از تک‌باخته‌ها وجود دارند که بسته به عضوی از بدن که تحت تأثیر قرار می‌گیرد ، بیماری‌های مختلفی ایجاد می‌کنند . برخی باعث عفونت در روده‌ها شده منجر به اسهال می‌شوند ، برخی باعث عفونت پوست و مجرای تناسلی می‌شوند و برخی به اندام‌های حیاتی مانند مغز ، ریه‌ها و کبد نفوذ می‌کنند .

تشخیص سریع تک‌باخته‌ها ، از انتشار آن‌ها جلوگیری می‌کند و در برخی موارد مانع از انتقال آن‌ها به افراد دیگر می‌شود . تک‌باخته‌ها اغلب به سختی از بدن ریشه‌کن می‌شوند ، بنابراین ضدتک‌باخته‌ها باید ماهها مصرف شوند تا بتوانند عفونت را ریشه‌کن کرده و از عود مجدد آن جلوگیری کنند . انواع عفونت‌های تک‌باخته‌ای وجود دارند که بیشتر در روده ، کبد و گاه در راه‌های تنفسی و مجرای صفوایی دیده می‌شوند . برخی از عفونت‌های تک‌باخته‌ای عبارتند از : آمیبیاز ، بالانتیدیاز ، کریپتوسپوریدیوز ، ژیاردياز ، لیشمانيوز ، توکسوپلاسموز ، تریکومونیاز ، تریپانوزومیاز و پنوموسیستیس کارینی .

داروهای ضدمالاریا

مالاریا یکی از بیماری‌های کشنده مناطق گرمسیری است و می‌تواند مردمانی را که در این نواحی زندگی می‌کنند یا به این مناطق سفر می‌کنند مبتلا سازد . این بیماری به وسیله تک‌باخته‌ای ایجاد می‌شود که چرخه زندگی پیچیده‌ای دارد .

انگل مالاریا در بدن پشه ماده آنوفل زندگی می‌کند و در قسمت دیگر از چرخه زندگی خود در بدن انسان زندگی می‌کند . هنگام گزیده شدن انسان به وسیله پشه ماده آنوفل ، این تک‌باخته از راه بزاق پشه وارد جریان خون می‌شود و در نهایت در کبد انسان جاگرفته و به طور غیرجنسی تکثیر می‌شود . علایم

مالاریا به صورت دوره‌هایی از تب بالا و سپس تعریق فراوان که منجر به لرز شدید و احساس سرما می‌شود بروز می‌کند که در صورت بروز حمله‌های شدید و عدم درمان می‌تواند باعث مرگ بیمار شود. پاسخ به درمان دارویی مالاریا شامل سه حالت می‌تواند باشد:

۱- جلوگیری از مالاریا ۲- درمان حمله‌های بیماری ۳- از بین بردن کامل مالاریا
داروهایی که برای پیشگیری از مالاریا تجویز می‌شوند عامل مالاریا را در کبد می‌کشند و از تکثیر آن جلوگیری می‌کنند. دوره درمانی داروهای ضدمالاریا باید تکمیل شود. داروها به صورت بلندمدت از بدن در برابر مالاریا محافظت نمی‌کنند.

استفاده از وسایلی مانند: نصب وسایل دفع کننده حشرات، تور ضد حشره و پوشاندن قسمت‌هایی از بدن که در معرض گزش حشره است می‌تواند در جلوگیری از مالاریا مؤثر باشد. این داروها برای کسانی که سابقه تشنجه و ناراحتی روانی دارند تجویز نمی‌شوند.

داروهای رایج ضدتکیاخته (شامل داروهای ضدمالاریا) عبارتند از:

آرتمنتر Artemether - کلروکین Chloroquine - داکسی‌سیکلین Doxycycline - هالوفانترین Halofantrine - مفلوکین Mefloquine - پریماکین Primaquine - پروگوانیل Proguanil / آتواکین Atovaquine / داپسون Dapsone - پریمتامین Pyrimethamine / (ماپریم) - کینین Quinine - پریمتامین / سولفادوکسین Sulfadoxine (fansidar) .

داروهای ضدقارچ

ما انسان‌ها به طور مداوم از راه آب، غذا و هوایی که تنفس می‌کنیم در معرض قارچ‌ها هستیم. خوشبختانه خیلی از قارچ‌ها قادر به زندگی کردن در بدن ما نیستند و تعداد کمی از آن‌ها مضر هستند. به هر حال، برخی قارچ‌ها در پوست، دهان، موها و ناخن‌ها رشد کرده و باعث تحریک ناحیه مبتلا و ایجاد تغییرات ناهنجار می‌شوند. برخی قارچ‌ها نیز می‌توانند باعث عفونت‌های جدی و کشنده شوند. این عفونت‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اثر تماس با انسان یا حیوان مبتلا به عفونت منتقل می‌شوند. عواملی چون گرما و رطوبت باعث تشديد و تسهیل بیماری قارچی می‌شوند. ضدقارچ‌ها به صورت موضعی برای درمان عفونت‌های سطحی مثل عفونت ناخن، پوست و مخاط و یا به صورت خوراکی و تزریقی برای درمان عفونت‌های قارچی استفاده می‌شوند. عفونت‌های قارچی ناحیه سر و پوست به وسیله شامپوها و کرم‌ها مداوا می‌شوند. برای عفونت واژن از شیاف واژینال یا کرم‌هایی خاص استفاده می‌شود. بسیاری از عفونت‌های نام برده ظرف یک هفته رو به بهبود می‌گذارند. ناخنی که دچار عفونت شده فقط زمانی بهبود می‌یابد که ناخن جدیدی جایگزین شود و به ماهها زمان نیاز دارد. ضدقارچ‌ها به صورت موضعی تجویز می‌شوند و عوارض چندانی ندارند اما مصرف دارو به صورت خوراکی و تزریقی می‌تواند عوارض جانبی جدی ایجاد کند.

در کشورهای توسعه یافته ، فقدان برخی مواد غذایی خاص ، به ویژه مواد گیاهی در رژیم غذایی باعث کمبود املاح یا ویتامین‌های خاصی می‌شود مثل : کمبود آهن در کم‌خونی و فقر آهن . بیماری‌های ذکر شده ، با اصلاح رژیم غذایی بهبود می‌یابند ، اگرچه برای درمان این بیماری‌ها دارو لازم است .

سوء‌غذیه با استفاده از مصرف بلندمدت مواد کمکی و اصلاح رژیم غذایی درمان می‌شود . چاقی در گذشته به وسیله داروهای کم‌کننده اشتها (آمفتابامین‌ها) درمان می‌شد اما امروزه بیشتر روی رژیم غذایی تأکید می‌شود .

گروه‌های دارویی عمدۀ این بخش عبارتند از :

- ویتامین‌ها
- مواد معدنی

ویتامین‌ها

ویتامین‌ها مواد شیمیایی پیچیده‌ای هستند که برای طیفی از فعالیت‌های بدن ضروری هستند . ویتامین‌ها (جز ویتامین D) در بدن تولید نمی‌شوند ، بلکه باید وارد بدن شوند . ویتامین‌های اصلی ۱۳ عدد هستند که عبارتند از : ویتامین‌های A ، C ، E ، K ، D ، اسیدفولیک ، بیوتین و ویتامین‌های گروه B شامل : (نیاسین) B₃ - (ریوفلاوین) B₂ - (تیامین) B₁ - (کوبالامین) B₁₂ - (پیریدوکسین) B₆ - (اسید پانتوتیک) B₅ .

بیشتر ویتامین‌ها در بدن به مقدار خیلی کم مورد نیاز هستند . ویتامین D ، در صورتی که پوست بدن در معرض نور آفتاب قرار بگیرد ، به وسیله بدن ساخته می‌شود . ویتامین‌ها بر حسب این که در چربی قابل حل باشند یا در آب ، به دو گروه عمدۀ ویتامین‌های محلول در چربی و محلول در آب تقسیم می‌شوند .

ویتامین‌های محلول در آب :

ویتامین‌های C و گروه B محلول در آب هستند . این ویتامین‌ها (به جز B₁₂) فقط دورۀ کوتاهی می‌توانند در بدن ذخیره شوند و پس از آن ، کلیه‌ها مقدار اضافی این ویتامین‌ها را از بدن دفع می‌کنند . B₁₂ می‌تواند به اندازه نیاز ۶ سال در کبد ذخیره شود . ویتامین‌های محلول در آب باید روزانه مصرف شوند و چون پختن باعث از بین رفتن این ویتامین‌ها در مواد غذایی حاوی آن‌ها می‌شود ، توصیه می‌شود از پختن غذاهای دارای این ویتامین‌ها بپرهیزید .

ویتامین‌های محلول در چربی :

ویتامین‌های A ، D ، E و K همراه چربی از دیواره روده وارد جریان خون می‌شوند که به آن‌ها ویتامین‌های محلول در چربی می‌گویند . بیماری‌هایی مثل سلیاک که روی جذب چربی به وسیله

روده اثر دارند ، می‌توانند باعث نقص در جذب این ویتامین‌ها و در نتیجه کمبود آن‌ها در بدن شوند . کبد قادر است ویتامین‌های محلول در چربی را حتی به مقدار نیاز چند سال ذخیره کند . مصرف بیش از نیاز ویتامین‌های محلول در چربی زیان‌آور است . ویتامین‌هایی مانند A ، C و E به عنوان ترکیبات آنتی‌اکسیدان شناخته می‌شوند .

یک رژیم غذایی متعادل می‌تواند از کمبود و افزایش بیش از حد ویتامین‌ها در بدن جلوگیری کند . پزشکان ، ویتامین‌ها را برای درمان کمبود ویتامین و نیز درمان برخی بیماری‌ها تجویز می‌کنند .

استفاده از ویتامین‌ها برای جلوگیری از کمبود ویتامین

مقدار ویتامین مورد نیاز بدن را به راحتی می‌توان از راه افزایش مصرف غذاهای تازه ، میوه و سبزی در رژیم غذایی تأمین کرد . گروه‌های خاصی از مردم در معرض ابتلا به کمبود ویتامین‌ها هستند . این گروه‌ها شامل افرادی است که نیاز آن‌ها به ویتامین‌ها افزایش یافته اما ویتامین دریافتی روزانه آن‌ها تغییر نکرده است مانند زنان باردار ، زنان شیرده ، نوزادان ، کودکان و افراد مسن که از همه نوع غذا نمی‌توانند استفاده کنند . همچنین افراد بی‌خانمان ، گیاهخواران (با رژیم غذایی محدود) ، مبتلایان به اختلال در جذب مواد غذایی از روده و مصرف کنندگان داروهایی که باعث کاهش جذب ویتامین‌ها از روده می‌شوند در معرض کمبود ویتامین قرار دارند .

با وجود اینکه ترکیبات دارویی حاوی ویتامین‌های مختلف به صورت OTC وجود دارند اما بهتر است در مصرف ویتامین‌ها با پزشک مشورت کنید . ویتامین‌ها را جانشین رژیم غذایی خود نکنید .

کمبود ویتامین‌ها

خیلی کم اتفاق می‌افتد که شخصی دچار کمبود تمام ویتامین‌ها شود اما در صورتی که جذب یک ویتامین از مقدار مورد نیاز آن در طی یک دوره زمانی کمتر باشد ، علایم کمبود آن ویتامین به تدریج ظاهر می‌شود . کمبود ویتامین‌های محلول در آب ، به علت ذخیره نشدن به صورت طولانی مدت در بدن ، نسبت به ویتامین‌های محلول در چربی شایع‌تر می‌باشد . هنگام درمان ، جهت رفع کمبود ویتامین مراقبت پزشکی نیز لازم است .

دیگر موارد مصرف پزشکی ویتامین‌ها

در مورد استفاده از ویتامین‌ها ، اظهار نظرهای گوناگونی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از :

- استفاده از ویتامین C با دوز بالا برای جلوگیری از سرماخوردگی خصوصاً در اطفال مؤثر است .
- کمبود مصرف روی (Zn) در رژیم غذایی در دوران کودکی باعث ضعف در پیشرفت فکری و تحصیلی کودک می‌شود .
- استفاده از ویتامین D برای درمان بیماری‌های تحلیل برنده استخوان مناسب است .

- نیاسین در شکل اسید نیکوتینیک ، برای پایین‌آوردن چربی خون تجویز می‌شود .
- استفاده از مشتقات ویتامین A (رتینوئیدها) برای درمان آکنه مفید است .
- ویتامین B₆ (پیریدوکسین) برای زنان مبتلا به سندروم پیش از قاعده‌گی برای بهبود علایم مفید است .

خطرهای و احتیاط‌های لازم در مصرف اضافی ویتامین‌ها

ویتامین‌ها در وضعیت عادی مشکلی ایجاد نمی‌کنند اما مصرف بیش از حد آن‌ها ، به خصوص ویتامین‌های محلول در چربی می‌تواند مشکل ایجاد کند . به همین خاطر میزان ویتامین تجویز شده باید با توجه به شدت کمبود ویتامین و طول دوره درمان محاسبه و تنظیم شود . دوز اضافی در بهترین حالت ، بی‌فائده است و در حالت نامطلوب بیمار را دچار عوارض می‌کند . البته مصرف مولتی ویتامین به علت کم بودن مقدار هر یک از ویتامین‌ها در آن مشکلی ایجاد نمی‌کند ، مگر اینکه مصرف آن بسیار زیاد باشد . مصرف یک نوع ویتامین ، از آن جهت که مقدار مورد نیاز ویتامین‌های دیگر را بیشتر می‌کند ، می‌تواند خطرناک باشد .

ویتامین‌ها : ۱۳ ویتامین اصلی وجود دارد که به صورت فرآورده‌هایی با اشکال مختلف دارویی عرضه می‌شوند . این ویتامین‌ها عبارتند از : ویتامین A - ویتامین C - ویتامین D - ویتامین E - ویتامین K - اسیدفولیک - بیوتین - ویتامین B₁ (تیامین) - ویتامین B₂ (ریبوفلافوین) - (نیاسین) B₃ - (اسیدپانتوتونیک) B₅ - (پیریدوکسین) B₆ و (کوبالامین) B₁₂ .

مواد معدنی

مواد معدنی از عناصری که ساده‌ترین شکل ماده هستند تشکیل شده‌اند . این عناصر با مقدار بسیار کم برای فعالیت سوخت و ساز عادی بدن ضروری هستند . یک رژیم غذایی متعادل عناصر فوق را به مقدار کافی دارد .

مواد معدنی را پزشک زمانی به صورت دارویی کمکی تجویز می‌کند که کمبود ماده معدنی تشخیص داده شود و یا برای پیشگیری و نیز درمان بیماری خاصی لازم باشد .

در بیمارانی که مبتلا به بیماری روده‌ای هستند و قادر به جذب مواد معدنی نمی‌باشند پزشک مواد معدنی تجویز می‌کند . آهن کمکی برای زنان باردار و شیرده و افراد بالای ۶ سال تجویز می‌شود .

مواد معدنی موجود در بدن عبارتند از :

کلسیم ، کروم ، مس ، فلور ، ید ، آهن ، منیزیم ، فسفر ، پتاسیم ، سلیوم ، سدیم و روی که بعضی از آن‌ها به صورت فرآورده‌های دارویی تهیه می‌شوند . یک رژیم غذایی متعادل به حد کافی مواد معدنی برای تأمین نیازهای بدن را در خود دارد .

هormون‌ها و دستگاه غدد درون‌ریز

دستگاه غدد درون‌ریز مجموعه‌ای از غده‌هایی هستند که در سراسر بدن قرار گرفته و ترشحات هورمونی خود را به داخل خون می‌ریزند.

غده هیپوفیز: در داخل جمجمه قرار دارد و هورمون‌هایی را تولید می‌کند که کنترل رشد، فعالیت‌ها، تکامل جنسی و تنظیم غدد درون‌ریز دیگر را بر عهده دارد. کار این غده تنظیم سوت و ساز بدن است.
غدد آدرنال (فوق کلیوی) : کار این غده، تولید هورمون‌هایی است که تنظیم املاح و آب بدن و مسئولیت کاهش التهاب را در بدن به عهده دارند.

غده پانکراس: کار این غده تولید هورمون گلوکاگون و انسولین است. انسولین تنظیم قندخون و گلوکاگون وظیفه کمک به عضلات و کبد برای ذخیره قند را به عهده دارد.

تخدمان‌ها: وظیفه آن‌ها تولید هورمون‌های استروژن و پروژسترون است که برای تنظیم تکامل جنسی و جسمی بدن زنان لازم است.

بیضه‌ها: مسئول تولید هورمون تستوسترون می‌باشند که مسئولیت تکامل جنسی و فیزیکی را در مردان بر عهده دارد.

اختلالات غده‌های درون‌ریز فوق، به دو صورت تولید بیش از حد و یا تولید کمتر از حد طبیعی است که در هر مورد با عوامل و علل خاصی همراه است. فرآورده‌های طبیعی هورمون‌ها یا مشتقات مصنوعی آن‌ها به صورت جایگزین در افرادی که دچار کمبود تولید آن‌ها شده‌اند به کار برده می‌شود.

برخی داروها نیز در مورد کسانی که دچار پرکاری هورمونی هستند به کار می‌روند. از هورمون‌ها برای اهداف دیگری مثل مهار فعالیت دستگاه ایمنی و نیز کنترل باروری استفاده می‌شود.

گروه‌های دارویی عمده این بخش عبارتند از:

- کورتون‌ها
- داروهای ضددیابت
- داروهای مورد استفاده در بیماری‌های غده تیروئید
- داروهای مورد استفاده در بیماری‌های غده هیپوفیز
- هورمون‌های جنسی مردانه
- هورمون‌های جنسی زنانه

کورتون‌ها (کورتیکواستروئیدها)

داروهایی هستند که از فرآوردهای طبیعی هورمون‌های قشر غده فوق‌کلیوی به دست می‌آیند و یا به صورت مصنوعی تولید می‌شوند. این فرآوردها به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:

(الف) مینرالوکورتیکوئیدها

(ب) گلوکوکورتیکوئیدها

مینرالوکورتیکوئیدها وظیفه تنظیم آب و املاح و گلوکوکورتیکوئیدها وظیفه حفظ سطح طبیعی قندخون و مقابله با التهاب و استرس را بر عهده دارند. داروهای این گروه کاربردهای بسیار متنوعی دارند. کورتون‌ها در معالجه بیماری‌هایی مانند روماتیسم مفصلی، گلومرولونفریت، لوپوس اریتماتوز، آسم، بیماری ادیسون و برخی سرطان‌ها مثل لنفوم‌ها و لوسیمی‌ها و نیز برای جلوگیری از دفع پیوند به کار می‌روند. کورتون‌ها از راه کاهش گلبول‌های سفید خون (به صورت موقت)، فعالیت دستگاه ایمنی را کاهش می‌دهند.

صرف کورتون‌ها به عنوان جایگزین هورمون طبیعی مشکل ایجاد نمی‌کند اما مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث احتباس آب در بدن، ورم پا به ویژه ناحیه قوزک پا، زخم معده، افزایش قندخون، افزایش فشارخون، تضعیف ایمنی بدن در برابر عفونت‌ها، تغییرات خلق، آکنه، صورت ماه‌گونه، ایجاد کوهان چربی در پشت، ضعف عضله‌ها، پوکی استخوان، آب مروارید، نازکی پوست، کبد شدن آسان پوست، کندی رشد در کودکان و نیز باعث کاهش تولید کورتون طبیعی در بدن می‌شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

الکلومتاژون Alclometasone - بکلومتاژون Beclometasone - بتامتاژون Betamethasone
 بودسوناید Budesonide - کلوبتاژول Clobetasole - کلوبتاژون Clobetasone - دزوکسی متازون Desoximetasone
 دیفلوکورتولون Diflucortolone - فلودروکورتیزون Fludrocortisone - فلوراندرنولون Flurandrenolone
 فلوبنیزولاید Flunisolide - فلومتاژون Flumetasone - فلوبنیزوناید Fluocinonide - فلوبنیزولون Fluocinolone
 فلوتیکازون Fluticasone - فلوبنیکازون Fluocortolone - فلوراندرنولون Flurandrenolone
 هالسینوناید Halcinonide - هیدرو کورتیزون Hydrocortisone - هیدروکورتیزون Flurandrenolone
 پردنیزولون Prednisolone - مومتازون Mometasone - پردنیزولون Methylprednisolone - تریامسینولون Triamcinolone

داروهای ضد دیابت

بخش اصلی انرژی بدن از سوزاندن گلوکز به دست می‌آید. گلوکز، قند ساده‌ای است که از شکسته شدن نشاسته و قندهای دیگر در روده ایجاد می‌شود. انسولین هورمونی است که در لوزالمعده

تولید شده و باعث برداشت و جذب گلوکز از جریان خون به داخل سلول‌ها برای مصرف یا ذخیره کردن می‌شود. در بیماری دیابت، تولید انسولین در بدن دچار نقصان می‌شود.

دیابت به دو نوع دیابت جوانان (تیپ I) و دیابت بزرگسالان (تیپ II) تقسیم می‌شود. دیابت (تیپ I) اغلب در حوالی دوره بلوغ ایجاد می‌شود و علایم آن: ادرار کردن زیاد، تشنگی زیاد، بی‌حالی، کرختی و کاهش وزن است. درمان با تزریق انسولین ممکن است. عدم درمان در این نوع دیابت می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود. دیابت تیپ (II) بعد از ۴۰ سالگی ایجاد می‌شود. علایم به تدریج و به مدت چند سال ظاهر می‌شود و خطرهای آن کمتر است. برخلاف دیابت نوع (I) در این نوع دیابت انسولین تولید می‌شود اما سلول‌های بدن در مقابل آن مقاوم هستند در نتیجه منجر به غلظت بالای قندخون می‌شود. رژیم غذایی مناسب در دیابتی‌ها عبارت است از چربی کم، فیبر زیاد، قند ساده کم و قند مرکب زیاد. اگر دیابت درمان نشود به تدریج منجر به آرترواسکلروز شده و زمینه را برای آسیب بافت‌های مختلف فراهم می‌کند. این امر می‌تواند منجر به حمله قلبی، نارسایی کلیوی، از بین رفتن بینایی و گانگرن پاها شود. در زنان باردار، عدم کنترل قندخون باعث ناهنجاری در نوزادان و نیز سقط جنین می‌شود. درمان دیابت تا حد زیادی عوارض یاد شده را کاهش می‌دهد. ضددیابت‌های خوراکی (ترکیبات سولفونیل اوره) باعث ترشح زیاد انسولین به وسیله لوزالمعده می‌شوند، به همین خاطر در دیابت تیپ (I)، ضددیابت‌های خوراکی تأثیری ندارند. انسولین مورد نیاز هر شخص دیابتی، به انرژی مورد نیاز و فعالیت روزانه او بستگی دارد و رژیم انسولین هر شخص مختص خود او است. بنابراین، شخص دیابتی نقش مهمی در روند درمان بیماری خود بر عهده دارد.

ثبت منظم قندخون به وسیله بیماران در خانه اهمیت دارد و می‌تواند مبنای تنظیم دوز انسولین در شخص باشد. در بیمارانی که انسولین می‌گیرند احتمال کاهش قندخون وجود دارد لذا شخص دیابتی باید همیشه با خود قرص یا شربت گلوکز همراه داشته باشد. در طی بارداری و بیماری نیاز شخص به انسولین افزایش می‌یابد. اگر سه علامت استفراغ، قندخون بالا و کتون بالای ادرار با هم ایجاد شوند، یک مشکل اورژانسی محسوب شده و بیمار باید در بخش مراقبت‌های ویژه زیر نظر پزشک قرار گیرد.

داروهای ضددیابت خوراکی از راه برگرداندن سطح قندخون به حالت عادی، باعث بهبود علایم بیماری می‌شوند. این داروها را ابتدا با دوز پایین تجویز می‌کنند و بعد دوز آن را افزایش می‌دهند. عوارض این داروها عبارتند از: کاهش وزن، نفخ شکم، اسهال، دل درد و تهوع.

دیابتی‌ها بهتر است کارتی را همراه داشته باشند که جزئیات درمان آن‌ها در آن ثبت شده باشد تا در موقع اورژانس به کار آید.

داروهای ضد دیابت

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

ترکیبات سولفونیل اوره شامل : کلرپروپامید Chlorpropamide - گلیبن کلامید Glibenclamide - گلیکلازید Gliclazide - گلیمپیراید Glimepiride - گلیکیدون Glibenclamide گلیپیزید Glipizide - تولبوتامید Tolbutamide - تولازامید Tolazamide .
داروهای دیگر شامل : اکاربوز Acarbose - گلوکاگن Glucagon - گورگام Guargum - انسولین Repaglinide . انسولین لیسپرو Insulin lispro - متفورمین Metformin - ریپاگلیناید Repaglinide .

داروهای هورد استفاده در درمان بیماری‌های غده تیروئید

غده تیروئید از غده‌های درون ریز بدن بوده ، هورمونی به نام تیروکسین ترشح می‌کند که کارش تنظیم سوخت و ساز بدن است . این هورمون در دوره کودکی در رشد و تکامل جسمی و روانی کودک نقش مهمی دارد .

در مجاورت تیروئید دو غده کوچک وجود دارد که پاراتیروئید نامیده می‌شوند و هورمون کلسیتونین ترشح می‌کنند . این هورمون نقش مهمی در سوخت و ساز کلسیم دارد . از بیماری‌های غده تیروئید ، پرکاری این غده است که در اثر ترشح زیاد تیروکسین ایجاد می‌شود و باعث بروز علایمی مانند اضطراب ، تپش قلب ، کاهش وزن ، افزایش اشتها ، عدم تحمل گرما و اسهال می‌شود . گواتر از بیماری‌های این غده است که طی آن تیروئید متورم و بزرگ می‌شود . این بیماری در طی بلوغ یا بارداری می‌تواند به طور موقت ایجاد شود که با مصرف « ید » در مواد غذایی مانند نمک یددار ، می‌توان از آن جلوگیری کرد . برای درمان پرکاری تیروئید ۳ روش وجود دارد :

- ۱) استفاده از داروی کربی‌مازول Carbimazole برای جلوگیری از ترشح تیروکسین .
- ۲) استفاده از ید رادیواکتیو Radio - Iodine برای کاهش ترشح تیروئید .
- ۳) جراحی (در صورت بزرگ شدن تیروئید و بسته شدن راه تنفس) .

کمکاری تیروئید ، بیماری دیگر غده تیروئید است . علت این بیماری کاهش تولید تیروکسین است . علایم آن عبارت است از : افزایش وزن ، کندی ذهن ، خشکی پوست ، ریزش موی سر ، افزایش حساسیت به سرما و شدت عادت ماهیانه در بانوان . در کودکان ، کمکاری تیروئید باعث عقب‌ماندگی ذهنی و جسمی دائمی می‌شود . برای درمان کمکاری تیروئید ، از هورمون تیروئید مصنوعی به عنوان جایگزین هورمون طبیعی بدن استفاده می‌شود که عوارض ندارد ولی مصرف بیش از حد آن منجر به بروز علایم پرکاری می‌شود .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

داروهای مورد استفاده در کم کاری تیروئید شامل : لیوتیرونین Liothyronine - تیروکسین Iodine - Carbimazole - کربیمازول - یود Radio - iodine .
داروهای مورد استفاده در پر کاری تیروئید شامل : ندالول Nadolol - پروپرانولول Propylthiouracil - پروپیل تیواوراسیل - یود رادیواکتیو Radio - iodine .

داروهای هورد استفاده در درمان بیماری های غده هیپوفیز

این غده در قاعده مغز قرار گرفته و وظیفه تنظیم رشد فیزیکی ، سوخت و ساز بدن ، تکامل جنسی و تولید مثل را بر عهده دارد . بیشتر این هورمون ها به صورت غیر مستقیم از راه تحریک غدد دیگر مثل تیروئید ، آدرنال ، تخمدان ها و بیضه ها عمل می کنند .

- **هورمون تحریک کننده تیروئید** : باعث تحریک تولید هورمون های تیروئید به وسیله این غده می شود .
 - **هورمون پرولاکتین** : در زن ها باعث تحریک تولید شیر به وسیله پستان می شود و در مردان باعث کمک به تولید اسپرم می شود .
 - **هورمون کورتیکوتروپین** : باعث تولید کورتیکواستروئیدها و آزادسازی آن ها توسط غده فوق کلیوی می شود .
 - **گندوتروپین ها** : هورمون هایی هستند که باعث تولید و آزاد سازی تخمک در زن ها و باعث تولید اسپرم در مردان می شوند . همچنین این هورمون ها (FSH ، LH) کنترل کننده تولید استروژن ، پروژسترون و تستوسترون نیز هستند .
 - **هورمون رشد** : تحریک کننده فرآیند رشد طبیعی و تکامل است .
 - **هورمون تحریک کننده ملانوسیت ها** : کنترل تولید رنگ دانه های پوستی را بر عهده دارد .
 - **هورمون آنتی دیورتیک** : تنظیم کننده مقدار آب موجود در ادرار یا حجم ادرار است .
- عوامل دیگری باعث تولید غیر طبیعی هورمون های هیپوفیز می شوند مانند : تومورهای هیپوفیز ، رادیوتراپی و داروها .

شایع ترین بیماری های غده تیروئید که دارای درمان دارویی هستند ، عبارتند از : اختلال در تولید هورمون رشد ، اختلال در تولید هورمون آنتی دیورتیک ، اختلال در تولید هورمون پرولاکتین و اختلال در تولید گندوتروپین ها .

دروهای مورد استفاده در بیماری‌های هورمون رشد

اگر تولید هورمون رشد کم باشد و با آزمایش نیز ثابت شود، سوماتروپین (شکل مصنوعی هورمون رشد) به صورت تزریقی استفاده می‌شود که اگر در سال‌های پایین تجویز آن شروع شود، باعث رشد طبیعی شخص می‌شود. گاه هورمون رشد بیش از حد تولید می‌شود که منجر به بیماری ژیگانتیسم در کودکان و آکرومگالی در بزرگسالان می‌شود. تومور غده هیپوفیز می‌تواند باعث تولید بیش از حد هورمون رشد شود. داروهایی مثل برومکریپتین، سطح هورمون رشد را کاهش می‌دهند.

دروهای مورد استفاده در درمان دیابت اینسیپیدوس (دیابت بی‌هزه)

هورمون آنتی‌دیورتیک ADH که از هیپوفیز ترشح می‌شود، وظیفه بازگرداندن آب رد شده از فیلتر کلیه را به جریان خون بر عهده دارد. کمبود ADH باعث از دست رفتن آب بدن می‌شود که این اختلال، بیماری دیابت بی‌مزه نامیده می‌شود و علامت آن تشنجی زیاد و ادرار کردن زیاد است. هورمون ADH با شکل مصنوعی آن به نام دسموپرسین برای درمان این بیماری تجویز می‌شود و نیز از دیورتیک‌هایی مانند Chlortalidone استفاده می‌شود.

دروهای مورد استفاده برای کاهش سطح هورمون پرولاکتین

وظیفه این هورمون تحریک تولید شیر توسط پستان در زن‌ها است و نیز در مردان به تولید اسپرم طبیعی کمک می‌کند. بیماری‌های این قسمت بیشتر در مورد تولید بیش از حد آن است که باعث تولید شیر بدون علت خاص در زن‌ها می‌شود که گالاکتوره نامیده می‌شود. از عوارض تولید زیاد پرولاکتین می‌توان فقدان عادت‌های ماهیانه و عدم باروری در زنان، ناتوانی جنسی، ناباروری و تولید شیر در آقایان را نام برد. برای کاهش سطح پرولاکتین و درمان اختلالات ناشی از آن، برومکریپتین Bromocriptine یا کابرگولین Cabergoline تجویز می‌شود.

دروهای رایج مورد استفاده در درمان بیماری‌های غده هیپوفیز عبارتند از :

- Bromocriptine – داروهای مورد استفاده در اختلالات هورمون رشد شامل: برومکریپتین Lanreotide – اکترنوتید Octreotide – سوماتروپین Somatotropin .
- Carbamazepine – داروهای مورد استفاده در بیماری دیابت اینسیپیدوس شامل: کاربامازپین
- Desmopressin – کلرتالیدون Chlortalidone – دسموپرسین Chlorpropamide کلرپروپامید – وازوپرسین Vasopressin (ADH) .

دروهای مورد استفاده در کاهش سطح پرولاکتین شامل:

- Quinagolide – کابرگولین Cabergoline – کیناگولاید Bromocriptine برومکریپتین .

هورمون‌های جنسی مردانه

هورمون‌های جنسی مردانه یا آندروژن‌ها مسئول ایجاد صفات ثانویه جنسی در مردان هستند و تولید آن‌ها از سن بلوغ به وسیله بیضه‌ها شروع می‌شود. در زنان مقدار کمی از این هورمون‌ها به وسیله غده آدرنال تولید می‌شود که کارکرد آن مشخص نیست. مهم‌ترین هورمون دسته آندروژن‌ها تستوسترون است که دو کارکرد عمده دارد: ۱- کارکرد آنابولیک که باعث افزایش سرعت رشد و افزایش حجم عضلات می‌شود. ۲- کارکرد آندروژنیک که باعث بروز صفات ثانویه جنسی مانند: رویش مو در بدن، کلفتی صدا و بزرگ شدن اندام‌های تناسلی می‌شود. هورمون‌های جنسی مردانه برای موارد زیر تجویز می‌شوند: ۱- کسانی که دچار نقص در تولید هورمون‌ها هستند. ۲- تقویت قدرت جنسی در مردان. ۳- تحریک شروع بلوغ در نوجوانانی که دچار تأخیر بلوغ هستند.

استفاده از تستوسترون، منجر به عارضه کاهش تولید اسپرم می‌شود. خطر این داروها بیشتر متوجه زنان مبتلا به سرطان پستان (که با دوز بالا، دارو مصرف می‌کنند) و پسرانی که دچار تأخیر در بلوغ جنسی هستند و دارو مصرف می‌کنند، می‌باشد. زنان، دچار عوارض ثانویه جنسی مردانه مثل کلفتی صدا و زمختی صورت و پستان، دچار رشد غیرطبیعی استخوان‌های اندام‌ها می‌شوند.

استروئیدهای آنابولیک

این داروها به صورت مصنوعی تولید می‌شوند و تجویز آن‌ها به افزایش رشد بدن و حجم عضلات کمک می‌کند. پزشکان از این ترکیبات همراه با رژیم غذایی پُرپرتوئین برای کمک به ترمیم سلامتی جسمی شخص بعد از عمل جراحی سنگین یا بیماری‌های جدی استفاده می‌کنند.

ورزشکاران برای افزودن قدرت بدنی، افزایش حجم عضلات و افزایش توانایی انجام ورزش‌های سنگین‌تر و طولانی‌تر از این ترکیبات استفاده می‌کنند. متخصصان تربیت بدنی و پزشکان به خاطر داشتن برخی عوارض مانند کوچک شدن بیضه در مردان، احتباس آب در بدن، ایجاد آکنه، کاهش باروری در زنان، افزایش احتمال برخی سرطان‌ها و عوارض متعدد دیگر، استفاده طولانی مدت از این داروها را مفید نمی‌دانند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- . Testosterone . Testosterolone - تستوسترون
- Oxymetholone - ناندرولون Nandrolone - اکسیمتالون
- استانوزولول Stanozolol

داروهای دارای اثر ضدآندروژنی شامل: سیپروترون Cyproterone - فیناستراید Finasteride

هورمون‌های جنسی زنانه

هورمون‌های جنسی زنانه عبارتند از استروژن و پروژسترون که به وسیله تخمدان‌ها تولید می‌شوند. پروژسترون مسئول رشد دیواره رحم جهت آماده‌سازی برای کاشته شدن تخمک بارور شده به وسیله اسپرم است و نیز وظیفه ادامه باروری را بر عهده دارد. استروژن مسئول بروز صفات ثانویه جنسی مثل بزرگ شدن لگن و پستان‌ها در زنان است. نوسانات استروژن و پروژسترون باعث ایجاد عادت ماهیانه می‌شود. تولید این دو هورمون از بلوغ تا یائسگی ادامه دارد. اشکال مصنوعی این هورمون‌ها برای تهیه ضدبارداری‌های خوراکی، تنظیم اختلالات عادت ماهیانه و درمان سرطان‌های حساس به این هورمون‌ها کاربرد دارند.

یائسگی (منوپوز): پدیده‌ای است که به طور طبیعی اتفاق می‌افتد و طی آن دوره‌های عادت ماهیانه متوقف می‌شود. در طی یائسگی سطح هورمون‌ها کاهش یافته و منجر به بروز علایمی مانند گرگرفتگی و عوارض بلندمدتی مثل پوکی استخوان و تصلب شرائین می‌شود.

برای پیشگیری از این عوارض در زنان یائسه، جایگزینی این هورمون‌ها با استروژن و پروژسترون که **HRT** (Hormone Replacement Therapy) نامیده می‌شود، توصیه می‌گردد. **HRT** از عوارض یائسگی جلوگیری می‌کند یا آن را به تأخیر می‌اندازد. همچنین در زنانی که به علل مختلفی مثل برداشتن تخمدان‌ها با جراحی دچار یائسگی زودرس می‌شوند تجویز می‌شود و در مواردی که بلوغ به تأخیر افتاد ۳ تا ۶ ماه درمان با این هورمون‌ها انجام می‌شود.

عوارض **HRT** عبارتند از حساسیت پستان‌ها، سردرد، سرگیجه و افسردگی که مصرف با دوز پایین عوارض را برطرف می‌کند. زنان سیگاری، زنان مبتلا به فشارخون و اختلالات قلبی - عروقی و نیز زنان دچار افزایش وزن در مصرف آن احتیاط کنند.

آثار HRT روی اندام‌های مختلف بدن

این جایگزینی هورمون علاوه بر بهبود علایم یائسگی، آثار مفیدی روی قسمت‌های مختلف بدن دارد که عبارتند از:

در مغز: **HRT** خطر حمله مغزی را کاهش می‌دهد و نقش مؤثری در جلوگیری از آلزایمر و پارکینسون ایفا می‌کند.

در قلب: **HRT** با جلوگیری از آترواسکلروز، خطر بیماری‌های عروق کرونر را کاهش می‌دهد.

در پستان‌ها: **HRT** خطر سرطان پستان را در کسانی که به صورت طولانی مدت از آن استفاده می‌کنند، افزایش می‌دهد.

در استخوان‌ها : HRT از نازک و ظریف شدن استخوان‌ها جلوگیری می‌کند و باعث افزایش مقاومت استخوان‌ها در برابر شکستگی می‌شود.

در اندام‌های جنسی : HRT از نازک شدن دیواره واژن که باعث ایجاد مقابله دردناک می‌شود جلوگیری می‌کند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

استروژن‌ها شامل : استروژن کانژوگه Conjugated estrogens – استرادیول Estradiol – استریول Estropipate – استرانول Estraneol – مترانول Mestranol – تیبولون Tibolone . Diethylstilbestrol

پروژستوژن‌ها شامل : دیدروژسترون Dydrogesterone – هیدروکسی پروژسترون Hydroxyprogesterone – مدروکسی پروژسترون Levonorgestrel – نورژسترن Progesterone – نورژسترن Norethisterone – نورژسترن Norgestrel – رالوکسیفن Raloxifene

دستگاه تنفس

دستگاه تنفس شامل دو ریه و راه‌های هوایی است. عمل دم و بازدم را تنفس گویند که در آن، بدن اکسیژن مورد نیاز را گرفته و دی‌اکسیدکربن (ماده زاید در فرآیندهای حیاتی اصلی بدن) را دفع می‌کند. اشکالات موجود در دستگاه تنفس ممکن است در اثر باریک و تنگ شدن مجاری هوایی ایجاد شوند مانند برونشیت و آسم یا ناشی از ورم دیواره مجاری هوایی باشند مانند آسم و برونشیولیت یا در اثر تخریب کیسه‌های هوایی ایجاد شوند مانند آمفیزم یا در اثر تحریک و مسمومیت ناشی از دود سیگار و آلودگی هوا ایجاد شوند مانند سرطان ریه یا در اثر عفونت بافت ریه ایجاد شوند مانند ذات‌الریه و یا در اثر احتقان ریه ، ناشی از نارسایی قلب ایجاد شوند . علایم اختلالات دستگاه تنفس معمولاً شامل سرفه و احساس سفتی و سنگینی در قفسه سینه می‌باشند . طیفی از داروها در درمان اختلالات تنفسی به کار می‌روند . برخی مجاری تنفسی را تمیز می‌کنند ، برخی باعث کاهش تورم می‌شوند و برخی تولید موکوس را کم می‌کنند .

گروه‌های دارویی عمده این بخش عبارتند از :

- ۱- برونکودیلاتورها (گشادکننده‌های مجاری هوایی ریه)
- ۲- داروهای ضدسرفه
- ۳- داروهای ضداحتقان
- ۴- داروهای ضدآلرژی شامل کورتون‌ها و آنتی‌هیستامین‌ها
- ۵- داروهای مورد استفاده در درمان عفونت‌ها شامل آنتی‌بیوتیک‌ها

برونکودیلاتورها (گشادکننده‌های مجاری هوایی ریه)

هوایی که وارد ریه می‌شود از لوله‌های باریکی به نام برونشیول عبور می‌کند . در بیماری آسم یا برونشیت این لوله‌ها باریک شده و باعث اختلال در عبور هنوا می‌شوند . برونکودیلاتورها داروهایی هستند که با گشاد کردن برونشیول‌ها باعث آسانی در عبور هوا می‌شوند .

برونکودیلاتورها ۳ دسته‌اند : ۱- داروهای سمپاتومیمتیک ۲- داروهای آنتی‌کولینرژیک ۳- ترکیبات گزانتین (از خانواده کافئین) . این داروها از راه منبسط کردن عضلات صاف موجود در دیواره مجاری هوایی ریه باعث گشاد شدن این مجاری می‌شوند .

داروهای گروه ۱ و ۲ از راه تأثیر روی پیام‌های عصبی که به ماهیچه‌های دیواره مجاری هوایی ارسال می‌شوند ، تأثیر می‌گذارند . تأثیر داروهای گروه ۳ ، از راه تأثیر مستقیم روی عضلات صاف دیواره مجاری هوایی است ، گرچه نحوه اثر آن به طور دقیق مشخص نیست .

برونکودیلاتورها چون به صورت استنشاقی تجویز می‌شوند عوارض چندانی ندارند. با این وجود گزانتین‌ها و سمپاتومیمتیک‌ها در بیماران قلبی و فشارخونی با احتیاط مصرف شود و نیز آنتی‌کولینرژیک‌ها در کسانی که مبتلا به گلوکوم هستند و نیز احتیاض ادرار دارند باید با احتیاط تجویز شوند. داروهای آنتی‌کولینرژیک باعث خشکی دهان، دوبینی، بیوست و اختلال در دفع ادرار می‌شوند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

سمپاتومیمتیک‌ها شامل: بامبوترول **Bambuterol** – افورموترول **Eformoterol** – افردرین **Ephedrine** – اپی‌نفرین **Epinephrine** – فنوترول **Fenoterol** – رپروترول **Reprotorol** – سالبوتامول **Tulobuterol** – سالمترول **Salmeterol** – تربوتالین **Terbutaline** – تولبوتالین **Salbutamol**.

آنتی‌کولینرژیک‌ها شامل: ایپراتروپیوم بروماید **Ipratropium Bromide** – اکسی تروپیوم **Oxitropium**.

گزانتین‌ها شامل: تئوفیلین **Theophyline** – آمینوفیلین **Aminophyline**.

کورتیکواستروئیدها شامل: بکلومetasون **Beclometasone** – بودسونايد **Budesonide** – فلوتیکازون **Fluticasone** – پردنیزولون **Prednisolone**.

داروهای دیگر شامل: آنتی‌هیستامین‌ها **Ketotifen** – کتوتیفن **Antihistamines** – ندوکرومیل **Nedocromil** – سدیم کروموجلیکات **Sodium Cromoglycate**.

داروهای ضداحتقان

علت گرفتگی بینی، ورم لایه مخاطی بینی و ترشح بیش از حد موکوس در اثر تورم است. این تورم ممکن است ناشی از یک عفونت باشد مثل سرماخوردگی یا ناشی از یک حساسیت آلرژیک باشد مثل رینیت آلرژیک و یا ممکن است در اثر سینوزیت باشد. ضداحتقان‌ها باعث کاهش تورم و کاهش تولید موکوس در سینوس‌ها و مجرای بینی می‌شوند. بسیاری از موارد سرماخوردگی و انسداد مجرای بینی نیاز به درمان دارویی ندارد و استنشاق بخار مؤثر است اما در مواردی مثل عفونت عودکننده گوش میانی یا عفونت سینوس‌ها باید از دارو استفاده کرد. ضداحتقان‌ها به طور مستقیم به شکل قطره یا اسپری و به صورت موضعی عرضه می‌شوند و نیز به شکل خوراکی یا به صورت OTC وجود دارند. ضداحتقان‌ها با تأثیر روی پیام‌های عصبی شاخه‌های اعصاب سمپاتیک، باعث باریک شدن رگ‌های خونی و کاهش ت وزم می‌شوند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

داروهایی که به صورت موضعی تجویز می‌شوند شامل : افرین Ephedrine - اپروتروپیوم بروماید — Oxymetazoline - گزیلومتاژولین Xilometazoline - اکسیمتازولین Iproteriopiumbromide فنیل افرین Phenilephrine .

داروهایی که به صورت خوراکی تجویز می‌شوند شامل : افرین Ephedrine - فنیل افرین . Pseudoephedrine - فنیل پروپانول آمین Phenylpropanolamine - سودوافرین Phenylephrine .

داروهای ضدسرفه

سرفه پاسخی طبیعی به تحریک ریه و راههای هوایی است که در اثر عوامل عفونی ، التهاب یا تماس مجاری هوایی و ریه با مواد مضرّ مثل دود سیگار ایجاد می‌شود . سرفه ممکن است خشک یا خلطدار باشد . سرفه به دفع مواد مضرّ و خلط زیادی از ریه و مجاری هوایی کمک می‌کند . در سرفه‌های شدید ، داروی ضدسرفه نیاز است .

سرفه‌های خلطدار : اگر اقداماتی نظیر بخور دادن مؤثر واقع نشد ، داروهای موکولیتیک و اکسپکتورانت تجویز می‌شود .

موکولیتیک‌ها با نرم کردن خلط ، دفع آن را راحت‌تر می‌کنند ، از شدت سرفه می‌کاهند و معمولاً به صورت استنشاقی تجویز می‌شوند . ترکیبات اکسپکتورانت مانند کلرید آمونیم به صورت خوراکی برای کاستن از شدت سرفه تجویز می‌شوند .

سرفه‌های خشک : داروهای مورد استفاده در درمان این نوع سرفه از راه مهار مرکز سرفه در مغز عمل می‌کنند . برای سرفه‌های خشک خفیف از آنتی‌هیستامین‌ها استفاده می‌شود . برای تسکین سرفه‌های مقاوم از کلئین استفاده می‌شود . تمام داروهای ضدسرفه اثر آرامبخش دارند و باعث خواب آسودگی می‌شوند .

انتخاب داروی ضدسرفه

طیف وسیعی از فرآوردهای OTC برای درمان سرفه عرضه می‌شوند . گاه این داروها شامل چند جزء اصلی مانند یک ترکیب ضدسرفه‌های خلطدار و یک ضدسرفه مخصوص سرفه‌های خشک هستند . ضدسرفه‌ها گرچه سرفه را تسکین می‌دهند اما گاه می‌توانند مضرّ باشند . در صورتی که سرفه بیش از چند روز طول بکشد یا با خون و تب یا علایم دیگر همراه باشد ، بررسی‌های تشخیصی بیشتری لازم است . ضدسرفه‌ها دارای یک مسكن خفیف مثل استامینوفن ، یک ضدسرفه ، یک آنتی‌هیستامین و گاه کافئین هستند .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

ترکیبات اکسپکتورانت **Expectorants** شامل : کلرید آمونیم **Ammonium chloride** – گوایفنزین **Guaifenesine**

موکولیتیک‌ها شامل : کربوسیستئین **Carbocysteine** – دورناز آلفا **Dornase Alfa** – مسیستئین **Mecysteine**

. بُخورها شامل : اوکالیپتوس **Eucalyptus** – منتول **Menthol**

ضدسرفه‌های مخدر شامل : کدئین **Codeine** – فولکودین **Pholcodine** – دکسترومفورفان **Dextromethorphan**

. ضدسرفه‌های غیر مخدر شامل : آنتی‌هیستامین‌ها **Antihistamines**

بدخیم‌ها و بیدمایهای دستگاه ایمنی

بدن برای ترمیم جراحات و جایگزین کردن سلول‌هایی که به طور طبیعی می‌میرند و نابود می‌شوند نیاز به سلول‌های جدید دارد. تولید سلول‌های جدید در حالت عادی با دقت فراوانی کنترل می‌شود. گاه تکثیر کنترل نشده سلول‌ها منجر به تشکیل توده‌ای از بافت غیرطبیعی یا زگیل و یا ندول می‌شود. اگر بافت غیرطبیعی در جای خود بماند و به بافت‌های اطراف دست اندازی نکند توده خوش‌خیم نامیده می‌شود، ولی اگر باعث تخریب بافت‌های اطراف شود، توده بدخیم نامیده می‌شود. مقابله با توده‌های بدخیم سلطانی بر عهده دستگاه ایمنی می‌باشد.

تومورهای بدخیم به چند گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از: سارکوم‌ها، کارسینوم‌ها، لنفوم و لوسمی. سارکوم‌ها: بافت‌های عضلانی، استخوانی، بافت پیوندی و پوشش داخل رگ‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کارسینوم‌ها: پوست و لایه پوششی اعضای داخلی بدن و غدد را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

لنفوم: غدد لنفاوی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

لوسمی: گلبول‌های سفید خون را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گروه‌های دارویی عمدۀ این بخش عبارتند از:

- ۱- داروهای ضدسرطان
- ۲- داروهای مهار کننده دستگاه ایمنی
- ۳- داروهای مورد استفاده در بیماری AIDS

داروهای ضدسرطان

سرطان یک واژه کلی است که طیفی از بیماری‌ها از لوسمی تا تومورهای جامد پستان، ریه و ارگان‌های دیگر را در بر می‌گیرد. در همه سرطان‌ها، گروهی از سلول‌ها از کنترل طبیعی بدن خارج شده و در بدن تکثیر و پراکنده می‌شوند که در نتیجه سلول‌های بدخیم افزایش می‌یابند و باعث مختل شدن کارکرد طبیعی عضوی می‌شوند که دچار سرطان شده است.

سلول‌های بدخیم، کارکرد یک سلول طبیعی را ندارند. سلول‌های سلطانی می‌توانند از راه جریان خون یا سایر راه‌ها در قسمت‌های مختلف بدن پراکنده شده و ضمن جایگزین شدن در قسمت‌های مختلف تکثیر شده و توده‌های جدیدی از سلول‌های سلطانی را به وجود آورند که این فرآیند، متاستاز

نامیده می‌شود. این توده‌ها به اعصاب فشار می‌آورند، جریان خون را مسدود می‌کنند و باعث تخریب بافت‌های اطراف خود می‌شوند. عوامل متعددی محرک ایجاد سرطان هستند که عبارتند از وراثت، عوامل محیطی و نقص دستگاه ایمنی. عوامل محیطی ایجاد سرطان عبارتند از: نور شدید خورشید، دود تنباکو، تابش اشعه مواد رادیواکتیو، برخی مواد شیمیایی خاص، ویروس‌ها و عوامل تغذیه‌ای. درمان سرطان شامل جراحی برای برداشتن بافت سلطانی، رادیوتراپی و شیمیوتراپی می‌باشد. استفاده از هورمون‌ها برای درمان سرطان‌های حساس به هورمون، مثل سرطان پستان، سرطان رحم و سرطان‌های پروستات رایج است. داروهای سیتوتوکسیک برای درمان سرطان‌های دارای رشد سریع شامل لنفوم، لوسمی و برخی سرطان‌های بیضه مفید می‌باشند. این داروها روی سرطان روده و پستان که رشد کنترلی دارند، اثر کمتری دارند. امروزه شیمی‌درمانی بعد از عمل جراحی سرطان، برای از بین بردن سلول‌های سلطانی باقیمانده در بدن رایج است. چون داروها عوارض زیادی دارند، شیمی‌درمانی زمانی تجویز می‌شود که به درمان بیماری یا افزایش عمر بیمار کمک کند. نوع داروی مورد استفاده به نوع سرطان شخص و وضعیت او بستگی دارد.

عوارض داروهای ضدسرطان عبارتند از: تهوع و استفراغ که باید برای کنترل آن‌ها از داروهای ضدتهوع استفاده شود. داروها روی سلول‌های خونی تأثیر گذاشته و منجر به ریزش موی سر می‌شوند که بعد از شیمی‌درمانی، موی سر دوباره جایگزین می‌شود. گاه بیمار به خاطر سرنوشت بیماری اش دچار افسردگی می‌شود که داروهای ضدافسردگی لازم است. همه سرطان‌ها با دارو درمانی از بین نمی‌روند و از روش‌های دیگر مثل جراحی باید استفاده نمود. سرطان‌هایی که به وسیله شیمی‌درمانی درمان می‌شوند عبارتند از:

- لوسمی حاد (نوعی سرطان خون)
- کوریوکارسینوم (سرطان جفت)
- تومورهایی که سلول‌های تولید کننده تخم و اسپرم را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
- تومور ویلمز (نوعی سرطان کلیه در کودکان)
- تومور بیضه

□ برخی سرطان‌های دستگاه لنفاوی شامل بیماری هوچکین

سرطان‌هایی که شیمی‌درمانی در آن‌ها باعث درمان بیماری نمی‌شود اما نتایج مفیدی دارد عبارتند از:

- سرطان پستان
- سرطان تخم‌دان
- برخی از لوسمی‌ها

- مالتیپل میلوما (نوعی سرطان استخوان)
- انواع سرطان ریه
- سرطان‌های سر و گردن
- سرطان معده
- سرطان پروستات
- بعضی از سرطان‌های دستگاه لنفاوی
- سرطان مثانه
- سرطان سلول‌های جزیره‌ای پانکراس
- سرطان اندومتر
- سرطان مری
- سرطان روده بزرگ

سرطان‌هایی که شیمی‌درمانی در آن‌ها تأثیر مثبتی ندارد عبارتند از :

- سرطان غده تیروئید
- ملانوم بدھیم (نوعی سرطان پوست)
- سرطان گردن رحم
- سرطان کلیه
- سرطان مغز در بزرگسالان
- سرطان کبد
- سرطان پانکراس

خطرهای و احتیاط‌های ضروری

داروهای سیتوتوکسیک روی فعالیت سلول‌های طبیعی بدن تأثیر دارند که بیشترین تأثیر، روی سلول‌های مغز استخوان می‌باشد. این امر موجب کاهش تولید گلبول‌های قرمز، پلاکت‌ها و گلبول‌های سفید می‌شود و در نتیجه بیمار چار کم‌خونی، کاهش پلاکت خون و افزایش خطر خونریزی و افزایش استعداد ابتلا به عفونت می‌شود. در افراد تحت شیمی‌درمانی، سرعت ترمیم زخم‌ها کند می‌شود و تخریب سلول‌های سرطانی اسید اوریک را افزایش داده و باعث ایجاد نقرس می‌شود. به علت عوارض جانبی مانند کم‌خونی و عفونت ممکن است تزریق خون و استفاده از آنتی‌بیوتیک ضرورت داشته باشد. در زن‌ها به علت عوارض شیمی‌درمانی روی جنین باید از وسایل ضدبارداری استفاده شود.

داروهای رایج این بخش عبارتند از :

- عوامل آکتیل کننده شامل : کلرامبوسیل Chlorambucil - سیکلوفسفاماید Cyclophosphamide - ملفالان Melphalan
- آنتی‌متاپولیت‌ها شامل : آزاتیوپرین Azathioprine - سیتارابین Cytarabine - فلوراوراسیل Fluorouracil
- آنتی‌بیوتیک‌های سیتو توکسیک شامل : آناستروزول Anastrozole - بیکالوتامید Bicalutamide
- درمان‌های هورمونی شامل : سیپروترون استات Cyproterone acetate - فلوتامید Flutamide
- فورمستان Leuprorelin - گازرلین Goserelin - لتروزول Letrozole - لوپرورولین Megestrol - تاموکسیفن Tamoxifen
- سیتوکاین‌ها شامل : اینترفرون آلفا Interferon alfa - اینترلوكین Interleukin
- تاکسن‌ها شامل : دوستاکسل Docetaxel - پاکلیتاکسل Paclitaxel
- داروهای دیگر شامل : کربوپلاتین Carboplatin - سیسپلاتین Cisplatin - اتوپوزاید Rituximab - ایرینوتوکان Irinotecan - ریتوکسیماب Etoposide

داروهای مهارکننده ایمنی

دستگاه ایمنی بدن وظیفه از بین بردن قارچ‌ها، میکروب‌ها و ویروس‌هایی که به بدن حمله کرده‌اند را به عهده دارد. دستگاه ایمنی از دو راه این کار را انجام می‌دهد:

۱. به وسیله سلول‌هایی که لنفوسیت‌های B نام دارند و پروتئین‌هایی به نام آنتی‌بادی ترشح می‌کنند.
۲. به وسیله سلول‌هایی که لنفوسیت‌های T نام دارند و به طور مستقیم به عوامل مهاجم حمله کرده و آن‌ها را از بین می‌برد. چند گروه از داروها به عنوان مهارکننده‌های دستگاه ایمنی استفاده می‌شوند که عبارتند از:

- داروهای ضدسرطان که تولید همه سلول‌ها را در مغز استخوان کند می‌کنند.
 - کورتون‌ها که فعالیت سلول‌های B و T را کاهش می‌دهند.
 - سیکلوسپورین که فقط سلول‌های T را مهار می‌کند و اثری روی سلول‌های B ندارد.
- مهارکننده‌های دستگاه ایمنی، قبل و بعد از پیوند عضو نیز تجویز می‌شوند و ممکن است مدت زمان نامحدودی تجویز آن‌ها ضروری باشد. امروزه سیکلوسپورین و تاکرولیموس پرکاربردترین داروهای مورد استفاده در پیوند اعضاء هستند. مهارکننده‌های دستگاه ایمنی یا تولید سلول‌های ایمنی را کاهش می‌دهند

و یا فعالیت آن‌ها را تعییر می‌دهند اما ضایعات ایجاد شده را ترمیم نمی‌کنند. این داروها حتی می‌توانند بیماری را به طور موقت متوقف کنند اما باعث ایجاد عوارض مختلفی مانند تهوع و استفراغ شوند.

خطرهای و احتیاط‌های لازم

داروهای ضدسرطان با تضعیف دستگاه ایمنی بدن، احتمال عوارض جانبی را افزایش می‌دهند. این داروها با سرکوب فعالیت مغز استخوان، باعث کاهش تولید پلاکت‌ها و سلول‌های قرمز خون شده و منجر به کم‌خونی و اختلال در انعقاد خون می‌شوند.

سیکلوسپورین باعث صدمه به کلیه شده و دوز بالای آن روی مغز اثر منفی گذاشته، باعث توهم و تشنج می‌شود و نیز بالا رفتن فشارخون از عوارض آن است.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- داروهای ضدسرطان شامل: آزاتیوپرین Azathioprine - کلامبوسیل Chlorambucil

سیکلوفسفاماید Cyclophosphamide - متوترکسات Methotrexate - میکوفنولات موفتایل Mycophenolate Mofetil

آنترادی‌ها شامل: گلوبولین آنتی‌لنسوسیت Anti - lymphocyte globulin - باسیلیکسیماب

. Daclizumab - Basiliximab

. Tacrolimus - سیکلوسپورین Ciclosporin - تاکرولیموس

کورتون‌ها: (در قسمت‌های دیگر کتاب توضیح داده شده‌اند).

دستگاه شنوایی و دستگاه بینایی

چشم‌ها و گوش‌ها اندام‌های حسی هستند که انسان را در شناسایی محیط پیرامون خویش یاری می‌دهند. چشم اندام بینایی است که علایم نوری را به علایم عصبی تبدیل می‌کند تا به وسیله مغز مورد تفسیر قرار گیرد.

گوش فقط مسئول تشخیص صداها نیست بلکه عضو مسئول حفظ تعادل بدن نیز در گوش قرار دارد. گوش از ۳ قسمت گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی تشکیل شده است. بیماری‌های شایع گوش و چشم، عفونت‌ها و التهاب‌ها هستند. گوش میانی و خارجی، بیشتر از گوش داخلی دچار عفونت می‌شوند.

بیماری گلوکوم، یک بیماری چشمی است که در اثر آن، افزایش فشار مایع زلالیه ضایعاتی به چشم وارد می‌کند. بیماری دیابت نیز باعث ایجاد ضایعاتی در چشم می‌شود و یا ایجاد آب مروارید می‌کند. بیماری‌هایی مثل تجمع جرم در گوش خارجی و سرگیجه و بیماری منیر (MENIERES DISEASE) نیز دستگاه شنوایی را درگیر می‌کنند. از آنتی‌بیوتیک‌ها و نیز کورتیکواستروئیدها، جهت کاهش عفونت و التهاب استفاده می‌شود.

از خداحقان‌ها باز کردن شیپور استاش (برای عفونت گوش میانی) استفاده می‌شود. برای کاهش فشار مایع زلالیه در گلوکوم از داروهایی مانند: بتاپلوكرها، دیورتیک‌ها و میوتیک‌ها استفاده می‌شود.

گروه‌های دارویی عمدۀ این بخش عبارتند از:

- داروهای ضد گلوکوم (آب سیاه)
- داروهای مؤثر بر مردمک
- داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری‌های گوش

داروهای ضد گلوکوم

بیماری گلوکوم به مجموعه شرایطی گفته می‌شود که در آن فشار چشم به صورت غیرعادی بالا رفته، عصب چشمی را تحت فشار قرار می‌دهد و منجر به ایجاد ضایعاتی می‌گردد که باعث از بین رفتن بینایی می‌شود. گلوکوم دو نوع است: گلوکوم حاد و گلوکوم مزمن.

گلوکوم مزمن: درمان ممکن است با یک بتاپلوكر که تولید مایع زلالیه را کاهش می‌دهد، شروع شود. میوتیک‌ها نیز جهت منقبض کردن مردمک و تصحیح تخلیه مایع داخل چشمی مورد استفاده قرار گیرند. برای افزایش تخلیه مایع زلالیه از چشم، از پروستاگلاندین لاتانوپروست Latano prost

و دیورتیک‌هایی مانند استازولاماید (به صورت خوراکی) استفاده می‌شود . البته ، هیچ کدام از این داروها باعث بهبود کامل ضایعات نمی‌شوند و نیاز به مصرف بلندمدت و حتی مادام‌العمر دارند . از جراحی نیز برای تخلیه مایع داخل چشم استفاده می‌شود .

گلوکوم حاد : در این نوع گلوکوم ، درمان‌های فوری برای کاهش فشار چشم ضروری است و ادامه درمان یا عمل جراحی برای جلوگیری از عود بیماری لازم است . اگر گلوکوم حاد تشخیص داده شود ، از استازولاماید (در ابتدا به صورت تزریقی) ، میوتیک‌ها (به صورت قطره چشمی) و از دیورتیک اسموتیکی مثل مانیتول استفاده می‌شود . میوتیک‌ها و پروستاگلاندین لاتانوپروست خروج مایع از چشم را تصحیح می‌کنند . بتاپلوكرها و مهارکننده‌های آنزیم کربونیک آنهیدراز ، تولید مایع داخل چشمی را کاهش می‌دهند . داروهای سمپاتومیمتیک (مثل اپی‌نفرین) از راه تسهیل خروج مایع از چشم و نیز از راه کاهش تولید مایع داخل چشمی اثر می‌کنند .

از عوارض این داروها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد : میوتیک‌ها باعث تحریک و قرمزی چشم و تغییر در بینایی می‌شوند . دیورتیک‌ها باعث افزایش دفعات دفع ادرار و تشنجی زیاد می‌شوند . استازولاماید باعث سوزن‌سوزن شدن دردناک دست‌ها و پاها ، سنگ‌کلیه و آسیب‌های کلیوی می‌شود .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

میوتیک‌ها شامل : کارباکل **Pilocarpine** – فیزوستیگمین **Carbachol** – پیلوکارپین .
مهارکننده‌های آنزیم کربنیک آنهیدراز شامل : استازولاماید **Acetazolamide** – دورازولاماید . **Dorazolamide**

داروهای دیگر شامل : لاتانوپروست **Latanoprost** .

- **Levobunolol** – **Betaxolol** – **Carteolol** – **لوبونول** .
متیپرانولول **Metipranolol** – **تیمولول Timolol** .

سمپاتومیمتیک‌ها شامل : آپراکلونیدین **Brimonidine** – آپراکلونیدین **Apraclonidine** – بریمونیدین .
دیپیوفرین **Dipivefrine** – اپی‌نفرین **Epinephrine** – گوانتیدین **Guanethidine** .

داروهای مؤثر بر مردمک چشم

مردمک سوراخی است در وسط عنیبه (بخش رنگی چشم) که نور از راه آن وارد چشم می‌شود . نور زیاد باعث انقباض عضله‌های عنیبه و تنگ شدن مردمک و نور کم باعث انبساط این عضله‌ها و گشاد شدن مردمک می‌شود .

داروهای مؤثر بر مردمک ۲ نوع است : ۱- داروهای میوتیک ۲- داروهای میدریاتیک

هر کدام از این داروها روی یکی از قسمت‌های اعصاب خودکار (سمپاتیک یا پاراسمپاتیک) اثر کرده ، باعث انقباض و انبساط مردمک می‌شوند .

از میدریاتیک‌ها برای گشاد کردن مردمک و مشاهده آسان اجرای داخل چشم شامل سر عصب بینایی و عروق خونی شبکیه استفاده می‌شود . گشاد کردن مردمک خود بخشی از درمان یووئیت (نوعی بیماری التهابی عنبیه) است . در این بیماری عنبیه متورم به عدسی می‌چسبد که باعث آسیب جدی و شدید به چشم می‌شود .

در درمان گلوکوم (آب سیاه) ، از میوتیک‌ها برای منقبض کردن مردمک استفاده می‌شود . این داروها به شکل قطره چشمی بوده و عوارض چندانی ندارد . اشک برای مرتبط نگه داشتن چشم به وسیله غدد اشکی تولید می‌شود و نقش مهمی در تمیز کردن چشم و جلوگیری از خشک شدن سطح چشم دارد . از آنجا که خشکی چشم باعث آسیب به چشم (سطح قرنیه) می‌شود ، از اشک مصنوعی استفاده می‌شود که به صورت قطره چشمی است .

داروهای رایج این بخش عبارتند از :

میدریاتیک‌های سمپاتومیمتیک شامل : اپی‌نفرین Epinephrine - فنیل افرین Phenylephrine .

میوتیک‌ها شامل : کارباکل Carbachol - پیلوکارپین Pilocarpine .

میدریاتیک‌های آنتی‌کولینرژیک شامل : آتروپین Atropine - سیکلوبینتولات Cyclopentolate .

هماتروپین Homatropine - فیزوستیگمین Physostigmine - تروپیکامايد Tropicamid .

داروهای مورد استفاده در بیماری‌های گوش

التهاب و عفونت گوش میانی و خارجی از بیماری‌های شایع گوش است که با دارو درمان می‌شود .
التهاب گوش خارجی در اثر اگزما یا عفونت قارچی و باکتریایی ایجاد می‌شود . خطر التهاب گوش به وسیله عواملی مانند جمع شدن جرم در گوش یا شنا در آب کثیف افزایش می‌یابد و با علایمی مانند : درد ، حساسیت ، خارش و گاه کاهش شنوایی همراه است .

درمان دارویی

اگر گوش دچار التهاب باشد با قطره کورتون قابل رفع است اما اگر التهاب با عفونت همراه باشد از قطره‌های گوشی حلوی کورتون و آنتی‌بیوتیک استفاده می‌شود ، همچنین از آنتی‌بیوتیک‌ها مانند : فرامایستین Framacycline ، نئومایسین Neomycin و پلی‌میکسین « ب » Polymixin B استفاده می‌شود .

عفونت گوش میانی

عفونت گوش میانی همراه با درد شدید و کاهش شنوایی است . این عفونت در مردان جوان شایع است و علت آن انتقال عامل عفونت از بینی و حلق از راه شیبور استاش به گوش میانی است .

عفونت‌های ویروسی گوش میانی معمولاً خود به خود خوب می‌شوند. عفونت‌های باکتریایی باعث التهاب و انسداد شیپور استاژ می‌شوند، در این حالت چرک در گوش میانی جمع شده به پرده گوش فشار آورده باعث سوراخ شدن پرده گوش و خروج چرک می‌شود. برای درمان از آنتی‌هیستامین، ضداحتقان‌ها، مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک خوارکی استفاده می‌شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- قطره‌های گوشی آنتی‌بیوتیک و آنتی‌باکتریال شامل: کلرامفنیکل Chloramphenicol
 کلیوکینول Clioquinol - کلوتریمازول Clotrimazole - فرامایستین Framycetin - جنتامایسین Neomycin

- داروهای ضداحتقان شامل: اکسی‌متازولین Oxymetazoline - گزیلومتاژولین Xylometazoline افردرین Ephedrine

کورتون‌ها شامل: بتامتاژون Dexamethasone - دگزامتاژون Betamethasone - فلومتاژون Flumethasone
 هیدروکورتیزون Hydrocortisone - پردنیزولون Prednisolone - تریامسینولون Triamcinolone

داروهای دیگر شامل: الومینیم استات Aluminium acetate - آنتی‌هیستامین‌ها.

دستگاه تناسلی و ادراری

دستگاه تناسلی در مردان شامل قسمت‌هایی است که وظیفه تولید و آزاد سازی اسپرم (سلول جنسی مردانه) را بر عهده دارند و در زنان شامل بخش‌هایی است که سلول جنسی زنانه را ذخیره و آزاد می‌کنند و امکان تکامل و باروری تا رسیدن به مرحله نوزادی را فراهم می‌کنند. دستگاه ادراری در مردان رابطه ساختمانی نزدیکی با دستگاه تناسلی دارد اما در زنان به طور کامل از هم جدا هستند، گرچه در ظاهر نزدیک هم قرار دارند. دستگاه تناسلی در زنان شامل تخمدان‌ها، لوله‌های فالوپ و رحم است و در مردان شامل بیضه‌ها و آلت تناسلی، غده پروستات، اپی‌دیدیم (لوله‌های باریک کلافی شکل)، مجرای منی‌بر، کیسه‌های منی و اورترا می‌باشد. دستگاه ادراری در هر دو جنس شامل: کلیه‌ها، اورتراها و مثانه می‌باشد.

مجاری ادراری و تناسلی از محل‌های شایع ایجاد عفونت هستند. عفونت‌هایی مانند سیستیت (التهاب مثانه) در مردان به علت داشتن اورتای طویل نسبت به زنان کمتر شایع است. گذشته از عفونت‌ها، شایع‌ترین مشکل دستگاه ادراری اختلال در کارکرد مثانه است که به صورت بی‌اختیاری و احتباس ادرار دیده می‌شود.

آنکه بیوتیک‌ها برای درمان عفونت‌ها، ضدقارچ‌ها برای عفونت قارچ یا مخمر، هورمون‌ها برای جلوگیری از ناباروری (به صورت OCP) یا افزایش باروری یا تنظیم عادت ماهیانه، مسکن‌ها برای قاعده‌گی‌های دردناک و بعضی از داروها نیز برای تسهیل زایمان یا به تأخیر اندختن آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین برخی داروها را برای تنظیم حجم ادرار و بی‌اختیاری یا احتباس ادرار تجویز می‌کنند.

گروه‌های دارویی عمدۀ این بخش عبارتند از:

- داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های مربوط به عادت ماهیانه
- ضدبارداری‌های خوراکی OCP
- داروهای مورد استفاده در ناباروری
- داروهای مورد استفاده در زایمان
- داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های مجاري ادراري

داروهای مورد استفاده در بیماری‌های هریبوط به عادت ماهیانه (قاعده‌گی)

عادت ماهیانه محصول فعالیت هورمون‌های جنسی زنانه است که باعث آزادسازی تخمک و نیز ضخیم شدن دیواره رحم و آماده شدن آن برای باروری می‌شود که از ۱۱ - ۱۴ سالگی شروع شده و تا حدود ۵۰ سالگی ادامه می‌یابد.

مشکلات عادت ماهیانه که نیاز به درمان دارند عبارتند از منوراژی (از دست دادن بیش از حد خون در طی قاعده‌گی) ، دیسمنوره (احساس درد هنگام قاعده‌گی) و سندرم پرمنسچورال (علایم ناراحت کننده جسمی و روانی که پیرامون قاعده‌گی ایجاد می‌شوند) . علت اصلی آمنوره (فقدان عادت ماهیانه) در زنان در سن باروری ، بارداری است .

داروهای عمدۀ در درمان مشکلات فوق عبارتند از استروژن ، پروژستوژن ، دانازول و مسکن‌ها . دیسمنوره عبارت است از درد هنگام خونریزی ناشی از عادت ماهیانه که به وسیله یک مسکن معمولی تسکین می‌یابد .

داروهایی مانند مفnamیک اسید به خاطر اثر روی پروستاگلاندین‌ها و مقابله با آثار آن‌ها ، اثر نیرومندی روی دردهای قاعده‌گی دارند . در صورتی که درمان‌های فوق مؤثر واقع نشد ، از هورمون درمانی استفاده می‌شود .

منوراژی : یعنی از دست رفتن خون بیش از حد هنگام قاعده‌گی . برخی NSAID ها مثل دیکلوفناک و مفnamیک اسید از شدت منوراژی می‌کاهند . همچنین می‌توان از ترانهگزامیک اسید Tranexamic acid و دانازول نیز استفاده کرد .

سندرم پیش از قاعده‌گی premenstrual syndrom ، مجموعه‌ای از علایم روانی و فیزیکی است که قبل از شروع قاعده‌گی ایجاد می‌شوند ، علایم روحی شامل تغییرات خلق ، افزایش تحریک‌پذیری ، افسردگی و اضطراب و علایم فیزیکی شامل ورم بافت‌های بدن ، سردرد و حساسیت پستان‌ها . از پیریدوکسین (B₆) ، دیورتیک‌ها ، برومومکرپتین و ضدافسردگی‌ها ، برای بهبود این علایم استفاده می‌شود .

اندوهریوز : عبارت است از وجود بافت اندومتر رحم در مکانی خارج از رحم در داخل لگن که با درد هنگام مقاربت و قاعده‌گی دردناک همراه است . این امر گاه به ناباروری متنه می‌شود .

از داروهایی مانند NSAID ها ، ترانهگزامیک اسید و دانازول برای بهبود علایم این بیماری استفاده می‌شود . در صورت مؤثر نبودن مصرف دارو می‌توان با جراحی ، بافت اندومتر موجود در بدن زن را برداشت .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

استروژن‌ها و پروژستوژن‌ها : (در بخش‌های دیگر توضیح داده شده‌اند) .

مسکن‌های غیراستروئیدی شامل : آسپیرین Aspirin - دیکلوفناک Diclofenac - کتوپروفن Ketoprofen - اسید مفnamیک Mefenamic acid - ناپروکسن Naproxen .

دیورتیک‌ها : در بخش‌های دیگر توضیح داده شده‌اند .

- داروهای دیگر شامل: برومکریپتین **Bromocriptine** - بوزرلین **Buserelin** - داناژول **Danazol**

اسید گامولنیک **Gamolenic acid** - جسترینون **Genstrinone** - گوزرلین **Goserelin** - لیوپرورلین **Lupron**.

- نافارلین **Nafarelin** - پیریدوکسین **Pyridoxine** - ترانهگرامیک اسید **Tranexamic acid** - لیپرورولین **Leuprorelin**.

ضدبارداری‌های خوراکی

برای جلوگیری از بارداری روش‌های گوناگونی وجود دارد اما ضدبارداری‌های خوراکی برای بسیاری از زنان مؤثرترین روش است.

برخی از این روش‌ها عبارتند از استفاده از قرص‌های مرکب و چند مرحله‌ای که ترکیبی از استروژن و پروژستوژن هستند، استفاده از قرص‌هایی که حاوی پروژستوژن هستند، **IUD** (وسیله داخل رحمی)، کاندوم، دیافراگم، تنظیم زمان مقاربت براساس تغییرات عادت ماهیانه، اسفنج ضدبارداری، اسپرم‌کش‌های واژینال و استفاده از کپسول‌های کاشتنی زیر پوستی.

سه نوع عمده قرص‌های ضدبارداری خوراکی وجود دارند که عبارتند از: قرص‌های مرکب، قرص‌هایی که حاوی پروژستوژن هستند و قرص‌های چند مرحله‌ای.

قرص‌های مرکب: کمترین درصد خطأ را در بین انواع قرص‌های ضدبارداری دارند. دوره مصرف قرص‌های مرکب ۲۱ روز است.

قرص‌های حاوی پروژستوژن: این قرص‌ها در زنان شیرده و زنانی که واکنش‌های نامطلوب نسبت به استروژن از خود نشان می‌دهند، تجویز می‌شود. دقت این قرص‌ها، از قرص‌های مرکب کمتر است و لذا باید با دقت بیشتری مصرف شوند.

قرص‌های چند مرحله‌ای: حاوی دو یا سه گروه قرص هستند که هر گروه حاوی مقدار متفاوتی استروژن و پروژسترون است.

زنانی که قرص‌های حاوی استروژن مصرف می‌کنند ممکن است در اوایل مصرف دچار تهوع، استفراغ، تغییر قدرت جنسی، افسردگی، گرفتگی پاها و درد شکم شوند. همچنین گاهی ممکن است این قرص‌ها روی گردش خون تأثیر گذاشته و باعث سردد و سرگیجه شوند.

خطرهای و احتیاط‌های لازم

همه ضدبارداری‌های خوراکی باید به دقت مصرف شوند تا بیشترین اثر را داشته باشند. در صورتی که قرص‌ها فراموش شوند یا به علت اسهال و استفراغ به قدر کافی جذب نشوند درصد خطای آن‌ها بالا می‌رود.

برخی داروها اثر ضدبارداری‌های خوراکی را کاهش می‌دهند لذا باید قبل از شروع مصرف آن‌ها پزشک را آگاه سازید.

ضدبارداری‌های خوراکی به ویژه قرص‌های حاوی استروژن می‌توانند ایجاد خطر کنند که مهم‌ترین آن‌ها افزایش احتمال ترومبوز (لخته شدن خون در رگ) و حرکت آن به داخل ورید یا شریان و ایجاد حمله قلبی یا مغزی و یا انفارکتوس ریوی است. داروهایی مانند، جستودن **Gestoden** یا دزوچسترل **Desogestrel** خطر ترومبوز را بیشتر افزایش می‌دهند. برای باردار شدن بعد از قطع مصرف داروها لازم است یک دوره ماهیانه جهت احتیاط صبر کرد.

هقایسه فواید و زیان‌های ضدبارداری‌های خوراکی

فواید و زیان‌های عمدۀ ترکیبات هورمونی به شرح زیر می‌باشد:

- فواید و منافع ضدبارداری‌های خوراکی حاوی استروژن عبارتند از تنظیم قاعدگی، کاهش درد قاعدگی، کاهش اتلاف خون در هنگام قاعدگی، کاهش خطر بیماری‌های خوش‌خیم پستان، کاهش اندومتریوز و بارداری نابجا (EP)، کاهش کیست‌های تخمدان، کاهش عفونت لگن و سرطان‌های تخمدان و رحم.
- فواید و منافع قرص‌هایی که فقط حاوی پروژستوژن هستند عبارتند از: برای شیردهی مناسب‌اند، قدرت باروری سریع‌تر به حالت اولیه برمی‌گردد عوارض جانبی استروژن را ندارند.
- عوارض جانبی قرص‌های حاوی استروژن عبارتند از افزایش وزن، تورم پستان‌ها، افسردگی، کاهش میل جنسی، سردرد، افزایش ترشحات واژن و ایجاد تهوع.
- مهم‌ترین عارضه قرص‌هایی که حاوی پروژستوژن هستند بی‌نظمی در قاعدگی است.
- خطرهای قرص‌های حاوی استروژن عبارتند از: ترومبوز و آمبولی ناشی از آن، افزایش فشارخون و یرقان، افزایش احتمال سرطان کبد (در موارد نادر) و سنگ کیسهٔ صفرا.
- خطرهای قرص‌هایی که فقط حاوی پروژستوژن هستند عبارتند از: کیست‌های تخمدانی و بارداری نابجا (EP).
- عواملی که مانع استفاده از قرص‌های مرکب هستند عبارتند از سابقهٔ ترومبوز، بیماری‌های قلبی، چربی بالای خون، بیماری‌های کبدی، بیماری‌های خونی، فشارخون بالا، میگرن، خونریزی واژن با علت نامشخص و اتواسکلروز.
- عواملی که مانع استفاده از قرص‌هایی که فقط حاوی پروژسترون هستند عبارتند از: بیماری‌های قلبی و عروقی، خونریزی از واژن با علت نامشخص و سابقهٔ بارداری نابجا (EP).

- عواملی که خطرهای ناشی از مصرف قرص‌های مرکب را افزایش می‌دهند عبارتند از : استعمال دخانیات ، چاقی ، افزایش سن ، سابقه فامیلی بیماری‌های قلبی و عروقی ، دیابت ملیتوس و استفاده هم‌زمان از داروهای دیگر .
- عواملی که خطرهای ناشی از مصرف قرص‌هایی که فقط حاوی پروژسترون هستند را افزایش می‌دهند ، عبارتند از :
- همان عواملی که خطرهای ناشی از مصرف قرص‌ها حاوی استروژن را افزایش می‌دهند اما با درجهٔ خفیفتر .
- عوامل ذیل می‌توانند خطر قرص‌های ضدبارداری را بر روی شخص کاهش دهنند : ترک سیگار ، ثبات وزن طبیعی و رژیم غذایی ، کنترل منظم چربی و فشارخون ، انجام نمونه‌گیری منظم از گردن رحم ، آگاه کردن پزشک تجویز کننده این قرص‌ها از مصرف داروهای دیگری که مصرف می‌کنید و ترک مصرف قرص‌های حاوی استروژن ، چند هفته قبل از عمل جراحی :

ضدبارداری‌های خوراکی

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

- پروژسترون‌ها شامل :** دزوجسترون **Gestodene** – جستودن **Desogestrel** – لوونور جسترول **Norgestimate** – نوراکتیسترون **Levonor gestrel** .
- استروژن‌ها شامل :** اتینیل استرادیول **Ethynodiol** – مسترانول **Mestranol** .

داروهای هورد استفاده در ناباروری

برای باروری و تثبیت بارداری باید دستگاه تناسلی مرد و زن هر دو سالم باشند . دستگاه تناسلی مرد باید به تعداد کافی اسپرم‌های سالم تولید کند و دستگاه تناسلی زن نیز باید تخمک‌های سالمی تولید کند که بتوانند به راحتی از لولهٔ فالوب عبور کرده و به رحم برسند و دیواره رحم هم باید در وضعیتی باشد که بتواند تخمک بارور شده را در خود جای دهد .

علت ناباروری می‌تواند یکی از عوامل ذیل باشد : انجام عمل مقاربت در زمان نامناسبی از سیکل ماهیانه ، تولید اسپرم ناسالم یا تولید مقدار خیلی کم اسپرم به وسیلهٔ مرد ، آزاد نشدن تخمک به وسیلهٔ زن یا مسدود بودن لولهٔ فالوب به علت عواملی چون عفونت‌های قبلی لگن و اختلال در تولید گنادوتropین‌های **FSH** و **LH** در اثر بیماری یا استرس‌های روحی .

اگر علت مشخصی برای ناباروری پیدا نشود آزمایش آنالیز منی مردانجام می‌شود . اگر آزمایش آنالیز چیزی را مشخص نکرد ، اقداماتی چون بررسی اوولاسیون ، آزمایش خون و نیز بررسی سطح هورمون‌ها بر روی زن انجام می‌گیرد و در صورتی که زن قادر به اوولاسیون نباشد از درمان دارویی استفاده می‌شود .

در مردانی که اسپرم کم تولید می‌کنند، ممکن است از گنادوتروپین‌ها (HCG یا FSH) استفاده شود یا داروهای محرک هیپوفیز مثل کلومیفن تجویز شود. بعضی از مشکلات آن‌ها نیز ممکن است با کورتون حل شود. در زنان اگر کلومیفن مؤثر نبود از HCG و FSH استفاده می‌شود. کلومیفن باعث ایجاد گرگرفتگی، سردرد و تهوع می‌شود. HCG باعث سردد، تغییرات خلق و خستگی و FSH باعث بزرگ‌شدن تخمدان‌ها و ناراحتی شکم می‌شود.

داروهای مورد استفاده در ناتوانی جنسی

ناتوانی جنسی بیماری شایع مردان است که مشخصه آن راست نشدن آلت تناسلی مردانه یا راست نماندن آن است. در آلت تناسلی مردانه سه جسمک استوانه‌ای شکل وجود دارد که عبارتند از: اجسام غاری و جسم اسفنجی. وقتی مرد از نظر جنسی تحريك شود شریان‌های داخل این جسمک‌ها شل و گشاد می‌شوند و باعث ورود بیشتر خون به این فضاهای می‌شوند که در نتیجه آلت تناسلی راست می‌شود.

پرشدن رگ‌ها و سفت شدن آلت، بازگشت خون وریدی از آلت تناسلی به بدن را نیز کاهش می‌دهد که منجر به راست ماندن آن می‌شود. داروهای ضد ناتوانی جنسی باعث افزایش جریان خون به آلت مردانه و سفت شدن آن می‌شوند. داروی سیلدنافایل Sildenafil به صورت خوراکی مصرف می‌شود. آپروستادیل Alprostadil یک دارو از خانواده پروستاگلاندین است که به صورت مستقیم به داخل آلت تزریق می‌شود و یا از راه اورترا به وسیله پیپت‌های مخصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

Follicle) FSH - Clomifene (Human chorionic gonadotrophin) HCG - کلومیفن - فولیتropین Goserline - گوزرلین - لوتئینینگ هورمون Menopausal (Menotrophin - منوتروفین Luteining hormone) - منوپوزال گنادوتروپین . Tamoxifen - تاموکسیفن Urofollitropin - اوروفولیتropین gonadotropin .

داروهای مورد استفاده در ناتوانی جنسی شامل: آپروستادیل Alprostadil - سیلدنافایل Sildenafil .

داروهای مورد استفاده در زایمان

زایمان دارای سه مرحله است که عبارتند از:

- ۱- شروع انقباض‌های رحم که ابتدا به صورت نامنظم است و سپس به تدریج قوی‌تر و منظم‌تر می‌شود و در نهایت به بازشدن و گشاد شدن گردن رحم ختم می‌گردد.
- ۲- حرکت جنین از رحم به داخل وازن و در نتیجه خروج آن از کانال زایمان
- ۳- دفع جفت

داروهای مؤثر بر زایمان برای القاء یا شروع زایمان ، به تأخیر اندختن زایمان زودرس و یا تسکین درد استفاده می‌شوند .

داروهای مورد استفاده در تحریک یا تسهیل زایمان

القاء زایمان زمانی صورت می‌گیرد که ادامه بارداری به صلاح مادر و جنین نباشد یا دو هفته از موعد زایمان گذشته باشد یا زن دچار پراکلامسی باشد یا پارگی زودرس کیسه آب یا مرگ جنین در رحم اتفاق افتاده باشد . برای القاء زایمان از اکسیتوسین استفاده می‌شود . به جای اکسیتوسین می‌توان از پروستاگلاندین به صورت شیاف واژینال استفاده کرد . در صورتی که داروهای فوق مؤثر واقع نشد ، سزارین انجام می‌شود .

داروی ارگومترین Ergometrine به زنانی که در طول بارداری فشارخون بالا دارند داده نمی‌شود .

داروهای مورد استفاده برای تسکین درد زایمان

مسکن‌های اوپیوئیدی مثل پتدين و مورفین یا ترکیبات دیگر در تسکین درد زایمان مورد استفاده قرار می‌گیرند و از عوارض آن‌ها خواب آلودگی ، تهوع و استفراغ است . این داروها می‌توانند برای جنین مشکلات تنفسی ایجاد کنند .

بی‌حسی اپیدورال : این کار با بی‌حس کردن اعصاب ناحیه لگن و رجم باعث تسکین درد ناشی از زایمان می‌شود .

اکسیژن و اکسیدنیترو : مخلوط این گازها باعث تسکین دردهای ناشی از انقباض عضلانی می‌شود .

بی‌حسی موضعی : از راه تزریق بی‌حس کننده در داخل واژن یا مدخل واژن صورت می‌گیرد . این بی‌حسی موقع اپیزیوتومی ، زایمان به کمک فورسپس و نیز زمانی که بخیه کردن لازم باشد ، صورت می‌گیرد .

شل کننده‌های عضلات رحم

اگر انقباض‌های رحمی قبل از هفته ۳۴ بارداری شروع شده باشد ممکن است پزشک استراحت بدهد و دارویی تجویز کند که عضلات رحم را شل کرده و زایمان را متوقف نماید .

داروهای مورد استفاده برای خاتمه زایمان

این داروها ، برای پایان بخشیدن به بارداری زیر ۲۰ هفته تجویز می‌شوند . از این داروها برای خالی کردن رحم بعد از مرگ جنین نیز استفاده می‌شود .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

تسکین‌دهنده‌های درد شامل : انتونوکس Entonox (اکسیژن + اکسیدنیترو)

اوپیووئیدها شامل : فنتانیل Fentanyl - مورفین Morphine - پتدين Pethidine .

شل‌کننده‌های عضلات رحم شامل : ریتودرین Ritodrine - سالبوتامول Salbutamol - تربوتالین Terbutaline .

محرك‌های رحم شامل : ارگومترین Ergometrine - اکسیتوسین Oxytocin .

بوحس‌کننده‌های موضعی شامل : بوپیواکائین Bupivacaine - لیگنوکائین Lignocaine .

هرمون‌های جنسی شامل : میفریستون Mifepristone .

داروهای مورد استفاده در بیماری‌های دستگاه ادراری

ادرار به وسیله کلیه‌ها تولید شده و در مثانه ذخیره می‌شود . پرشدن مثانه منجر به افزایش فشار به دیواره مثانه و تحريك پایانه‌های عصبی متنه به دیواره مثانه شده تمايل به ادرار کردن را ایجاد می‌کند .

تعدادی از بیماری‌ها می‌توانند مجاری ادراری را تحت تأثیر قرار دهند که شایع‌ترین آن‌ها عبارتند از :

عفونت مثانه (سیستیت) یا اورتا ، احتباس ادرار و عدم توانایی در کنترل ادرار (بی‌اختیاری ادرار) .

داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های ادراری عبارتند از آنتی‌بیوتیک‌ها ، داروهای آنتی‌باکتریال ، مسکن‌ها ، داروهای افزاینده اسیدیته ادرار و داروهایی که روی کنترل عصبی عضله‌های اسفنکتور مثانه اثر می‌کنند . داروهای مورد استفاده در عفونت‌های مجاری ادراری عبارتند از : آنتی‌باکتریال‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها که از بین آن‌ها تریمتوبپریم و آموکسی‌سیلین بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند .

داروهای مورد استفاده در بی‌اختیاری ادراری

از دلایل بی‌اختیاری ادراری می‌توان به ضعف ماهیچه‌های اسفنکتور مثانه ، حساسیت زیاد عضله‌های دیواره مثانه ، عدم کنترل عصبی اسفنکتور مثانه ، عدم کنترل ادرار در بچه‌ها (شب ادراری) و بی‌اختیاری ادراری ناشی از افزایش فشار شکم در خانم‌های باردار اشاره کرد .

بی‌اختیاری ناشی از ضعف اسفنکتور با ورزش و تقویت عضله‌های کف لگن (پرینه) یا عمل جراحی قابل رفع است . بی‌اختیاری ناشی از حساسیت زیاد دیواره مثانه با تخلیه منظم مثانه قابل رفع است . بی‌اختیاری ناشی از حساسیت زیاد عضله‌های دیواره مثانه با داروهای ضداسپاسم و آنتی‌کولینرژیک مانند ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای از قبیل ایمی‌پرامین قابل درمان است . همچنین ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای و داروی دسموپرسین در درمان شب ادراری نیز تجویز می‌شوند . داروی دسموپرسین ، شکل مصنوعی هورمون ADH است .

داروهای مورد استفاده در درمان احتباس ادرار

احتباس ادرار عبارت است از عدم توانایی در تخلیه مثانه که ناشی از نارسایی در انقباض عضلهای دیواره مثانه است. احتباس ادرار می‌تواند در نتیجه بزرگی غده پروستات یا وجود تومور یا ناشی از بیماری‌های عصبی بلندمدت و یا مصرف برخی از داروها باشد. بیماران مبتلا به احتباس ادرار ممکن است نیاز به سوند جهت رفع مشکل خود داشته باشند و گاه برای جلوگیری از عود مجدد احتباس ادرار از عمل جراحی استفاده می‌شود. داروی فیناستراید Finasteride و آلفابلوکرهای Finasteride و آلفابلوکرهای آنتروپوتینین از بزرگی پروستات تجویز می‌شوند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

آنتریوپوتینین‌ها و آنتروپوتینین‌ها : (در بخش‌های دیگر توضیح داده شده‌اند) .

- **داروهای آنتروپوتینین‌کولینرژیک شامل:** فلاوکسات Flavoxate - ایمیپرامین Imipramine - اکسیبوتینین Oxybutynin - پروپیورین Propiverine - تولترودین Tolterodine .
- **پاراسمیپاتومیمیتیک‌ها شامل:** دیستیگمین Distigmine .
- **آلفابلوکرهای شامل:** آلفوزوسین Doxazosin - دوگزاروسین Alfuzosin - ایندورامین Indoramin - ترازاووسین Terazosin - پرازاووسین Prazosin - تامسولوسین Tamsulosin .
- **داروهای دیگر شامل:** دسموپرسین Desmopressin - فیناستراید Finasteride - پتاسیم سیترات Dimethyl Sulphoxide - ویتامین C - دی‌متیل سولفوکساید Potassium citrate .

پوست

پوست عضوی است مقاوم به آب و در برگیرنده و محافظت بدن . پوست وسیع ترین اندام بدن می باشد که بدن را در مقابل عوامل میکروبی و انگلی محافظت می کند ، به بدن در حفظ آب که مایع حیاتی بدن است کمک می کند ، نقش مهمی در تنظیم دمای بدن دارد و در برگیرنده پایانه های عصبی حس لامسه است .

بسیاری از مشکلات و ناراحتی های پوستی چندان جدی نیستند . این مشکلات عبارتند از : عفونت ها ، آلوگی های انگلی ، التهاب و تحریک و تغییرات در ساختمان پوست .

بیماری های جدی و خطرناک پوست شامل : سرطان هایی مثل ملانوم بدخیم پوست است .

داروهای پوستی شامل : آنتی بیوتیک ها ، ضد قارچ ها ، عوامل ضد انگل های پوستی و کورتیکو استروئید های موضعی می باشند که اغلب تأثیرات مطلوبی دارند .

پوست از دو لایه تشکیل شده که عبارت است از لایه اپی درم که نازک تر است و لایه رویی را تشکیل می دهد و لایه درم که ضخیم تر بوده و لایه زیری را تشکیل می دهد .

لایه درم (Dermis) در برگیرنده پایانه های عصبی حس درد ، حس فشار ، حس حرارت ، غدد عرق و غدد چربی است . داروهای پوستی باید خیلی با دقت مصرف شوند چون می توانند منجر به عوارض نامطلوبی مانند حساسیت های پوستی شوند .

گروه های دارویی عمده این بخش عبارتند از :

- داروهای ضد خارش
- کورتون های موضعی
- فرآورده های ضد عفونت های پوستی
- داروهای ضد انگل های پوستی
- داروهای مورد استفاده در درمان پسوریازیس
- داروهای ضد آگزما
- داروهای ضد شوره سر
- داروهای مورد استفاده در ریزش مو
- داروهای ضد آفتا

داروهای ضد خارش

خارش یا تمایل به خراشیدن پوست که پروریتوس (Pruritus) نامیده می‌شود، در اثر تحریکات جزئی پوست، تغییرات شیمیایی پوست ناشی از بیماری‌ها، آرژی، التهاب و قرار گرفتن پوست در معرض عوامل محرک ایجاد می‌شود. خارش، علامت شایع بسیاری از بیماری‌های پوستی است. گروه‌های دارویی عمده مورد استفاده در درمان خارش پوست شامل بی‌حس‌کننده‌های موضعی، آنتی‌هیستامین‌ها و کورتون‌های موضعی می‌باشند.

خارش ناشی از عوارضی مانند آفتاب سوختگی با لوسيون‌هایی مثل کالامین، خارش ناشی از گزش حشرات با بی‌حس‌کننده‌های موضعی، خارش ناشی از خشکی پوست با نرم‌کننده‌های موضعی و پرهیز از شستشوی زیاد، خارش ناشی از اگزما با کورتون‌های موضعی و خارش مهبل در اثر یائسگی با کرم‌های موضعی حاوی استروژن برطرف می‌شوند.

آنتی‌هیستامین‌ها، تحریکات پوستی را کاهش می‌دهند. کرم‌های خنک کننده مثل لوسيون کالامین از راه خنک کردن پوست باعث کاهش التهاب و تحریک می‌شوند. کرم‌های نرم‌کننده با لغزنده کردن پوست و نرم کردن آن از خشکی پوست جلوگیری می‌کنند. بی‌حس‌کننده‌های موضعی و آنتی‌هیستامین‌ها ممکن است باعث واکنش‌های پوستی شوند. آنتی‌هیستامین‌های خوراکی می‌توانند باعث خواب‌آلودگی شوند. خطر عمده نرم‌کننده‌های ساده و فرآورده‌های تسکین‌دهنده، تحریک پوست و تشدید خارش در صورت مصرف بلندمدت است.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- **Diphenhydramine** - آنتازولین Antazoline - دیفن هیدرامین Mepyramine - تریمپرازین Trimeprazine .
کورتون‌ها شامل : هیدروکورتیزون Hydrocortisone

- **Benzocaine** - آمتوکائین Amethocaine - بنزوکائین Lignocaine .
فرآورده‌های خنک‌کننده و نرم‌کننده شامل : اکیوس کرم Aqueous cream - لوسيون کالامین

. Emulsifying ointment - کلد کرم Cold cream - پماد امولوسيون کننده Calamine lotion

داروهای دیگر شامل : کلستیرامین Colestyramine - کروتامیتون Crotamiton - دوکسپین Doxepin .

کورتون‌های موضعی

کورتیکو استروئیدها داروهای مرتبط با هورمون‌های غده آдрنال هستند که فرآورده‌های موضعی آن‌ها در بیماری‌های پوستی که علامت غالب آن‌ها علامت تورم و التهاب است تجویز می‌شوند.

تحریک پوست در اثر عوامل تحریک‌کننده یا آلرژن‌ها ، منجر به تولید ماده‌ای به وسیله گلبول‌های سفید در آن ناحیه می‌شود که رگ‌ها را گشاد کرده باعث گرم شدن پوست ، تورم و قرمزی آن می‌شود . کورتون‌های موضعی ، علت اصلی را بر طرف نمی‌کنند ، مگر این که بیماری اصلی که باعث ایجاد خارش شده مداوا شود . پزشک کورتون را به عنوان داروی اول تجویز نمی‌کند ، زیرا دارای عوارض جانبی است . استفاده بلندمدت از کورتون‌ها باعث ایجاد عوارضی مانند : ایجاد خطوط دائمی روی پوست ، نازکی پوست ، برجستگی عروق سطح پوست و در افراد با پوست تیره باعث بی‌رنگ شدن موقت نقاطی در پوست می‌شود .

اگر علت التهاب پوست ، عفونت باکتریایی یا قارچی باشد ، استفاده از کورتون‌ها به تنها یی جایز نیست ، زیرا کورتون‌ها باعث تضعیف دستگاه ایمنی می‌شوند . گاهی کورتون‌های موضعی به صورت فرآورده‌های حاوی ترکیبات ضدقارچ یا آنتی‌بیوتیک تهیه می‌شوند .

داروهای رایج این بخش عبارتند از :

فرآوردهای کورتونی خیلی پرقدرت شامل : کلوبتاژول Clobetasol – هالسینوناید

. Halcinonide

فرآوردهای کورتونی پرقدرت شامل : بکلومتاژون Beclometasone – بتامتاژون

- دیفلوکورتولون Diflucortolone – دیفلوکورتولون Desoxymetasone – Betamethasone

فلوئوسینولون Fluocinolone – فلوئوسینوناید Fluocinonide – فلوتیکازون Fluticasone – مو متازون

. Trimcinolone – تریامسینولون Mometasone

فرآوردهای کورتونی متوسط شامل : الکلومتاژون Alclometasone – کلوبتاژون Clobetasone

. Flurandrenolone – فلوراندرنولون Fluocortolone – فلوراندرنولون

. Hydrocortisone – هیدروکورتیزون

فرآوردهای ضد عفونت‌های پوستی

پوست اولین لایه دفاعی بدن در برابر عفونت‌ها است . اگر روی پوست بريیدگی ، سوختگی ، خراش ، اثر گزش حشرات و یا بیماری‌های التهابی پوست ایجاد شود ، پوست خود به خود می‌تواند دچار عفونت شود .

ویروس‌ها ، قارچ‌ها و مخمرها می‌توانند عامل عفونت پوستی باشند . با اقداماتی مانند : تمیز کردن محل ضایعه دیده پوست و به کار بردن لوسيون‌ها و کرم‌های ضد عفونی کننده می‌توان از عفونی شدن زخم‌های پوستی جلوگیری کرد .

درمان معمولی زخم‌های عفونی با آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و موضعی صورت می‌گیرد. بیماری‌های پوستی که در آن‌ها از آنتی‌بیوتیک‌های موضعی استفاده می‌شود عبارتند از: زردزخم، اگزما، عفونی، زخم‌های پوستی، زخم بستر و راش‌های ناحیه قنداق کردن بچه.

همچنین از فرآوردهای آنتی‌بیوتیک‌هایی استفاده می‌شود که جذب پوستی ضعیفی دارند و در سطح پوست باقی می‌مانند، مثل آمینو گلیکوزیدها. در صورت عمقی بودن زخم از آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی یا تزریقی استفاده می‌شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- آنتی‌بیوتیک‌ها شامل: باسیتراسین **Bacitracin** - کلرتراسیکلین **Chlortetracycline** - فرامایستین **Framycetin** - فوزیدیک اسید **Fusidic acid** - گرامیسیدین **Colistin** - نئومایسین **Neomycin** - مپیروسین **Mupirocin** - پلی‌میکسین «ب» **Gramicidin** - تتراسیکلین **Tetracycline** - پولی‌میکسین **Polymyxin**.

آنتری‌سپتیک‌ها و سایر داروهای آنتی‌باکتریال شامل: ستریمايد **Cetrimide** - کلره‌گزیدین **Chlorhexidine** - هگزاکلروفن **Hexachlorophen** - مترونیدازول **Metronidazole** - پوویندون **Triclosan** - سیلور سولفادیازین **Silver Sulfadiazine** - پویدون آبیدین **Povidone iodine**.

پایه فرآوردهای پوستی

داروهایی که روی پوست استعمال می‌شوند، معمولاً در داخل فرآوردهای هستند که زمینه یا پایه نامیده می‌شود، مانند: کرم، لوسيون، پماد و چسب.

کرم‌ها: اثر نرم‌کننده دارند و معمولاً از امولوسیون روغن در آب تشکیل شده‌اند و برای نرم کردن پوست در بیماری‌هایی که منجر به خشکی پوست می‌گردند تجویز می‌شوند.

لوسيون‌ها: فرآوردهایی نیمه مایع هستند که برای تسکین دادن یا خنک کردن محل دچار عارضه استفاده می‌شوند و برای نواحی وسیع پوشیده از مو مناسب هستند.

پمادها: معمولاً روغنی هستند و برای اگزما مرتبط مناسب‌اند.

چسب‌ها: پمادهایی هستند که شامل مقدار زیادی پودر ریز جامد نشاسته یا اکسیدروی هستند و برای ضایعات پوستی تجویز می‌شوند.

فرآوردهای ایزوله کننده (باریر): به صورت پماد و کرم هستند و وظیفه محافظت از پوست را در مقابل آب و عناصر محرك بر عهده دارند.

کلودیون‌ها : فرآورده‌هایی هستند که وقتی روی ناحیه آسیب‌دیده پوست استعمال می‌شوند، خشک می‌شوند تا یک لایه محافظ ایجاد کنند. گاهی از این فرآورده برای نگهداشتن داروهای نامحلول در تماس با زخم استفاده می‌شود.

هایپ‌ها و شپش‌ها

شایع‌ترین انگل‌هایی هستند که در پوست زندگی می‌کنند.

شپش سه نوع است:

۱- شپش سر

۲- شپش بدن (لباس)

۳- شپش عانه یا پوپیک که گاهی در جاهایی از بدن مانند ابرو که دارای مو هستند دیده می‌شود. همه شپش‌ها در پوست تخم‌گذاری کرده باعث خارش می‌شوند. مایتها و شپش‌ها، در اثر تماس مستقیم از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شوند. برای درمان مایتها داروهایی مانند: مالاتیون، پرمترین و بنزوئیل بنزوئات تجویز می‌شوند.

برای درمان شپش، داروهایی مانند: کارباریل (Carbaryl)، مالاتیون (malation)، پرمترین (permethrin) و فنترین (phenothrin) تجویز می‌شود.

داروها باعث ریشه‌کن کردن انگل‌های پوستی می‌شوند اما ضدغوفونی کردن رختخواب و لباس نیز اهمیت زیادی دارد. اگر به علت خارش شدید چار عفونت شدید از فرآورده‌های آنتی‌بیوتیکی استفاده کنید. لوسيون‌های تجویز شده برای انگل‌های پوستی در صورت تماس با چشم و دهان باعث تحریک و سوزش می‌شوند، بنابراین هنگام مصرف آن‌ها باید احتیاط شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

بنزیل بنزووات Benzyl Benzoate - کارباریل Carbaryl - کروتامیتون Crotamiton - مالاتیون Malathion - پرمترین Permethyl - فناترین Phenathrin.

داروهای ضدآکنه

آکنه که در پزشکی تحت عنوان آکنه ولگاریس شناخته می‌شود، در اثر تولید زیاد چربی پوست که منجر به انسداد فولیکول‌های مو می‌شود به وجود می‌آید و معمولاً در گردن، پشت و صورت و در سال‌های نوجوانی ایجاد می‌شود. علایم آن عبارتند از: پاپول‌های سرسیاه و پوسچول‌ها (نقاط برجسته پر از چرک که وسط آن‌ها سفید است).

أنواع آکنه: آکنه خفیف که دارای پاپول‌های سرسیاه است، آکنه متوسط که شامل پاپول‌های سرسی و پوسچول‌ها است و آکنه شدید که شامل کیست‌های متوسط و دردناک است. درمان آکنه خفیف با شستشوی منظم و قرار دادن پوست در معرض نور خورشید یا اشعه ماوراءبنفس صورت می‌گیرد.

آکنه‌ای که درمان دارویی لازم دارد، معمولاً با یک فرآورده موضعی شامل: بنزوئیل پروکساید یا اسید سالیسیلیک درمان می‌شود. اگر درمان فوق مؤثر نبود از ترتینوین، تتراسیکلین یا ازلایک اسید به صورت موضعی استفاده می‌شود. اگر درمان فوق نیز مؤثر نبود، پزشک معالج ممکن است دوره‌ای از آنتی‌بیوتیک تتراسیکلین یا مینوسیکلین را به صورت خوراکی تجویز کند. اگر درمان فوق نیز مؤثر نبود استفاده از ایزوترتینوین خوراکی که از مشتقات قوی ویتامین A می‌باشد تجویز می‌شود. زنان باید در هنگام استفاده از این داروها در هنگام بارداری، پزشک را آگاه سازند زیرا برخی از این داروها برای تکامل جنین خطرناک هستند.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

درمان‌های موضعی شامل: اداپالن Adapalene - ازلیک اسید Azelic acid - بنزوئیل پروکساید Salicylic acid - ایزووترتینوین Isotretinoin - نیکوتین آمید Nicotinamide (نیاسین) - اسید Tretinoïn - ترتینوین Salicylic acid .

آنٹی‌بیوتیک‌های خوراکی و موضعی شامل: کلیندامایسین Clindamycin - اریترومایسین Erythromycin - مینوسیکلین Minocycline - تتراسیکلین Tetracycline .

دیگر داروهای خوراکی شامل: سیپروترون استات Cyproterone acetate - ایزووترتینوین Isotretinoin .

داروهای مورد استفاده در بیماری پسوریازیس

هرگاه سرعت تقسیم سلول‌های زنده لایه اپی‌درم پوست، از سرعت ریزش سلول‌های لایه شاخی بیشتر شود، آن ناحیه ضخیم و متورم شده و سطح آن به صورت لایه‌های نقره‌ای رنگ دیده می‌شود. این عارضه بیماری پسوریازیس نامیده می‌شود. این بیماری بین سنین ۳۰ - ۱۰ سالگی دیده می‌شود. گاه بعد از قطع مصرف کورتون، پسوریازیس روی می‌دهد. این بیماری درمان قطعی ندارد ولی قرار گرفتن شخص در مقابل نور ماوراء بنفس یا گرفتن حمام آفتتاب در موارد خفیف پسوریازیس می‌تواند مؤثر باشد. کرم‌های نرم کننده نیز تحریکات را کاهش می‌دهند. در صورت عدم موفقیت این اقدامات، استفاده از درمان‌های دارویی مانند: کلسیپوتريول Calcipotriol (به صورت پماد)، کرم کلتار Coaltar و چسب‌های آن و دیترانول Dithranol مورد توجه قرار می‌گیرد. از اسید سالیسیلیک برای از

بین بردن پوسته‌های سفت و نواحی دلمه بسته و از کورتون موضعی جهت مداوای کیس‌های مشکل استفاده می‌شود. در صورت مؤثر نبودن درمان‌های فوق، از مشتقات ویتامین A مثل Acitretin (به صورت خوراکی) در یک دوره ۶ ماهه و یا متواترکسات می‌توان استفاده کرد.

PUVA

پووا PUVA عبارت است از استفاده مرکب از اشعه ماوراء بنفش نوع A و یک داروی پسورالن به نام متوكسانن Methoxsalen که این دارو به صورت موضعی استفاده می‌شود یا چند ساعت قبل از قرار گرفتن در مقابل نور ماوراء بنفش به صورت خوراکی مصرف می‌شود. اشعه ماوراء بنفش باعث تشدید اثر دارو می‌شود. عوارض جانبی آن عبارت است از: خارش، تهوع، قرمزی دردناک در نواحی عادی پوست، خطر پیری زودرس پوست و خطر بلندمدت سلطان پوست.

پووا PUVA فقط در پسوریازیس شدید و در صورت عدم موفقیت درمان‌های دیگر تجویز می‌شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- Ciclosporin - کلسیپوتربیول Calcipotriol - کلتار Coal tar - سیکلوسیپورین
- دیترانول Dithranol - متواترکسات Methotrexate - متوكسانن Methoxalen - اسیدسالیسیلیک
- تازاروتون Tazarotene - تاکالسیتول Tacalcitol - کورتون‌های موضعی.

درمان‌های اگزما

اگزما (درماتیت) به نوعی بیماری پوستی گفته می‌شود که منجر به خشکی پوست می‌گردد و راش‌های پوستی دارای خارش که می‌توانند متورم و تاول دار شوند ایجاد می‌کند. اشخاص مبتلا به اگزما معمولاً یک سابقة خانوادگی از آسم، اگزما یا رینیت البرژیک دارند.

شایع‌ترین نوع اگزما یعنی اگرمای اتوپیک معمولاً در کودکان ظاهر می‌شود. درماتیت سبورئیک که نوعی اگزما است پوست سر و صورت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای درمان اگزما، نرم‌کننده‌ها نقش نرم و مرطوب کردن ناحیه مبتلای پوست را بر عهده دارند. آنتی‌هیستامین‌ها برای کنترل تحریک و خارش تجویز می‌شوند، کورتون‌ها در وضعیت حاد بیماری و کلتار و ایکتامول برای اگرمای اتوپیک مزمن استفاده می‌شوند. در صورت مقاوم بودن اگزما و احتمال عفونت، از آنتی‌بیوتیک استفاده شود.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

- Cold cream - کلدکرم Aqueous cream: اکیوس کرم
- وسيون كالامين Calamine Lotion - پماد امولوسیون کننده Emulsifying ointment
- . کورتون‌ها شامل: هیدروکورتیزون Hydrocortisone

آنتریستامین‌ها شامل: آنتازولین **Chlorpheniramine** - کلرفنیرامین **Antazoline** - دیفن هیدرامین **Diphenhydramine** - مپرامین **Mepyramine** - تریمپرازین **Trimeprazine**.
دیگر داروهای شامل: کلتار **Coal tar** - ایکتامول **Ichthammol** - سیکلوسپورین **Ciclosporin**.

داروهای هورد استفاده در ریزش هو

وقتی ریزش مو بیشتر از حد طبیعی یا رویش آن کمتر از حد طبیعی باشد، وضعیتی ایجاد می‌شود که به آن ریزش مو یا طاسی گویند. عواملی چون: بیماری پوستی پسوریازیس، واکنش‌های دارویی، سوءتغذیه و مصرف داروهای ضدسرطان می‌توانند باعث ریزش مو شوند. اگر عفونت‌های قارچی باعث ریزش مو شوند باید از ضدقارچ‌ها استفاده کرد. ریزش مو اگر در اثر عوامل هورمونی مثل هورمون جنسی مردانه باشد، ممکن است فیناستراید **Finasteride** تجویز شود. برای تحریک رویش مو، داروی ضدفسارخون مینوکسیدیل **Minoxidil** (به صورت موضعی) استفاده می‌شود. عوارض این داروها متفاوت است، برای مثال فیناستراید ممکن است قدرت جنسی را کاهش دهد و کسانی که بیماری قلبی - عروقی دارند باید در مورد مصرف مینوکسیدیل احتیاط کنند.

داروهای رایج این بخش عبارتند از:

ضدقارچ‌ها شامل: گریزئوفولوین **Griseofulvin** - ایتراکونازول **Itraconazole**.
داروهای دیگر شامل: فیناستراید **Finasteride** - مینوکسیدیل **Minoxidil**.

داروهای هورد استفاده در درمان شوره سر

شوره سر، وضعیت بی‌خطری است که طی آن دفع طبیعی سلول‌های پوست افزایش می‌یابد. شوره سر عموماً در اثر شستشوی مکرر با پاک‌کننده‌هایی مثل شامپوها از بین می‌رود اما در صورت مقاوم بودن آن استفاده از شامپوهای طبی مثل: زینک پیریتیون **Zink Pyrithione** یا سلنیوم سولفاید **Selenium sulfide** و شامپوهای محتوی کلتار **Coal tar** یا اسید سالیسیلیک پیشنهاد می‌شود.
در موارد شدید، از شامپوهای محتوی داروهای ضدقارچ مثل کتوکونازول استفاده می‌شود.
همچنین از فرآوردهای کلتار و اسید سالیسیلیک برای دفع پوسته‌های ایجاد شده می‌توان استفاده کرد. از پمادها یا لوسيون‌های موضعی کورتون‌ها نیز می‌توان استفاده کرد.

داروهای رایج این گروه عبارتند از:

داروهای ضدقارچ شامل: کتوکنازول **Ketoconazole** - زینک پیریتیون **Zinc pyrithione**.
داروهای دیگر شامل: کلتار **Coal tar** - اسید سالیسیلیک **Salicylic acid** - سلنیوم **Selenium sulfide**.

ترکیبات ضدآفتاب

ترکیبات ضدآفتاب ، مواد شیمیایی هستند که به صورت کرم و روغن تهیه می‌شوند و پوست را در مقابل آثار زیان‌آور اشعه ماوراء بنفش خورشید حفاظت می‌کنند . افراد دارای پوست‌های روشن بیشترین حساسیت را به نور آفتاب دارند . پوست اگر در مقابل نور خورشید حفاظت نشود دچار ضایعه ، درد و تورم می‌شود . برخی بیماری‌ها مثل هرپس سیمپلکس نیز حساسیت به نور خورشید را افزایش می‌دهند .

علاوه بر پیری زودرس پوست و آفتاب سوختگی ، تابش نور خورشید می‌تواند احتمال سرطان پوست را افزایش دهد . ضدآفتاب‌ها ، بخشی از اشعه زیان‌آور UV (ماوراء بنفش) را جذب کرده ، مانع از رسیدن آن به پوست می‌شوند . ضدآفتاب‌ها براساس قدرت آن‌ها در محافظت از پوست در مقابل اشعه ماوراء بنفش ، به درجه‌های مختلف تقسیم می‌شوند که به صورت شماره SPF مشخص می‌شوند . هرچه درجه SPF بالاتر رود ، قدرت محافظت کننده ضدآفتاب بیشتر می‌شود . برخی ضدآفتاب‌ها مانند اکسیدروی Zinc oxide و دی‌اکسید تیتانیوم Titanium dioxide در برابر هر دو نوع اشعه ماوراء بنفش A و B از پوست محافظت می‌کنند . استفاده از ضدآفتاب برای افراد نواحی گرمسیری و کسانی که حمام آفتاب می‌گیرند ، توصیه می‌شود .

ضدآفتاب‌ها فقط یک مانع فیزیکی در برابر اشعه آفتاب هستند و نمی‌توانند مقاومت خود پوست را فزایش دهند . ضدآفتاب‌ها گاه باعث تحریک پوست و حتی واکنش‌های حساسیتی پوست می‌شوند .

داروهای رایج این گروه عبارتند از :

اجزاء موجود در ترکیبات ضدآفتاب شامل : آمینوبنزوزئیک اسید Aminobenzoic Acid - بنزون‌ها Ethylhexyl Benzones - دی‌بنزوئیل متان Dibenzoylmethanes - اتیل هگزیل متوكسی‌سینمات Methylbenzylidene methoxycinnamate - متیل بنزیلیدن Camphor - کامفور Mexenone - مگزون پادیمات O - Padimate O - دی‌اکسید تیتانیوم Titanium dioxide - اکسیدروی oxybenzone - اکسی بنزون Zinc oxide

بخش دوم

دلاروهای رایج

Aciclovir

آسیکلوفیر

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

گروه دارویی: ضدویروس

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

اشکال دارویی موجود: قرص ، مایع ، تزریقی ، کرم و پماد چشمی

زمان و دفعات مصرف: ۵ - ۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۲۴ ساعت اثر آن شروع می‌شود و تا ۸ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب: در صورت مصرف شکل خوراکی و تزریقی این دارو باید مقدار زیادی آب بنوشید .

نحوه نگهداری از دارو: در ظرف درسته ، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت وقوع اغتشاش ذهنی ، راش پوستی و توهّم ، دوره درمان را کامل کنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو ، به پزشک مراجعه کنید - قبل از آگاهی از اثر این دارو بر روی خودتان از رانندگی و کارهای حساس پرهیز کنید چون شکل خوراکی آن می‌تواند باعث سرگیجه شود - اگر دچار کاهش ایمنی هستید یا مشکل مزمن کلیوی دارید و یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - در افراد مبتلا به ضعف ایمنی به صورت بلندمدت مصرف نشود .

عوارض ناخواسته: در شکل کرم : احساس گزیدگی و خارش پوستی - در شکل خوراکی : تهوع ، استفراغ ، سرد درد و سرگیجه - در شکل تزریقی : اغتشاش ذهنی و توهّم .

تداخل‌های دارویی: پروبنساید ، سطح خونی این دارو را افزایش می‌دهد . این دارو سطح خونی میکوفنولات را افزایش می‌دهد . هر دارویی که بتواند روی کلیه اثر بگذارد ، خطر عوارض جانبی آسیکلوفیر را افزایش می‌دهد .

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری ، شکل موضعی این دارو اشکالی ایجاد نمی‌کند . شکل خوراکی و تزریقی آن در بارداری تجویز نمی‌شود . در شیردهی شکل موضعی ، مشکلی ندارد ولی شکل خوراکی و تزریقی روی کودک اثر می‌گذارد و باید در خصوص مصرف آن با پزشک مشورت شود .

A . C . A

آ - سی - آ

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص

گروه دارویی: ضددرد و التهاب و تب

مقدار و روش مصرف: یک قرص هر ۴ ساعت یک بار، حداکثر ۸ قرص در روز
موارد عمدۀ استعمال دارو: درمان سردرد، سینوزیت، سرماخوردگی، آنفلوآنزا و دردهای عضلانی.
عوارض جانبی مهم: سوء هاضمه، بی اشتهایی، خونریزی معده، تهوع، کهیر، تب، تحریک اعصاب مرکزی.

Acetaminophen (Paracetamol) استامینوفن

گروه دارویی: ضددرد غیر مخلر، ضدتب
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص جویدنی، قطره، الگزیر، قرص و شیاف
مقدار و روش مصرف: یک تا دو قرص ۳۲۵ میلی گرمی، هر ۴ تا ۶ ساعت و حداکثر ۴ گرم در روز
موارد عمدۀ استعمال دارو: کاهش تب، تسکین موقت درد متوسط یا خفیف.
عوارض جانبی مهم: دوز عادی آن عوارض جانبی مهمی ندارد. **عوارض مصرف بلندمدت:** واکنش‌های حساسیتی مثل کهیر، تب، تحریک اعصاب مرکزی، التهاب زبان و خواب آلودگی.
عوارض مسلمومیت‌داد: بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و سرگیجه.

Acetaminophen Codein استامینوفن کدئین

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص
مقدار و روش مصرف: ۱ - ۲ قرص هر ۴ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو: برای تسکین دردهای خفیف تا متوسط
عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، سرگیجه و منگی. **سایر عوارض آن عبارتند از:** احساس سرخوشی، بیوست و خارش.

Acetazolamide استازولامايد

گروه دارویی: ادرارآور
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص و ویال تزریقی
مقدار و روش مصرف: **جهت گلوکوم (آب سیاه) :** ۲۵۰ میلی گرم از راه خوراکی ۱ - ۱ بار در روز یا ۵۰۰ میلی گرم از راه عضلانی یا وریدی

موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان کمکی در گلوكوم (آب سیاه) ساده و ثانویه - درمان کمکی ادم (ورم) ناشی از نارسایی احتقانی قلب .

عوارض جانبی مهم : در کوتاه مدت عوارض جانبی مهمی ندارد اما عوارضی مثل بی‌حسی یا احساس سوزش دست و پا ، از دست دادن اشتها و خواب آلودگی ، می‌توانند به صورت جزئی ایجاد شوند .

Adult Cold

ادالت کلد (سرماخوردکی بزرگسالان)

گروه دارویی : ضداحتقان ، ضددرد ، ضدحساسیت **اشکال دارویی موجود در ایران :** قرص

مقدار و روش مصرف : ۲ قرص هر ۴ ساعت و حداکثر ۱۲ قرص در ۲۴ ساعت

موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان علائم سرماخوردگی ، آنفلوآنزا ، سینوزیت و آرژی دستگاه تنفسی فوقانی (با علائم : احتقان بینی ، تب ، عطسه ، آبریزش بینی و درد خفیف) .

عوارض جانبی مهم : کهیر ، تب ، تحریک اعصاب مرکزی ، خواب آلودگی ، بثورات جلدی ، خستگی ، ناراحتی گوارشی و سرگیجه .

Aluminium Acetate

استات الومینیم

اشکال دارویی موجود در ایران : بالک (Bulk)

گروه دارویی : ضدالتهاب ، ضدخارش

مقدار و روش مصرف : در بالغین : محلول ۱۰ درصد به صورت پانسمان مرطوب و محلول ۲۰ درصد به صورت لوسيون قابض

موارد عمدۀ استعمال دارو : تسکین التهاب و تمدیک پوست در شرایطی مثل : گرش حشرات ، راش ، آکنه ، آرژی و خارش مقعد .

عوارض جانبی مهم : افزایش تحریک و وسعت یافتن التهاب .

Aluminium Mg

الومینیم ام . جی

گروه دارویی : ضداسید

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص ، شربت و پودر جهت تهیۀ سوسپانسیون

مقدار و روش مصرف : ۴ - ۲ قاشق مرباخوری چهار بار در روز (یک ساعت بعد از هر وعده غذا و قبل از خواب) یا ۴ - ۲ قرص ۴ بار در روز (یک ساعت بعد از غذا و قبل از خواب) .

موارد عمده استعمال دارو : داروی کمکی در درمان زخم معده و اثنی عشر ، به عنوان ضداسید برای تسکین عوارض ناشی از اسید در زخم معده ، التهاب معده و التهاب مری .
عوارض جانبی مهم : تضعیف اعصاب مرکزی در کسانی که دچار نارسایی کلیه هستند .

Aluminium MGS**آلومینیم ام - جی - اس**

گروه دارویی : ضداسید ، ضدنفخ
اشکال دارویی موجود در ایران : قرص و سوسپانسیون
مقدار و روش مصرف : ۲ - ۱ قاشق غذاخوری یا ۲ - ۱ قرص ، هر ۴ - ۲ ساعت بین وعده‌های غذایی و قبل از خواب
موارد عمده استعمال دارو : به عنوان ضداسید و ضدنفخ جهت رفع ترش کردن و دفع تجمع گاز در معده در بیماری زخم معده .
عوارض جانبی مهم : تضعیف اعصاب مرکزی در مبتلایان به نارسایی کلیه .

Allopurinol**آلوبورینول**

نیاز به تجویز پزشک : دارد
گروه دارویی : ضدنقرس
اشکال دارویی موجود : قرص
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط
زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز بعد از غذا
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۴۸ - ۲۴ ساعت آثار آن شروع می‌شود و تا ۳۰ ساعت در بدن فعال است .
رزیم غذایی مناسب : مصرف مایعات فراوان (حدود ۲ لیتر در روز) توصیه می‌شود .
موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت وقوع راش ، تب ، گلودرد و لرز ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک قطع نکنید - مقادیر زیاد این دارو می‌تواند باعث تهوع ، استفراغ ، دل درد و سرگیجه شود که در این صورت باید پزشک را آگاه سازید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس مشکلی ایجاد نمی‌کند - در صورتی که دچار کاهش ایمنی یا مشکلات بلندمدت کبدی و کلیوی هستید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - تنها مشکل آن در مصرف بلندمدت ، افزایش خطر نقرس در هفته‌ها یا ماه‌های اول مصرف این دارو است .

عوارض ناخواسته: راش‌های آلرژیک (دانه‌های پوستی ناشی از آلرژی)، گلودرد، تب و لرز. اگر بعد از غذا مصرف شود، کمتر ممکن است باعث تهوع شود.

تداخل‌های دارویی: دارو با بلوکه کردن واکنش شکسته شدن مرکاپتوپورین و آزاتیوپرین باعث کاهش دوز مورد نیاز این داروها می‌شود. مقدار زیاد آسپیرین می‌تواند باعث کاهش اثر آلوپورینول شود. آلوپورینول می‌تواند اثر داروهای ضدانعقادی، سیکلوسپورین و مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنزیوتانسین (ACE) را افزایش دهد و نیز اثر کلرپروپامید در کاهش قندخون را تشدید کند.

مصرف در شیردهی و بارداری: می‌تواند به داخل شیر ترشح شود و بی‌ضرر بودن آن در بارداری نیز ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Alprostadil الپروستادیل

گروه دارویی: پروستاگلاندین (ضد ناتوانی جنسی)

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: ژل و تزریقی

زمان و دفعات مصرف: ۳ بار در هفته

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف چند دقیقه اثر می‌کند.

رژیم غذایی مناسب: دارو باید در یخچال نگهداری شود اما نباید بخورد و آن را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز دانه‌های پوستی مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو پزشک را مطلع سازید - قبل از آگاهی از اثرات دارو بر روی خودتان، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون این دارو می‌تواند باعث اغتشاش ذهنی شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و یا دیابت و نیز در صورت مصرف داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - در صورت مصرف بلندمدت ممکن است اندازه‌گیری املاح خون ضرورت داشته باشد.

عوارض ناخواسته: مشکلات تنفسی در نوزادان، درد یا کبودی در محل تزریق و خطر راست شدن طولانی مدت آلت مردانه در مردان. در صورتی که راست و سفت شدن آلت تناسلی مردانه بیش از چهار ساعت طول بکشد، پزشک خود را آگاه سازید.

تداخل‌های دارویی: تداخل خاصی ندارد.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود.

Aluminium hydroxide

هیدروکسید الومینیم

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

گروه دارویی: ضدآسید

اشکال دارویی موجود: قرص، کپسول و مایع
میزان خطر در مصرف اضافی: کم
زمان و دفعات مصرف: به عنوان آنتی‌اسید ۴ بار در روز، برای زخم معده ۷-۶ بار در روز، برای درمان فسفات بالای خون ۳-۴ بار در روز و برای کنترل اسهال ۲ بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۱۵ دقیقه شروع به اثر می‌کند و ۲-۴ ساعت در بدن فعال است.

رزیم غذایی مناسب: در شخص مبتلا به فسفات بالای خون (هاپرفسفاتمی) همراه با مصرف این دارو، رزیم غذایی کم فسفات استفاده شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورتی که جهت درمان زخم معده یا هاپرفسفاتمی (غلظت بالای فسفات در خون) ناشی از نارسایی کلیه از آن استفاده می‌کنید، بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیاد دارو پزشک را مطلع سازید - اگر مشکل بلندمدت کلیوی دارید یا دچار مشکلات قلبی، فشارخون بالا، یبوست، بیماری‌های استخوانی و پورفیری هستید و نیز اگر از داروهای دیگری استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث کاهش سطح کلسیم و فسفات خون شده، منجر به ضعف و شکستگی استخوان شود.

عوارض ناخواسته: یبوست، تهوع و استفراغ. در صورت مصرف طولانی مدت می‌تواند منجر به دردهای استخوانی شود.

تداخل‌های دارویی: دارو باعث باز شدن قرص‌های پوشش‌دار روده‌ای، قبل از خروج آن‌ها از معده شده و سبب تحریک معده می‌شود. این دارو روی جذب یا ترشح ضدانعقادهای خوراکی، ضدجنون‌ها، فنی‌توئین، کورتون‌ها، پنی‌سیلامین و دیگوکسین اثر می‌کند.

صرف در شیردهی و بارداری: در شیردهی خطری ندارد اما در بارداری، بی‌ضرر بودن آن ثابت نشده و باید با پزشک مشورت شود.

Amantadine

آمانتادین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدبیروس و ضدپارکینسونیزم

اشکال دارویی موجود: مایع و کپسول

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: ۱-۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر ضدپارکینسون دارو، زودتر از دو هفته ظاهر نمی‌شود.
در درمان عفونت ویروسی، ۴۸ ساعت بعد از مصرف اثر می‌کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز دانه‌های پوستی، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، پزشک را مطلع سازید - تا از اثر آن بر روی خود آگاه نشده‌اید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون این دارو می‌تواند باعث تاری دید، سرگیجه، توهّم، عدم توانایی در تمرکز فکری، اغتشاش ذهنی و آشفتگی شود - در صورت ابتلا به زخم معده، بیماری قلبی و مشکلات مزمن کبدی یا کلیوی و نیز مصرف داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - در صورت مصرف بلندمدت جهت درمان پارکینسونیزم، اثر آن کاهش می‌یابد و ممکن است داروی دیگری جایگزین آن شود.

عوارض ناخواسته: تاری دید، سرگیجه، آشفتگی، اغتشاش ذهنی و توهّم. در صورت بروز راش‌های پوستی، مصرف آن را متوقف کرده، پزشک را آگاه سازید.

تداخل‌های دارویی: این دارو باعث افزایش اثر داروهای کولینزیک می‌شود.

مصرف در شیردهی و بارداری: می‌تواند وارد شیرمادر شود و بی‌ضرر بودن آن در بارداری نیز ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

آمینو اسید ۵ و ۱۰ درصد Aminoacid 5% and 10%

گروه دارویی: درمان تغذیه داخل وری، به عنوان ماده کالریزا

اشکال دارویی موجود در ایران: به صورت محلول ۵٪ و ۱۰٪

مقدار و روش مصرف: روزانه ۱ تا ۱/۵ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

موارد عمده استعمال دارو: جهت حفظ پروتئین و درمان تعادل منفی ازت، در بیمارانی مثل مبتلایان به سپسیس و ترومای (ضربه) شدید

عوارض جانبی مهم: سرد درد، سرگیجه، احساس گرمی، افزایش فشارخون، تهوع، استفراغ، عفونت و ترومبوز وریدی.

Amiloride

آمیلوراید

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم

میزان خطر در مصرف اضافی : کم اشکال دارویی موجود : مایع و قرص

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز (هنگام صبح)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۲-۴ ساعت اثر دارو شروع می‌شود و تا ۱۲-۲۴ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب : از مصرف غذاهای حاوی پتاسیم زیاد مانند : میوه خشک و نمک‌های محتوى این عنصر پرهیز کنید.

عوارض ناخواسته : اختلالات گوارشی ، تشنجی ، اغتشاش ذهنی و احتباس پتاسیم که می‌تواند باعث ضعف ماهیچه‌ها و بی‌حسی شود. در صورت بروز راش جلدی مصرف آن را متوقف کرده و پزشک را آگاه سازید.

تداخل‌های دارویی : این دارو ، سطح خونی لیتیم را افزایش می‌دهد و منجر به مسمومیت با لیتیم می‌شود. مصرف این دارو با گروه NSAIDs ، سیکلوسپورین و مهارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آنتیوتانسین (ACE) باعث افزایش خطر احتباس پتاسیم در بدن می‌شود.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری بی‌ضرر بودن آن ثابت نشده و در شیردهی نیز می‌تواند وارد شیر شده شیرخوار را تحت تأثیر قرار دهد. در هر دو مورد با پزشک نیز مشورت کنید.

Amitriptyline

آمی‌تریپتیلین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدافسردگی سه حلقه‌ای

میزان خطر در مصرف اضافی : بالا

اشکال دارویی موجود : مایع تزریقی ، قرص و کپسول‌های کندآزادشونده

زمان و دفعات مصرف : ۱-۴ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آثار آرامبخش دارو ظرف چند ساعت ظاهر می‌شود. آثار کامل ضدافسردگی دارو به ۲-۴ هفته زمان نیاز دارد و تا ۶ هفته در بدن فعال است.

نحوه تگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض جانبی شدید ، مصرف این دارو را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت ایجاد تپش قلب و یا کاهش هوشیاری اقدامات پزشکی فوری لازم است - تا از اثر این دارو بر روی خود آگاه نشده‌اید ، از مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث تاری دید و کاهش دقت و هوشیاری شود - اگر دچار مشکلات قلبی ،

تشنج صریعی ، گلوکوم ، بیماری‌های روانی مانیا (سرخوشی) و جنون ، مشکلات غده تیروئید و مشکلات بلندمدت کلیوی و کبدی هستید و نیز اگر از داروی دیگری استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : خواب آلودگی ، خشکی دهان ، تعریق ، تاری دید ، تپش قلب ، گلودرد و اختلال در دفع ادرار .

تداخل‌های دارویی : در موارد نادری داروهای گروه مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز (MAOIs) در صورت مصرف هم‌زمان با این دارو می‌توانند باعث تداخل‌های جدی شوند . همه داروهای دارای اثر آرامبخش ، اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می‌دهند .

مصرف در شیردهی و بارداری : دارو می‌تواند به داخل شیر ترشح شود و بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Amoxicillin

آموکسیسیلین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : آنتی‌بیوتیک گروه پنی‌سیلین

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : مایع ، کپسول ، قرص ، تزریقی و پودر (که در آب حل می‌شود)

زمان و دفعات مصرف : ۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۱-۲ ساعت اثر می‌کند و تا ۸ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت داشتن حساسیت و آلرژی ، قبل از تکمیل دوره درمان و بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی و یا مصرف مقدار زیادی از این دارو پزشک را مطلع کنید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس ایرادی ندارد - در صورت ابتلا به آسم و آگزما ، کولیت اولسراطیو ، آلرژی ، لوسی مزمون و تب گلندولار و نیز در صورت مصرف داروهای دیگر و یا حساسیت به پنی‌سیلین و سفالوسپورین‌ها ، پزشک را در جریان قرار دهید - معمولاً برای دوره‌های بلندمدت تجویز نمی‌شود .

عوارض ناخواسته : تهوع و اسهال شایع هستند . در صورت تنگی نفس ، خس خس سینه ، راش خارش دار و تب ، احتمال واکنش‌های حساسیتی مطرح می‌شود . در صورت ایجاد راش یا ورم مفاصل پزشک خود را آگاه سازید .

تداخل‌های دارویی : این دارو اثر ضدبارداری‌های خوراکی را کاهش می‌دهد و می‌تواند باعث افزایش احتمال شروع خونریزی شود.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری اشکالی ندارد و در شیردهی نیز مقادیر معمولی آن مشکلی ایجاد نمی‌کند.

Amphotericin

آمفوتريسيين

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدقارچ

میزان خطر در صرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، تزریقی و قرص مکیدنی

زمان و دفعات صرف : شکل خوراکی ، هر ۶ ساعت یک بار و شکل تزریقی با فاصله بیشتر از ۶ ساعت زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : دارو ۲-۴ ساعت بعد از صرف اثر می‌کند و ۳-۶ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب : در صورت صرف شکل تزریقی این دارو ، سطح پتابسیم و منیزیم خون کاهش می‌یابد که باید کمبود این عناصر جبران شود.

موارد منع صرف و احتیاط : دوره درمان این دارو را کامل کنید - در صورت مشاهده علائم غیرعادی یا صرف مقدار زیادی از این دارو ، پزشک را مطلع سازید - صرف آن در رانندگی و کارهای حساس مشکلی ایجاد نمی‌کند - در صورت داشتن مشکل مزمن کلیوی و سابقه حساسیت به آمفوتريسيين و نیز صرف داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - صرف بلندمدت آن می‌تواند باعث کاهش سطح پتابسیم و منیزیم خون و آسیب‌دیدگی کلیه و بیماری‌های خونی شود.

علوارض ناخواسته : شکل خوراکی دارو عوارض چندانی ندارد اما عوارض جانبی در شکل تزریقی عبارتند از : تهوع ، سردرد و دردهای عضلانی.

تداخل‌های دارویی : این دارو سمیت دیگوکسین و خطر کاهش پتابسیم ناشی از صرف دیورتیک‌ها را افزایش می‌دهد - کورتون‌ها اتلاف پتابسیم ناشی از صرف این دارو را افزایش می‌دهند - صرف همزمان این دارو با سیکلوسپورین و آمینوگلیکوزیدها باعث افزایش احتمال آسیب‌دیدگی کلیه‌ها می‌شود.

صرف در شیردهی و بارداری : شکل خوراکی مشکلی برای بارداری و شیردهی ایجاد نمی‌کند. شکل تزریقی در بارداری فقط در صورت عفونت‌های شدید تجویز می‌شود اما در خصوص صرف این نوع در دوران شیردهی با پزشک مشورت شود.

Ampicillin آمپی سیلین

گروه دارویی: آنتی بیوتیک گروه پنی سیلین
شکال دارویی موجود در ایران: قرص ، کپسول ، سوسپانسیون و ویال تزریقی
مقدار و روش مصرف: ۵۰۰ - ۲۵۰ میلی گرم هر ۶ ساعت از راه خوراکی - ۲۵۰ میلی گرم تا دو گرم هر ۶ ساعت از راه تزریق عضلانی یا وریدی
موارد عمدۀ استعمال دارو: عفونت‌های دستگاه ادراری ، دستگاه تنفسی ، مجاري گوارشی و پوست همچنین عفونت‌های سینوس‌ها ، گوش میانی و منژیت باکتریایی .
عوارض جانبی مهم: حساسیت ، عوارض گوارشی شامل تهوع و استفراغ ، عوارض خونی مثل کم‌خونی ، عوارض عصبی مثل اضطراب و عوارض کلیوی مانند نفریت .

Amyl Nitrite آمیل نیتریت

گروه دارویی: گشادکننده رگ‌ها (از داروهای مورد استفاده در آنژین صدری)
شکال دارویی موجود در ایران: آمپول جهت استفاده استنشاقی
مقدار و روش مصرف: ۰.۳٪ - ۰.۱۸٪ میلی لیتر از راه استنشاقی
موارد عمدۀ استعمال دارو: برای انبساط رگ‌های قلبی در آنژین صدری - جهت گشاد کردن ااهای هوایی در اسپاسم و تنگی مجاري هوایی داخل ریه‌ها .
عوارض جانبی مهم: سردرد ، گرگرفتگی گذرا ، کاهش فشارخون وضعیتی ، تهوع ، استفراغ ، سرگیجه ، سنکوب و تاکیکاردي یا تند شدن ضربان قلب .

Antihemorrhoid آنتی هموروئید

گروه دارویی: درمان گر هموروئید (بواسیر)
اشکال دارویی موجود در ایران: پماد و شیاف
مقدار و روش مصرف: شیاف : قبل از خواب و بعد از هر بار اجابت مزاج یک عدد - پماد : برحسب نیت بیماری چند بار در روز
موارد عمدۀ استعمال دارو: درمان علامتی هموروئید (بواسیر) - درمان دیگر اختلالات مقعدی مثل : لتهاب راست روده ، شقاق مقعد و شقاق همراه با فیستول .

عوارض جانبی مهم: ضایعات جلدی، کهیر، کاهش فشارخون، کاهش ضربان قلب، خواب آلودگی، تشنج و ضعف تنفس.

Antihistamine Decongesant

آنتی هیستامین دکونترسان

گروه دارویی: آنتی هیستامین، ضداحتقان

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص

مقدار و روش مصرف: یک قرص هر ۸ - ۶ ساعت یک بار

موارد عمدۀ استعمال دارو: رفع احتقان بینی و شبیوراستاش در سرماخوردگی، سینوزیت و عفونت‌های حاد مجاری تنفسی فوقانی - رفع علائم رینیت ناشی از آلرژی.

عوارض جانبی مهم: سستی و تپش قلب، سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان و تشنج.

Artifical Tears

آرتیفیکال تیرز

گروه دارویی: اشک مصنوعی

اشکال دارویی موجود در ایران: قطره

مقدار و روش مصرف: چکاندن ۲ - ۱ قطره هر ۸ - ۶ ساعت داخل چشم

موارد عمدۀ استعمال دارو: به عنوان نرم‌کننده چشم برای چشم‌های مصنوعی و لنزهای تماسی، برای رفع خشکی و تحریک چشم همراه با کمبود تولید اشک.

A . S . A Codeine

آ - اس - آ کدئین (آسپیرین کدئین)

گروه دارویی: ضددرد، ضدتسب، ضدالتهاب

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص

مقدار و روش مصرف: ۱ - ۲ قرص هر ۴ ساعت یک بار

موارد عمدۀ استعمال دارو: تسکین درهای خفیف تا شدید

عوارض جانبی مهم: سرگیجه، تهوع، استفراغ، بیوست، احساس سرخوشی، صدای زنگ در گوش و خونریزی از معده.

Ascorbic Acid

اسید اسکوربیک (ویتامین C)

گروه دارویی: ویتامین

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص، قرص جوشان، پودر و تزریقی

قدار و روش مصرف : بہت پیشگیری از اسکوروی : ۶۰ - ۴۵ میلی‌گرم در روز از راه عضلانی، خوراکی، وریدی و یا زیر جلدی

بہت درمان اسکوروی : ۱۵۰ - ۵۰۰ میلی‌گرم از راه عضلانی، خوراکی، وریدی یا زیر جلدی ۲ - ۱ ار در روز

وارد عمده استعمال دارو : پیشگیری از اسکوروی و درمان آن - مصرف به عنوان آنتی‌اکسیدان - صرف برای کاهش شدت و مدت سرماخوردگی .

عوارض جانبی مهم : در دواهای بالا باعث : تهوع ، استفراغ ، سوزش سر دل ، اسهال ، کرامپ‌های سکمی ، سردرد ، بی‌خوابی و افزایش سوزش ادرار .

Aspirin

آسپیرین

تروه دارویی : مسكن غیر اوپیوئیدی

بیزان خطر در مصرف اضافی : بالا

شکال دارویی موجود : قرص ، شیاف و کپسول‌های کندآزادشونده

مان و دفعات مصرف : هر ۶-۴ ساعت یک بار همراه با غذا یا شیر برای تسکین درد یا تب

مان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : قرص ظرف ۶۰ - ۳۰ دقیقه و شیاف و کپسول مرف ۸ - ۱/۵ ساعت اثر می‌کنند و تا ۱۲ ساعت در بدن فعال هستند. اگر برای جلوگیری از لخته بدن خون مصرف شود ، آثار ضدانعقادی آن تا چند روز در بدن باقی می‌ماند .

وارد منع مصرف و احتیاط : در صورت مصرف بلندمدت آن جز در صورت وقوع عوارض جانبی شدید ، بلون نایبر لازم مصرف آن را قطع نکنید - همه موارد مصرف اضافی آسپیرین نیاز به توجه جدی دارد اما در سورت بروز درد معده ، نارامی ، احساس صدای زنگ در گوش و تاری دید و استفراغ ، اقدامات فوری لازم است - هنگام رانندگی و کارهای حساس ، مصرف آن اشکال ندارد - در صورت داشتن مشکل بلندمدت ملیوی یا کبدی ، ابتلا به آسم ، حساسیت به آسپیرین ، اختلال در لخته شدن خون ، ابتلا به زخم معده و نیز صرف داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت این دارو می‌تواند باعث بدتر شدن سم یا خونریزی و زخم معده شود - در بچه‌های زیر ۱۲ سال به هنگام تب منع مصرف دارد .

وارض ناخواسته : عوارض دارو در مصرف با دوز بالا ایجاد می‌شود و در صورت مصرف همراه غذا نتمال ایجاد عوارض کمتر است . این عوارض عبارتند از : سوءهاضمه ، خارش پوست ، خس خسینه ، استفراغ خونی ، مدفوع سیاه و احساس صدای زنگ در گوش .

تداخل‌های دارویی: کورتون‌ها، خطر خونریزی از معده و ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی خطر تحریک معده را در مصرف هم‌زمان آسپیرین افزایش می‌دهند - همچنین آسپیرین سمیت متواترکسات و اثر داروهای ضددیابت را افزایش می‌دهد و نیز می‌تواند خطر خونریزی‌های غیرعادی، اثر داروهای ضدانعقادی و خطر داروهای ضدنقرس را افزایش دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری توصیه نمی‌شود و در شیردهی می‌تواند به داخل شیر ترشح شود. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Atropine

آتروپین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

اشکال دارویی موجود: تزریقی، قرص، پماد و قطره چشمی

زمان و دفعات مصرف: قطره چشمی ۱-۴ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر قطره چشمی ۳۰ دقیقه طول می‌کشد و سایر اشکال دارویی بستگی به روش تجویز دارد. قطره چشمی ۷ روز و سایر اشکال دارویی چند روز در بدن فعال است. **نحوه تهداری از دارو:** دارو در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت ایجاد تپش قلب، لرز، تشنج، هذیان و کاهش هوشیاری پزشک را مطلع کنید - تا از اثر این دارو بر روی خودتان مطلع نیستید از انجام کارهای حساس و رانندگی در زمان مصرف آن خودداری کنید - اگر مبتلا به مشکلات مزمن کبدی و کلیوی، اختلالات ادراری و کولیت اولسراتیو هستید و اگر از لنزهای تماسی استفاده می‌کنید یا داروهای دیگری نیز مصرف می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته: تاری دید، خشکی دهان، بیوست، اختلال در دفع ادرار، تپش قلب و اغتشاش ذهنی.

تداخل‌های دارویی: این دارو خطر عوارض داروهای آنتی کولینرژیک را افزایش می‌دهد و باعث کاهش جذب گوارشی کتونازول می‌شود.

صرف در شیردهی و بارداری: می‌تواند به داخل شیر ترشح شود و بی‌ضرر بودن آن در بارداری نیز ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Azathioprine آزاتیوپرین

گروه دارویی: مهارکننده ایمنی، ضدروماتیسم

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: تزریقی و قرص

زمان و دفعات مصرف: یک بار در روز، همراه با غذا یا بعد از آن

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۲-۴ هفته آثار دارو شروع می‌شود اما آثار ضدروماتیسم آن زودتر از ۸ هفته نمایان نمی‌شوند.

نحوه تهدیاری از دارو: این دارو در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورتی که در اثر مصرف زیاد آن دچار تهوع، دل درد، اسهال و استفراغ شدید، اقدامات فوری لازم است - تا از اثر آن بر روی خود آگاه نیستید حین مصرف آن از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند منجر به ضعف و خستگی شود - اگر دچار مشکلات مزمن کلیوی یا کبدی هستید یا سابقه واکنش آلرژیک به آزاتیوپرین و مرکاپتوپورین دارید یا جدیداً به آبله مرغان مبتلا شده‌اید و یا دچار بیماری‌های خونی و عفونت هستید و اگر از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن احتمال بعضی سرطان‌ها و خطر مشکلات خونی را افزایش می‌دهد.

عوارض ناخواسته: تهوع، کاهش اشتها، نازک شدن موها، ضعف و خستگی، گلودرد، تب و خونریزی غیرعادی که نشانه کاهش پلاکت خون است.

تداخل‌های دارویی: این دارو اثر وارفارین را کاهش می‌دهد - آلوپورنیول، آثار این دارو را افزایش می‌دهد - کوتريموکسازول و تریمتوپریم در صورت مصرف همزمان با این دارو، خطر مشکلات خونی را افزایش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری: مقدار کمی از این دارو می‌تواند وارد شیر شود اما در بارداری مشکلی ایجاد نمی‌کند. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Baclofen باکلوفن

گروه دارویی: شل‌کننده عضلات

نیاز به تجویز پزشک: دارد

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط زمان و دفعات مصرف : ۳ بار در روز همراه شیر یا غذا

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : برخی آثار آن ظرف ۱-۳ ساعت ظاهر می‌شود اما آثار مفید کامل آن زودتر از چند هفته بعد از شروع تجویز دارو ظاهر نمی‌شود.

نحوه نگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته، جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد این دارو می‌تواند باعث استفراغ، ضعف و خواب آلودگی شدید شود که فوراً باید به پزشک اطلاع داده شود - تا اثر آن بر روی خود مطلع نیستید، از کارهای حساس و رانندگی دوری کنید چون این دارو می‌تواند باعث اغتشاش ذهنی و سرگیجه شود - اگر مبتلا به مشکلات مزمن کلیوی و کبدی، مشکل در دفع ادرار، سابقه زخم معده، تشنج صرعی، دیابت و مشکلات تنفسی هستید و اگر از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض تاخوسته: اغتشاش ذهنی، سرگیجه، خواب آلودگی، ضعف عضلانی و اختلال در دفع ادرار.

داخل‌های دارویی : اثر ضدفسارخون دیورتیک‌ها و داروهای ضدفسارخون را افزایش می‌دهد - برخی داروهای ضدپارکینسونیزم، همراه با این دارو باعث اغتشاش ذهنی و توهّم می‌شوند - ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای می‌توانند باعث افزایش اثر این داروشده و نیز باعث ضعف در عضله‌ها شوند.

مصرف در شیردهی و بارداری : می‌تواند وارد شیر شود اما مصرف مقادیر معمولی آن مشکلی برای شیرخوار ایجاد نمی‌کند و بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Barium Sulfate سولفات باریم

گروه دارویی : ماده حاجب دستگاه گوارش

اشکال دارویی موجود در ایران : پودر جهت تهیه سوسپانسیون

مقدار و روش مصرف : در عکس‌برداری از معده : ۴۵۰ - ۴۰ گرم دارو به صورت سوسپانسیون خوارکی در عکس‌برداری از روده بزرگ : ۷۵۰ - ۱۵۰ گرم از دارو به صورت سوسپانسیون از راه تنقیه

موارد عمده استعمال دارو : به عنوان ماده حاجب جهت عکس‌برداری از دستگاه گوارش به کار می‌رود. (جهت عکس‌برداری از روده بزرگ، به صورت تنقیه تجویز می‌شود).

عوارض جانبی مهم : به ندرت می‌تواند باعث انسداد روده یا آپاندیسیت شود.

B Complex**ب کمپلکس**

گروه دارویی : ویتامین

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص ، آمپول ، شربت و قرص جوشان

مقدار و روش مصرف : دوز پیشگیری : روزانه ۱ تا ۳ قرص یا یک قاشق مرباخوری تا یک قاشق غذاخوری شربت . جهت انفوژیون وریدی : ۱-۲ میلی لیتر در یک لیتر سرم قندی ۵ تا ۱۰ درصد . دوز درمانی : روزانه ۲-۳ قرص جوشان

موارد عمدۀ استعمال دارو : پیشگیری یا درمان کمبود ویتامین‌های گروه B - داروی کمکی همراه با آنتی‌بیوتیک‌های با طیف اثر وسیع - به عنوان مکمل غذایی در کسانی که تنذیۀ ناکافی دارند - مکمل غذایی در سالمندان و دوران نقاحت .

عوارض جانبی مهم : بثورات جلدی و خارش ، برافروختگی عمومی ، سفتی و حساس شدن محل تزریق .

Beclomethasone**بکلومتازون**

نیاز به تجویز پزشک : برخی فرآورده‌ها نیاز ندارند .

گروه دارویی : کورتون

زمان و دفعات مصرف : ۲-۴ بار در روز

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : در بیماری آسم ظرف یک هفته و در بیماری رینیت آلرژیک ظرف ۲-۳ روز آثار آن شروع می‌شود . اثرات مفید کامل این دارو ظرف ۴ هفته ظاهر می‌شود و چند روز بعد از توقف مصرف ، در بدن فعال است .

نحوۀ تهدیاری از دارو : دارو در ظرف درسته ، جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن پزشک را مطلع کنید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر دچار سل یا دیگر عفونت‌های بینی و دستگاه تنفس هستید یا دچار زخم ناشی از واریس هستید و اگر از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن برای آسم و رینیت اشکالی ندارد ولی مصرف دوز بالای اسپری بینی اثرات سیستمیک ایجاد می‌کند - مصرف بلندمدت کرم و پماد بکلومتازون می‌تواند تغییرات ماندگاری روی پوست ایجاد کند .

عوارض ناخواسته : عوارض داروهای استنشاقی و اسپری بینی عبارتند از تحریک مسیر بینی و عفونت‌های قارچی ، عفونت گلو و دهان و گرفتگی صدا و عوارض مصرف بلندمدت پماد شامل : تغییرات دائم در پوست است .

تداخل‌های دارویی: ندارد.

صرف در شیردهی و بارداری: اشکالی ندارد.

Beclomethasone Dipropionate

بکلومتازون دی پروپیونات

گروه دارویی: کورتیکواستروئید استنشاقی

اشکال دارویی موجود در ایران: افسانه دهانی، افسانه بینی

مقدار و روش مصرف: ۲ استنشاق، ۳-۴ بار در روز - در هالات شدید آسم: با ۱۶-۱۲ استنشاق

شروع کرده سپس مناسب با نیاز بیمار آن را تنظیم می‌کنیم.

موارد عمدۀ استعمال دارو: برای کنترل آسم، در بیمارانی که نیاز به درمان بلندمدت با کورتون دارند.

عوارض جانبی مهم: در افسانه دهانی: عفونت کاندیدایی حلق و دهان، خشونت صدا و خشکی

دهان. در افسانه بینی: عطسه، خونریزی از بینی و خارش و خشکی بینی.

Belladonna - Pb

بلادونا - پی‌بی

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک، تسکین بخش، ضدآسیاسیم

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص، الگزیر

مقدار و روش مصرف: یک یا دو قرص ۲ تا ۴ بار در روز و یا یک تا دو قاشق مرباخوری از الگزیر، ۳

یا ۴ بار در روز

موارد عمدۀ استعمال دارو: داروی کمکی در درمان بیماری اولسرپیتیک (زخم معده و روده)،

داروی کمکی در درمان سندروم روده تحریک‌پذیر.

عوارض جانبی مهم: طیش قلب، گرگرفتگی، اغتشاش ذهنی، سردرد، تاری دید، خشکی دهان و پیوست.

Benzocaine

بنزوکائین

اشکال دارویی موجود در ایران: پماد موضعی

گروه دارویی: بی‌حس کننده موضعی

مقدار و روش مصرف: کمترین دوز مؤثر به صورت موضعی مصرف می‌شود.

موارد عمدۀ استعمال دارو: تسکین موقت درد و ناراحتی در افتلالات: خارش پوست، سوختگی خفیف،

آفتاب سوختگی و گزیدگی حشرات.

عوارض جانبی مهم: حساسیت و واکنش‌های آلرژیک.

Benzoyl peroxide بنزوئیل پروکساید

گروه دارویی: ضدآکنه، ضدعفونت‌های قارچی پوست

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: ۱-۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: دارو، چربی پوست را کاهش داده و آثار ضدآکنه آن طرف ۴ هفته ظاهر می‌شود. مدت فعالیت دارو در بدن ۴۸-۴۶ ساعت است.

موارد منع مصرف و احتیاط: هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مصرف دوز بالای آن به صورت طولانی می‌تواند باعث تحریک شدید پوست، قرمزی، تورم و پوسته پوسته شدن پوست شود - مصرف آن در هنگام رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورتی که دچار اگزما و آفتاب سوختگی شدید هستید یا سابقه حساسیت قبلی به این دارو دارید و اگر از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - جز در صورت تجویز پزشک، نباید این دارو بیش از ۶ هفته استفاده شود.

عوارض ناخواسته: سوزش و گزش مؤقت در پوست، قرمزی، پوسته پوسته شدن، تورم، تاول و دلمه بستن.

تداخل‌های دارویی: صابون‌ها، مواد آرایشی و بهداشتی و دیگر داروهای ضدآکنه در صورت مصرف هم‌زمان با این دارو، باعث تحریکات پوستی می‌شوند.

صرف در شیردهی و بارداری: اشکالی ندارد.

Betahistine بتاهیستین

گروه دارویی: ضد منیر (Meniere) (نوعی سرگیجه)

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: قرص

زمان و دفعات مصرف: ۳ بار در روز بعد از غذا

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر می‌کند و ۶-۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون اجازه پزشک مصرف این دارو را متوقف نکنید - در صورتی که مصرف زیاد این دارو باعث کلاپس شد، اقدامات اورژانس انجام دهید - مصرف آن در هنگام رانندگی و کارهای

حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به آسم ، زخم معده و فئوکروموسیتوم هستید و اگر از داروی دیگری نیز استفاده می کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .
عوارض ناخواسته : سردرد ، تهوع و سوءهاضمه .

تدخلاتی دارویی : تداخل خاصی ندارد .

مصرف در شیردهی و بارداری : می تواند وارد شیر شود اما مقادیر معمولی آن مشکلی برای شیرخوار ایجاد نمی کند . بی ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است پس با پزشک مشورت کنید .

Betamethasone بتامتاژون

گروه دارویی : کورتون
نیاز به تجویز پزشک : دارد

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : تزریقی ، قرص ، کرم ، پماد ، لوسيون ، محلول مخصوص اسکالپ (پوست سر) ، پماد و قطره چشمی ، قطره بینی و قطره گوش

زمان و دفعات مصرف : شکل خوراکی و تزریقی یک بار در روز (هنگام صبح) و اشکال دیگر دارو متناسب با بیماری

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : شکل تزریقی در ۳۰ دقیقه و اشکال دیگر در ۴۸ ساعت اثر می کنند و دارو تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب : در صورت مصرف بلندمدت شکل تزریقی دارو ، رژیم کم سدیم و پر پتاسیم توصیه می شود .

نحوه نگهداری از دارو : دارو در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - اگر مدت زیادی از شکل خوراکی این دارو مصرف کردید پزشک ابتدا مقدار آن را به ترتیج کم کرده و سپس مصرف آن را متوقف می کند - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیاد این دارو پزشک را مطلع سازید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - مصرف بلندمدت شکل خوراکی آن می تواند باعث زخم معده ، نازکی پوست ، شکنندگی استخوان ، ضعف عضلات و مهار غده آдрنال شود .

عوارض ناخواسته : سوءهاضمه ، زخم معده ، آکنه ، تغییرات خلق ، نازک شدن پوست و ضعف عضلانی - (شکل موضعی آن مشکلی ایجاد نمی کند) .

تداخل‌های دارویی : این دارو در شخص مبتلا به دیابت باعث تغییر در انسولین مورد نیاز می‌شود - مصرف هم‌زمان دارو با تزریق واکسن‌ها باعث واکنش‌های جدی می‌شود - ضدتشنج‌ها ، اثر این دارو را کاهش می‌دهند - این دارو ، اثر داروهای ضدفسارخون و ضدمیاستنی گراویس را کاهش می‌دهد .
مصرف در شیردهی و بارداری : مصرف موضعی آن مشکلی برای بارداری و شیردهی ایجاد نمی‌کند . مقادیر معمولی قرص بتامتاژون اشکالی برای شیرخوار ایجاد نمی‌کند و مصرف دوز پایین آن مشکلی برای بارداری ایجاد نمی‌کند اما در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Bisacodyl بیزاکودیل

گروه دارویی : مسهله محرک روده

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص پوشش دار روده‌ای ، شیاف کودکان و شیاف بزرگسالان
مقدار و روش مصرف : در هر شبانه‌روز ، یک عدد شیاف یا ۲-۳ عدد قرص
موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان یبوست موقتی - تخلیۀ روده فراخ جهت آزمایشات روده (مثل سیگموئیدوسکوپی) .
عوارض جانبی مهم : اسهال و قولنج شکمی .

Bismuth Subcitrate بیسموت ساب سیترات

گروه دارویی : ضدزخم معده و روده ، ضداسهال

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص
مقدار و روش مصرف : اهم معده : هر ۶ ساعت یک قرص . اسهال : دو قرص هر نیم تا یک ساعت ، حداکثر هشت بار در یک روز . اسهال مسافران : ۲ تا ۴ قرص ، هر ۶ ساعت یک بار ، به مدت ۳ هفته .
موارد عمدۀ استعمال دارو : پیشگیری و درمان اسهال مسافرین ، زخم معده و روده ناشی از باکتری « هلیکوباکتر بیلوری » ، تسکین موقت سوء هاضمه .

عوارض جانبی مهم : تیرگی موقت مدفوع و زبان - سخت و متراکم شدن مدفوع در صورت مصرف دوز بالای دارو .

Bromhexine HCL برم هکزین

گروه دارویی : خلط‌آور

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص ، قطره ، الگزیر و تزریقی
مقدار و روش مصرف : ۲-۳ قاشق مرباخوری از شربت یا ۱-۲ عدد قرص هر ۸-۶ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو: به عنوان خلط‌آور در ناراحتی‌های مختلف تنفسی مثل : برونشیت ، آسم
 و سینوزیت .
عوارض جانبی مهم : اختلالات گوارشی .

Bromocriptine**بروموکریپتین**

گروه دارویی : ضدپارکینسونیزم و از عوامل هیپوفیزی
میزان خطر در مصرف اضافی : کم
نیاز به تجویز پزشک : دارد
اشکال دارویی موجود : کپسول و قرص
زمان و دفعات مصرف : ۱-۴ بار در روز همراه با غذا
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : بسته به وضعیت بیمار زمان تأثیر فرق می‌کند و
 حدود ۸ ساعت در بدن فعال است .

نحوه نگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته ، دور از نور و دسترس کودکان و در جای خشک و
 خنک نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم
 غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن ، پزشک را مطلع سازید - تا از اثر این دارو بر روی خودتان آگاه
 نشده‌اید ، از کارهای حساس و رانندگی خودداری کنید زیرا این دارو می‌تواند باعث سرگیجه و خواب آلودگی
 شود - اگر مبتلا به زخم معده ، مشکلات قلبی و پورفیری هستید و یا سابقه بیماری‌های روانی دارید و اگر از
 داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : تهوع ، استفراغ ، یبوست ، حرکات غیرعادی ، سرگیجه ، خواب آلودگی و سردرد .
تداخل‌های دارویی : ضدجذون‌ها با اثر این دارو مقابله کرده و خطر پارکینسونیزم را افزایش می‌دهند .
 دامپریدون و متوكلوپرامید بعضی آثار این دارو را کاهش می‌دهند . داروهای سمپاتومیمتیک آثار سمی
 برومکریپتین را افزایش می‌دهند .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری اثبات نشده و باید با پزشک مشورت
 شود . باعث مهار ترشح شیر در زنان شیرده می‌شود ، لذا در این خصوص نیز با پزشک مشورت شود .

Burn**پماد سوختگی**

گروه دارویی: ضدسوختگی

اشکال دارویی موجود در ایران: پماد (که از روغن کبد ماهی و اکسید روی (Zn) ساخته شده است) **مقدار و روش مصرف:** پیشگیری و تسکین التهاب و تحریک پوست شیرخواران بر اثر تماس با ادرار، تسکین سوختگی‌های جزئی و زخم‌های سطحی و تحریکات پوستی **موارد عمده استعمال دارو:** جهت پیشگیری از التهاب و تمیگ پوست: مقدار کافی پماد روی پوست بدن بچه در قسمت‌هایی که زیر پوشک قرار می‌گیرد مالیده شود. برای تسکین التهاب: روزانه ۳-۴ بار از دارو استفاده می‌شود.

Calamine - D**کالامین - دی**

اشکال دارویی موجود در ایران: کرم و لوسيون **مقدار و روش مصرف:** لوسيون یا کرم هر ۸-۶ ساعت یک بار روی ضایعات مالیده شود **موارد عمده استعمال دارو:** تسکین موقتی خارش و درد ناشی از نیش حشرات، تسکین درد و التهاب ناشی از آفتاب سوختگی، رفع علایم کهیر. **عوارض جانبی مهم:** ممکن است باعث التهاب شود.

Calcium Forte**کلسیم فورت**

گروه دارویی: افزایش دهنده کلسیم خون، جانشین کلسیم

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص جوشان **مقدار و روش مصرف:** در استئوپروز (پوکی استفحوان): دو قرص جوشان، سه بار در روز به مدت ۸ هفته و سپس در هر روز دو قرص جوشان به مدت ۶ ماه **موارد عمده استعمال دارو:** درمان پوکی استخوان

Calcium Gluconate**کلوکونات کلسیم**

گروه دارویی: جانشین کلسیم و داروی کمکی در تعادل الکترولیت‌ها

اشکال دارویی موجود در ایران: تزریقی (آمپول ۱۰٪ ده میلی لیتری) **مقدار و روش مصرف:** روزانه ۱۵ - ۱ گرم (هر بار ۲۰ - ۵ میلی لیتر یا ۲ - ۵/۵ گرم)، از راه تزریق وریدی آهسته **موارد عمده استعمال دارو:** درمان هیپوکلسیمی (کاهش کلسیم خون) در موارد نیاز فوری به افزایش کلسیم خون - برای پیشگیری از هیپوکلسیمی در حین انتقال خون - درمان کمکی برای کنترل علائم مسمومیت با سرب. **عوارض جانبی مهم:** احساس سوزش، کاهش فشارخون، کند شدن ضربان قلب، ایست قلبی، آهکی شدن بافت نرم در تزریق موضعی.

Calcium Pantothenate**کلسیم پانتوتنات**

گروه دارویی: از مشتق‌ات مصنوعی اسید پانتوتنیک (ویتامین B₅) **اشکال دارویی موجود در ایران:** قرص **مقدار و روش مصرف:** روزانه ۱۰۰ - ۱۰۰ میلی گرم از راه خوراکی **موارد عمده استعمال دارو:** به عنوان مکمل غذایی، درمان کمبود ویتامین B₅، سندروم سوزش پا.

Calcium Supplements**مکمل کلسیم**

گروه دارویی: افزایش دهنده کلسیم خون **اشکال دارویی موجود در ایران:** شربت **مقدار و روش مصرف:** ۳ - ۱ قاشق مرباخوری، هر ۶ تا ۸ ساعت یک بار **موارد عمده استعمال دارو:** به عنوان مکمل غذایی در بارداری، شیردهی، پوکی استخوان و نرمی استخوان.

Carbamazepine**کاربامازپین**

نیاز به تعویز پزشک: دارد	گروه دارویی: ضد تشنج، ضد جنون
زمان و دفعات مصرف: ۱ - ۴ بار در روز	میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۴ ساعت آثار آن شروع می‌شود و ۱۲ - ۲۴ ساعت در بدن فعال است.	

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز عوارض جانبی شدید مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث لرز، تشنگ و اغما شود، در این صورت پزشک را خبر کنید - در خصوص مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس با پزشک خود مشورت کنید داگر مبتلا به مشکلات مزمن کبدی یا کلیوی و مشکلات قلبی هستید و اگر در مصرف داروهای دیگر مشکل داشته‌اید و نیز در صورتی که داروی دیگری مصرف می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند خطر تغییر در کارکرد کبد و ناهنجاری‌های پوستی و خونی را افزایش دهد.

عارضن ناخواسته: سرگیجه، خواب‌الودگی، ضعف در هماهنگی بدن، حالت دست و پا چلفتی، تهوع، ورم مج پا، تاری دید، گلودرد، گرفتگی صدا و دانه‌های پوستی (راش پوستی).

داخل‌های دارویی: داروهای ضدافسردگی و ضدجنون می‌توانند با اثر ضدتشنج دارو مقابله کنند - با برخی داروهای ضد صرع تداخل متنوع و پیچیده‌ای دارد - این دارو باعث کاهش اثر ضدانعقادها، مسکن‌ها و ضدبارداری‌های خوراکی شده و در مقابل باعث افزایش اثر سایمتیدین، ایزونیازید، وراپامیل، کوبروکسامول و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود.

صرف در شیردهی و بارداری: مقادیر معمولی دارو مشکلی برای شیرخوار ایجاد نمی‌کند. در بارداری ممکن است باعث نقایصی در جنین شود. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Carbimazole

کربی‌مازول

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدتیروئید

اشکال دارویی موجود: قرص

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: ۲-۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: برخی اثرات آن، ظرف ۲-۳ هفته ظاهر می‌شود اما اثرات کامل آن ظرف ۴-۸ هفته ظاهر می‌شود. دارو ۱۲-۲۴ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب: ممکن است پزشک از شما بخواهد که غذاهای حاوی ید را کمتر مصرف کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط: مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث تهوع، استفراغ و سردرد شود، در این صورت باید به پزشک اطلاع دهید - گرچه این دارو می‌تواند باعث سرگیجه شود اما مشکلی در کارهای حساس و رانندگی ایجاد نمی‌کند - در صورتی که دچار مشکلات مزمن کبدی یا کلیوی هستید و اگر از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث کاهش تولید سلول‌های خونی توسط مغز استخوان شود.

عوارض ناخواسته: سردرد ، سرگیجه ، تهوع ، ریزش موی سر، درد مفاصل و گلودرد .
تداخل‌های دارویی: ندارد .

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری ممکن است باعث نقاچی در جنین شود اما در شیردهی مقادیر کم آن مشکلی ایجاد نمی‌کند . در هر دو مورد با پزشک مشورت شود .

کاستر اویل (روغن کرچک)

گروه دارویی: مسهل محرک
اشکال دارویی موجود در ایران: بالک (Bulk)
مقدار و روش مصرف: ۱۵ - ۶۰ میلی لیتر به صورت یک باره ، ۱۶ ساعت قبل از گرفتن عکس رادیولوژی
موارد عمدۀ استعمال دارو: جهت آماده‌سازی شکم برای گرفتن عکس رادیولوژی از کولون (روده بزرگ) و کلیه‌ها - جهت تخلیه مواد محرک سمی از روده .
عوارض جانبی مهم: تحریک روده بزرگ ، دردهای شکمی ، تهوع ، استفراغ ، نفخ و سهولت زیاد در دفع مدفع .

Cefazolin Sodium سفارازولین سدیم

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک (از نسل اول سفالوسپورین)
اشکال دارویی موجود در ایران: ویال تزریقی
مقدار و روش مصرف: در درمان عفونت‌های متوسط تا شدید بالغین gr ۲ - ۲۵۰ mg از راه عضلانی یا وریدی ، هر ۸ ساعت (حداقل ۱۲ گرم در روز)
موارد عمدۀ استعمال دارو: عفونت‌های خطربناک ریه - عفونت‌های خطربناک دستگاه ادراری و تناسلی - عفونت‌های خطربناک پوست ، بافت نرم ، استخوان‌ها و مفاصل .
عوارض جانبی مهم: اسهال ، بی‌اشتهاایی ، تب ، کهیر و راش‌های پوستی .

Cefotaxime Sodium سفوتاکسیم سدیم

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک (از نسل سوم سفالوسپورین)
اشکال دارویی موجود در ایران: ویال تزریقی

مقدار و روش مصرف: ۱ گرم از راه وریدی یا عضلانی هر ۸-۱۲ ساعت [تا ۲ گرم هر ۴ ساعت یک بار و حداکثر ۱۲ گرم در روز]

موارد عدمه استعمال دارو: عفونت‌های خطربناک ریه، پوست، استخوان‌ها، مفاصل، مجاري ادراری تناسلی و دستگاه عصبی مرکزی (شامل منثیت) .

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، بی‌اشتهاایی، خارش، تب، سفتی و حساسیت محل تزریق.

Ceftizoxime Sodium

سفتی زوکسیم سدیم

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک (از نسل سوم سفالوسپورین)

اشکال دارویی موجود در ایران: تزریقی

مقدار و روش مصرف: ۱ گرم از راه عضلانی یا وریدی هر ۸-۱۲ ساعت یک بار [تا ۲ گرم هر ۴ ساعت یک بار]

موارد عدمه استعمال دارو: عفونت‌های ریه، پوست، استخوان‌ها و مفاصل، مجاري ادراری، منثیت و عفونت‌های داخل شکمی .

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، راش پوستی و تب .

Cefteriaxone Sodium

سفتریاکسون سدیم

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک (از نسل سوم سفالوسپورین)

اشکال دارویی موجود در ایران: تزریقی

مقدار و روش مصرف: جهت درمان عفونت‌های متواتر تا شدید: ۱-۲ گرم از راه وریدی یا عضلانی هر ۲۴-۱۲ ساعت (حداکثر ۴ گرم در روز)

موارد عدمه استعمال دارو: عفونت‌های ریه، پوست، استخوان‌ها و مفاصل، مجاري ادراری، لگن و شکم .

عوارض جانبی مهم: اسهال، درد شکم، خارش نواحی تناسلی، خارش و تب .

Cephalexin

سفالکسین

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک گروه سفالوسپورین

زمان و دفعات مصرف: ۲-۴ بار در روز

اشکال دارویی موجود: قرص، مایع و کپسول

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف یک ساعت اثر دارو شروع می‌شود و ۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : حتی در صورت بھبود علایم بیماری، مصرف آن را متوقف نکنید - دلایل بروز علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیاد این دارو پزشک را باخبر کنید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر سابقه حساسیت به پنی‌سیلین یا داروهای گروپ سفالوسپورین را دارید و اگر مشکل بلندمدت کبدی یا سابقه بیماری‌های خونی دارید و نیز در صورتی که از داروی دیگری هم استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - معمولاً این دارو به صورت بلندمدت مصرف نمی‌شود.

عوارض ناخواسته : اسهال (شایع‌ترین عارضه)، تهوع و دل درد.

تداخل‌های دارویی : پروبنساید باعث افزایش سطح این دارو در بدن می‌شود - سفالکسین منجر به کاهش اثر ضدبارداری‌های خوراکی می‌شود که در این صورت باید با پزشک مشورت کنید.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری مشکلی ایجاد نمی‌کند. در شیردهی مقادیر معمولی آن مشکلی ایجاد نمی‌کند اما بهتر است با پزشک نیز مشورت کنید.

Cephalothin Sodium سفالوتین سدیم

گروه دارویی : آنتی‌بیوتیک (از نسل اول سفالوسپورین)

اشکال دارویی موجود در ایران : ویال تزریقی

مقدار و روش مصرف : مجهت درمان عفونت‌های متوسط تا شدید؛ ۲ gr - ۲۵۰ mg هر ۶ ساعت از راه عضلانی یا وریدی [تا ۲ گرم هر ۴ ساعت یک بار (حداکثر ۱۲ گرم در روز)]

موارد عمده استعمال دارو : عفونت‌های شدید ریه، دستگاه تناسلی - ادراری و لوله گوارش - عفونت‌های پوست - منژیت.

عوارض جانبی مهم : سرگیجه، سردرد، اختلال حس چشایی، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهاایی و راش پوستی.

Charcoal Activated زغال فعال

گروه دارویی : ضداسهال، ضدنفخ، پادرزه

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص، سوسپانسیون و بالک (Bulk)

مقدار و روش مصرف: در مسمومت ماده ۱۰۰ - ۳۰ گرم از راه خوراکی در حداقل ۲۴۰ - ۱۸۰ میلی لیتر آب حل شود. در افتلالات گوارشی: ۹۷۵ - ۵۲۰ میلی گرم از راه خوراکی بعد از غذا. همچنان: ۴ - ۱ گرم از راه خوراکی بعد از هر وعده غذا

موارد عمدۀ استعمال دارو: درمان اورژانسی در مسمومیت با اکثر داروها - جذب گاز روده در درمان سوء هاضمه و نفخ.

عوارض جانبی مهم: استفراغ، بیوست و اسهال.

Children Cold**چیلدرن کلد (سرماخوردکی اطفال)**

گروه دارویی: ضداحتقان، ضدحساسیت، ضددرد

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص جویدنی

مقدار و روش مصرف: در کودکان زیر ۶ سال فقط با نظر پزشک و در کودکان ۱۲ - ۶ ساله ۲ قرص هر ۶ ساعت یک بار

موارد عمدۀ استعمال دارو: برای تسکین موقت گرفتگی، آبریزش بینی و سایر علائم سرماخوردگی در کودکان.

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، بیقراری، تحریکات معده و گیجی.

Chloramphenicol**کلرام芬یکل****نیاز به تجویز پزشک:** دارد**گروه دارویی:** آنتی بیوتیک**میزان خطر در مصرف اضافی:** کم**اشکال دارویی موجود:** کپسول، قرص، کرم، تزریقی، پماد چشمی، قطره چشمی و گوشی**زمان و دفعات مصرف:** شکل خوراکی و تزریقی آن هر ۶ ساعت یک بار، فرآورده‌های چشمی هر ۶ ساعت یک بار و قطره چشمی ۳ بار در روز.**زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن:** اثر دارو ۱-۳ روز بعد از مصرف ظاهر می‌شود و ۸ ساعت در بدن فعال است.**نحوه نگهداری از دارو:** این دارو در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: حتی در صورت بھبود علایم بیماری، بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید و دوره درمان را کامل کنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی هستید یا از بیماری‌های خونی رنج می‌برید و اگر از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن خطر آسیب‌های چشمی و بیماری‌های خونی را افزایش می‌دهد.

عوارض ناخواسته: تاری دید، راش پوستی، تب، گلودرد و خستگی غیرعادی.

تدخّل‌های دارویی: کلامفنیکل اثر داروهایی مانند: فنی‌توئین، ضدانعقادهای خوراکی و ضددیابت‌های خوراکی را افزایش می‌دهد - فنوباریتال و ریفامپین اثر این دارو را کاهش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری: فرآوردهای چشمی و گوشی آن مشکلی برای بارداری و شیردهی ایجاد نمی‌کنند اما در خصوص مصرف شکل خوراکی آن، با پزشک مشورت کنید.

Chlordiazepoxide

کلردیازپوکساید

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضداضطراب دسته بنزو دیازپین

اشکال دارویی موجود: قرص و کپسول

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: ۴-۱ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: برخی آثار این دارو ظرف چند روز و برخی ظرف چند ماه بعد بروز می‌کنند. دارو ۱-۲ روز در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورتی که بیش از دو هفته از آن استفاده کرده‌اید نمی‌توانید بدون نظر پزشک مصرف آن را متوقف کنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از دارو، به پزشک اطلاع دهید - تا از اثرات این دارو بر روی خود آگاه نیستید از مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس دوری کنید، چون می‌تواند باعث کاهش دقیق و هوشیاری و کندی عکس‌العمل شود - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی هستید یا سابقه مشکلات تنفسی دارید و اگر به داروی خاصی معتاد هستید یا مشکلاتی در ارتباط با الكل دارید و در صورتی که از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث کاهش اثرات آن روی بدن و اعتیاد شخص به دارو شود.

عوارض ناخواسته: خواب‌آلودگی، سرگیجه و فراموشی که چند روز بعد از شروع درمان رفع می‌شوند.

داخل‌های دارویی : عوارض داروهای ضدتشنج با مصرف این دارو افزایش می‌یابد - تمام داروهای رام‌بخش ، اثر آرام‌بخشی این دارو را افزایش می‌دهند .

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن دارو در بارداری و شیردهی ثابت نشده است و در شیردهی می‌تواند روی شیرخوار تأثیر بگذارد . لازم است در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Chloroquine کلروکین

لروه دارویی : ضدمالاریا ، ضدروماتیسم

یاز به تجویز پزشک : برای جلوگیری از مalaria نیازی به تجویز پزشک ندارد اما برای مصرف در موارد دیگر ، تجویز پزشک لازم است .

سیزان خطر در معرفت اضافی : بالا

مان و دفعات مصرف : یک بار در هفته برای جلوگیری از مalaria ، ۱-۴ بار در روز برای درمان مalaria و یک بار در روز برای درمان آرتربیت

مان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : در آرتربیت روماتوئید اثر این دارو ظرف ۲-۳ روز شروع می‌شود اما اثرات کامل آن ظرف ۶ ماه آشکار می‌شود . این دارو تا یک هفته در بدن فعال است .

نحوه تگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته ، جای خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض شدید ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - اگر در اثر مصرف مقدار زیاد آن مشکلات تنفسی ، تشنج و یا کاهش هوشیاری ایجاد شد اقدامات فوری انجام دهید - تا از اثر آن بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - اگر مبتلا به مشکلات کبدی و کلیوی یا کمبود آنزیم G6PD یا مشکلات چشمی و بینایی و یا بیماری پوستی پسوریاژیس هستید و نیز اگر سابقه تشنج دارید یا مبتلا به پورفیری هستید و همچنین اگر از داروی دیگری استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت این دارو می‌تواند باعث بیماری‌های خونی و آسیب‌های چشمی شود .

عارضن ناخواسته : تهوع ، اسهال ، دل درد ، سرگیجه ، راش پوستی و تغییرات بینایی .

داخل‌های دارویی : این دارو اثر ضدتشنج‌ها را کاهش می‌دهد - سطح خونی سیکلوسپورین را در خون افزایش می‌دهد - غلظت دیگوکسین را در خون افزایش می‌دهد - در صورت مصرف همزمان با آمیودارون باعث ریتم غیرعادی قلب می‌شود .

صرف در شیردهی و بارداری : مقادیر معمولی آن مشکلی برای بارداری و شیردهی ایجاد نمی‌کند. در هر دو مورد با پزشک نیز مشورت کنید.

Chlorpheniramin/chlorphenamine

کلرفنیرامین / کلرفنامین

گروه دارویی : آنتی‌هیستامین

نیاز به تجویز پزشک : در شکل مایع و قرص نیاز به تجویز پزشک ندارد اما شکل تزریقی آن با تجویز پزشک مصرف می‌شود.

اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، تزریقی

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : قرص و مایع ۴-۵ بار در روز و شکل تزریقی به صورت تک دوز در موقع نیاز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : شکل خوراکی ظرف ۶۰ دقیقه و شکل تزریقی ظرف ۲۰ دقیقه شروع به اثر می‌کند. این دارو ۶-۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون هیچ خطری می‌توان مصرف آن را متوقف کرد - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث آشفتگی و خواب‌آلودگی شود که باید به پزشک اطلاع داده شود - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید ، چون این دارو می‌تواند باعث خواب‌آلودگی ، سرگیجه و تاری دید شود - اگر مبتلا به تشنج صرعی ، گلوکوم و مشکلات ادراری هستید یا از مشکلات مزمن کبد رنج می‌برید و اگر داروی دیگری نیز مصرف می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند منجر به کاهش تأثیر آن روی بدن شود.

عوارض ناخواسته : شایع‌ترین عارضه ، خواب‌آلودگی است . عوارض دیگر : خشکی دهان ، تاری دید ، اختلال در دفع ادرار و دانه‌های پوستی . این دارو در کودکان باعث تحریک‌پذیری می‌شود.

تداخل‌های دارویی : اثر فنی‌توئین به وسیله این دارو تشدید می‌شود - تمام داروهای آرامبخش ، اثر آرامبخشی این دارو و تمام داروهای آنتی کولینرژیک ، اثر آنتی کولینرژیک آن را افزایش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری : مصرف مقادیر معمولی آن مشکلی برای شیرخوار ایجاد نمی‌کند. در بارداری بی‌ضرر بودن آن ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Chlorpromazine

کلرپرومایزین

گروه دارویی : ضداستفراغ و ضدجنون (گروه فنوتیازین)

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط بیاز به تجویز پزشک : دارد

شکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، تزریقی و شیاف

مان و دفعات مصرف : ۱-۴ بار در روز

مان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : شکل خوراکی ظرف ۶۰-۳۰ دقیقه ، شکل تزریقی ظرف ۱۵-۲۰ دقیقه و شیاف ظرف ۳۰ دقیقه شروع به اثر می کند . شکل تزریقی و خوراکی ۱۲-۸ ساعت و شیاف ۳-۴ ساعت در بدن فعال است .

بحوة نگهداری از دارو : دارو را دور از نور و دسترس کودکان ، در جای خشک و خنک و در ظرف بربسته نگهداری کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : مصرف آن را بدون مشورت با پزشک متوقف نکنید - مصرف مقادیر زیادین دارو می تواند باعث خوابآلودگی غیرعادی ، غش کردن ، ریتم غیرطبیعی قلب ، سفتی عضلات و آشفتگی شود که باید با پزشک مشورت شود - تا از اثر آن بر روی خود آگاه نشده اید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید ، چون می تواند باعث کندی عکس العمل و خوابآلودگی شود - اگر مبتلا به تشنج صرعی ، اختلالات قلبی ، مشکلات بلندمدت کلیوی و کبدی ، بیماری گلوکوم ، بیماری های تیروئید و بیماری پارکینسون هستید و اگر از داروهای دیگری نیز استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می تواند باعث بیماری های حرکتی شود .

عوارض ناخواسته : خوابآلودگی ، تاری دید ، سرگیجه و غش . بارزترین عارضه جانبی این دارو پارکینسونیزم است .

تداخل های دارویی : اثر داروهای مؤثر بر پارکینسونیزم را کاهش می دهد - تمام داروهای آرامبخش ، اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می دهند - اثر داروهای آنتی کولینرژیک می تواند اثر آنتی کولینرژیک این دارو را تشدید کند .

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی شود زیرا اگر در زمان نزدیک زایمان تجویز شود باعث خوابآلودگی نوزاد و طولانی شدن زایمان می شود . در شیردهی وارد شیر می شود و روی شیرخوار اثر می گذارد ، لذا با پزشک مشورت کنید .

Cholecalciferol (Vitamin D₃)

ویتامین D₃

گروه دارویی : ویتامین

اشکال دارویی موجود در ایران : کپسول ، آمپول ، محلول خوراکی ، قطره خوراکی

مقدار و روش مصرف: به علوان مکمل غذایی و مجهت افع کمبود ویتامین : روزانه ۱۰۰۰ - ۴۰۰ واحد از راه خوراکی

موارد عمده استعمال دارو : پیشگیری یا درمان راشیتیسم و نرمی استخوان .
عوارض جانبی مهم : در مصرف با مقادیر بالا ممکن است باعث : ضعف ، تهوع ، درد عضله و استخوان ، ترس از نور ، بی اشتهایی و کاهش وزن .

Cholestiramine کلستیرامین

گروه دارویی : پایین آورنده چربی خون ، کم کننده صفراء
اشکال دارویی موجود در ایران : پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی
مقدار و روش مصرف : دو ز ابتدائی : ۴ گرم ، ۳ بار در روز (قبل از غذا) . دو ز نگهدارنده : ۴ گرم ، ۴ - ۳ بار در روز (قبل از غذا و هنگام خواب)

موارد عمده استعمال دارو : برای تسکین خارش ناشی از انسداد مجرای صفراوی و کاهش غلظت کلسترول خون .

عوارض جانبی مهم : اسهال ، استفراغ ، نفخ ، بیوست ، التهاب پوست و زبان و مقدع ، کاهش جذب ویتامین A و D و کم خونی .

Cimetidine سایمتیدین

نیاز به تجویز پزشک : ندارد

گروه دارویی : خدرخم معده

اشکال دارویی موجود : تزریقی ، قرص ، مایع
میزان خطر در مصرف اضافی : خیلی کم
زمان و دفعات مصرف : ۱-۴ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آثار این دارو ظرف ۹۰ دقیقه شروع می شود و ۶ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب : این دارو را دور از نور و دسترس کودکان ، در جای خشک و خنک و در ظرف دربسته نگهداری کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز دانه های پوستی مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو با پزشک خود

مشورت کنید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس مشکلی ایجاد نمی‌کند - در صورتی که مشکلات کلیوی یا کبدی دارید و یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو معمولاً نیازی به مصرف بیش از هشت هفته ندارد.

عوارض ناخواسته: خستگی، سرگیجه، اغتشاش ذهنی، درد عضلانی، ناتوانی جنسی و بزرگی پستان‌ها در مردان.

داخل‌های دارویی: این دارو سطح خونی داروهای بنزودیازپین (مثل دیازپام)، تئوفیلین، آمینوفیلین، ضدتشنج‌ها، ضدآریتمی‌ها و داروهای ضدانعقاد خون را افزایش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری بی‌ضرر بودن آن اثبات نشده است و مصرف مقادیر معمولی آن در شیردهی اشکالی ندارد اما در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Cinarizine

سیناریزین

گروه دارویی: آنتی‌هیستامین (اثر ضداستفراغ هم دارد)

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط
نیاز به تجویز پزشک: ندارد

اشکال دارویی موجود: قرص و کپسول

زمان و دفعات مصرف: ۲ تا ۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف نیم ساعت اثرات آن شروع می‌شود و تا ۸ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورتی که برای بیماری‌های گوش داخلی یا مشکلات گردش خونی مصرف می‌کنید، جز در صورت بروز دانه‌های پوستی مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید اما اگر برای تهوع و استفراغ ناشی از مسافرت با ماشین از آن استفاده می‌کنید، هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مصرف مقدار زیاد این دارو می‌تواند باعث خواب‌آلودگی و برافروختگی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - چون این دارو می‌تواند باعث خواب‌آلودگی شود، قبل از این که از اثر آن بر روی خودتان آگاه شوید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید - در صورت ابتلا به گلوکوم، بزرگی پروستات، فشارخون و نیز مصرف داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن مشکلی ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته: خواب‌آلودگی، کرختی، خشکی دهان و تاری دید.

داخل‌های دارویی: تمام داروهای آرامبخش، اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن دارو در بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت شود .

Ciprofloxacin

سیپروفلوکسازین

گروه دارویی : ضدبacterی

میزان خطر در صرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات صرف : دو بار در روز همراه با مایعات فراوان

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : دارو ظرف چند ساعت اثر می کند و ۱۲ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب : مایعات به طور منظم و به مقدار فراوان صرف شود .

نحوه نگهداری از دارو : دارو در ظرف درسته ، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع صرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض جانبی شدید ، دوره درمان را کامل کنید - صرف مقدار زیاد آن می تواند باعث اختلالات روانی و تشنج شود که حتماً باید به پزشک اطلاع دهید - تا از اثر این دارو بر روی خود آگاه نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید زیرا می تواند باعث سرگیجه شود - در صورتی که مبتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی ، تشنج صرعی و کمبود آنزیم G6PD هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می کنید پزشک را آگاه سازید - صرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : تهوع ، استفراغ ، اغتشاش ذهنی ، اختلال در خواب و دانه های پوستی در مناطقی از پوست که در معرض نور آفتاب هستند .

تداخل های دارویی : این دارو سطح خونی فنی تؤین ، ضدانعقادها و ضددیابت های خوراکی را افزایش می دهد - سطح خونی تئوفیلین نیز می تواند در اثر صرف این دارو افزایش یابد - صرف همزمان NSAID ها با این دارو ، باعث افزایش احتمال تشنج صرعی می شود - ضدآسیدها روی جذب روده ای این دارو اثر می گذارند .

صرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است و در شیردهی نیز ممکن است عوارض نامطلوبی روی شیرخوار داشته باشد . حتماً با پزشک مشورت کنید .

Citalopram

سیتالوپرام

گروه دارویی: ضدافسردگی

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: یک بار در روز هنگام صبح یا غروب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: برخی آثار آن ظرف یک هفته ظاهر می‌شود، ولی آثار کامل آن زودتر از ۲-۴ هفته ظاهر نمی‌شود. در مصرف بلندمدت آثار دارویی تا هفته‌ها باقی است.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز عوارض شدید مصرف این دارو را قطع نکنید - در صورت مصرف مقدار زیاد دارو پزشک را مطلع نمائید - قبل از آگاهی از تأثیرات این دارو بروی خودتان از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خواب آلودگی شود - اگر مبتلا به صرع، مانیا، مشکلات قلبی و مشکلات کبدی و کلیوی هستید یا از داروهای ضدافسردگی به ویژه MAOIs استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته: تعریق، خشکی دهان، اضطراب، سوءهاضمه، تهوع و اسهال.

تداخل‌های دارویی: مصرف همزمان آن با داروهای گروه MAOIs باعث واکنش‌های شدید می‌شود. این دارو باعث کاهش اثر ضدتشنج‌ها می‌شود. عوارض دارو با سوماتریپتان و آگونیست‌های₁ 5HT افزایش می‌یابد، همچنین این دارو اثر داروهای ضدانعقادی را افزایش می‌دهد.

مصرف در شیردهی و بارداری: بی ضرر بودن آن در بارداری به اثبات نرسیده است. در شیردهی، می‌تواند وارد شیر شود و بر روی شیرخوار آثار نامطلوبی ایجاد کند.

Clemastine Fumarate

کلماستین فومارات

گروه دارویی: آنتی‌هیستامین، ضداحتقان، ضدآلرژی

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص، تزریقی

مقدار و روش مصرف: ۱ میلی‌گرم ۲ بار در روز و حداقل ۶ میلی‌گرم در روز

موارد عدمه استعمال دارو: تسکین علامتی رینیت الرژیک و علائم الرژی خفیف پوست مثل کهیز.

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، خشکی دهان، کهیز، حساسیت به دارو، گیجی، اختلال دید و دویینی.

Clidinium - C

کلیدینیوم - سی

گروه دارویی: آرامبخش، ضداسپاسم مجاری گوارشی

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص
مقدار و روش مصرف : ۱- قرص از راه خوراکی ، ۳- ۴ بار در روز
موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان زخم معده ، سندروم رودۀ تحریک‌پذیر .
عوارض جانبی مهم : طپش قلب ، تاری دید ، ترس از نور ، یبوست ، تهوع ، استفراغ ، کاهش
 تعریق ، احتباس ادرار و اغتشاش ذهنی .

Clindamycin HCL**کلیندامایسین****گروه دارویی : آنتی‌بیوتیک**

اشکال دارویی موجود در ایران : آمپول ، کیپسول ، سوسپانسیون اطفال ، محلول موضعی
مقدار و روش مصرف : هفت درمان عفونت‌های متوسط تا شدید : ۴۵۰ - ۱۵۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت
 از راه خوراکی و یا ۹۰۰ - ۳۰۰ میلی‌گرم هر ۸ - ۶ ساعت از راه عضلانی یا وریدی
موارد عمدۀ استعمال دارو : جهت درمان عفونت‌های خط‌ناک ، هنگامی که دیگر داروها موثر واقع
 نشوند تجویز می‌شود ، نوع موضعی آن جهت مداوای آکنه به کار می‌رود .
عوارض جانبی مهم : اسهال ، استفراغ ، تهوع ، نفخ ، خشکی صورت ، درد عضلانی و درد و سفتی در
 ناحیه تزریق .

Clobetasol**کلوبتازول****نیاز به تجویز پزشک :** دارد**گروه دارویی :** کورتیکواستروئید موضعی**اشکال دارویی موجود :** پماد و کرم**میزان خطر در مصرف اضافی :** کم

زمان و دفعات مصرف : ۱-۲ بار در روز - برای بیماری‌های پوستی نباید بیش از ۵ روز مصرف شود .
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۱۲ ساعت اثرات آن شروع می‌شود ولی اثرات
 مفید کامل آن ظرف ۴۸ ساعت ظاهر می‌شود . دارو ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مصرف اضافی آن
 معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در صورت مشاهده علایم غیرعادی پزشک را باخبر کنید -
 می‌توان در هنگام رانندگی و کارهای حساس نیز از آن استفاده کرد - در صورتی که مبتلا به
 تبخال ، آبله مرغان ، آکنه روز آسه و عفونت‌های دیگر هستید یا اگر از داروهای دیگری نیز

استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - نباید بیش از چهار هفته از آن استفاده شود و در صورت عدم بهبود ، موضوع را با پزشک در میان بگذارید .

عوارض ناخواسته : مصرف بسیار زیاد دارو می‌تواند باعث عوارضی چون : نازک شدن پوست ، از بین رفتن رنگدانه‌های پوستی ، تغییرات خلقی و افزایش فشارخون شود .
تداخل‌های دارویی : ندارد .

مصرف در شیردهی و بارداری : این دارو می‌تواند به داخل شیر ترشح شود و باعث تأثیراتی روی شیرخوار شود . در بارداری نیز بی‌ضرر بودن آن به اثبات نرسیده است و باید با پزشک مشورت کنید .

Clobutinol HCL کلوبوتینول

گروه دارویی : ضدسرفره

اشکال دارویی موجود در ایران : قطره ، آمپول و قرص

مقدار و روش مصرف : یک تا دو قرص یا ۴۰ - ۳۰ قطره از راه خوراکی هر ۸ ساعت یک بار و یا ۲۰ میلی‌گرم آمپول ، به صورت تزریق زیر جلدی ، عضلانی یا وریدی
موارد عمده استعمال دارو : درمان سرفه‌های تحریکی - تسکین سرفه‌های ناشی از عفونتها و التهاب مجاري تنفسی .

عوارض جانبی مهم : خواب آلودگی ، سرگیجه ، تهوع و ناراحتی شکمی .

Clofibrate کلوفیبرات

گروه دارویی : پایین‌آورنده چربی خون

اشکال دارویی موجود در ایران : کپسول

مقدار و روش مصرف : روزانه ۲ گرم ، در ۲ یا ۴ نوبت

موارد عمده استعمال دارو : به عنوان داروی کمکی در پایین آوردن چربی خون (تری گلیسرید و کلسترول)

عوارض جانبی مهم : خواب آلودگی ، سرگیجه ، نفخ ، تهوع ، اسهال ، استفراغ ، ناتوانی جنسی ، کهیر و دانه‌های پوستی .

Clomifene کلومیفن

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضد ناباروری

میزان خطر در مصرف اضافی : کم
اشکال دارویی موجود : قرص
زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز به مدت ۵ روز و در هر دوره ماهیانه فقط یک دوره پنج روزه
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : گرچه با مصرف این دارو ممکن است ماهها اوولاسیون اتفاق نیفتند اما در صورت مثبت بودن نتیجه، اوولاسیون ۴ تا ۱۰ روز بعد از مصرف آخرین دوز اتفاق می‌افتد.
نحوه تگهداری از دارو : دارو در ظرف بسته، دور از نور و دسترس کودکان و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : در صورت عدم بروز عوارض جدی مصرف آن را ادامه دهید چون قطع مصرف دارو می‌تواند احتمال باروری را کاهش دهد - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار خیلی زیاد این دارو پزشک را مطلع سازید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورتی که مشکل بلندمدت کبدی داشته‌اید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - معمولاً بیش از شش دوره مصرف نمی‌شود زیرا استفاده بلندمدت از آن می‌تواند منجر به اختلالات بینایی شود یا احتمال سرطان تخمدان را افزایش دهد.

عوارض تاخوسته: گرگفتگی، تهوع، استفراغ، شروع خونریزی، ناراحتی شکم، سرگیجه، بزرگی تخمدان‌ها و تشکیل کیست، تشنگ، تاری دید، درد در سینه و دانه‌های پوستی.
تداخل‌های دارویی : تداخل دارویی خاصی ندارد.

صرف در شیردهی و بارداری : به محض وقوع بارداری مصرف دارو باید متوقف شود و در شیردهی نیز تجویز نمی‌شود.

Clomipramine

کلو میپرامین

گروه دارویی : ضدافسردگی سه حلقه‌ای
نیاز به تجویز پزشک : دارد
میزان خطر در مصرف اضافی : بالا
اشکال دارویی موجود : قرص، تزریقی، کپسول و مایع
زمان و دفعات مصرف : یک تا چهار بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : برخی آثار دارو ظرف چند روز ممکن است ظاهر شود اما آثار کامل آن زودتر از چهار هفته بعد از شروع مصرف ظاهر نمی‌شود. دارو تا ۲ هفته در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت کاهش هوشیاری و تپش قلب ناشی از مصرف اضافی آن، اقدامات اورژانس را انجام دهید - تا از اثرات آن

بر روی خود آگاه نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون این دارو می‌تواند باعث خواب‌آلودگی و تاری دید شود - اگر مبتلا به مشکلات قلبی، تشنج صرعی، مشکلات مزمن کبدی یا کلیوی، بیماری‌های غده تیروئید، گلوكوم و بیماری‌های پروستات هستید و یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته: خواب‌آلودگی، سرگیجه، خشکی دهان، بیوست و تاری دید.

داخل‌های دارویی: داروهای آرامبخش، آثار آرامبخشی این دارو را تشدید می‌کنند و اثر ضدتشنج‌ها را کاهش می‌دهند - مصرف هم‌زمان آن با MAOIs منجر به واکنش‌های شدید می‌شود و با کینیدین، باعث اختلال در ریتم قلبی می‌شود.

مصرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده و در شیردهی دارو به داخل شیر ترشح می‌شود و روی نوزاد اثراتی به جا می‌گذارد.

Clonazepam کلونازپام

گروه دارویی: ضدتشنج (گروه بنزو دیازپین)

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: ۱-۴ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر دارو آغاز می‌شود و حدود ۳۰ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مصرف اضافی آن می‌تواند باعث خواب‌آلودگی غیرعادی و اغتشاش ذهنی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - به علت ایجاد خواب‌آلودگی باید از مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس دوری کنید - اگر مبتلا به مشکلات مزمن کبدی یا کلیوی و یا بیماری شدید تنفسی هستید و نیز اگر از داروی دیگری هم استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - هم آثار مفید و هم آثار مضر آن، در اثر مصرف بلندمدت و افزایش تحمل بدن، کاهش می‌یابد.

عوارض ناخواسته: خواب‌آلودگی، سرگیجه، فراموشی، خستگی عضلات و گاهی افزایش بzac دهان.

داخل‌های دارویی: همه داروهای اثر آرامبخش، اثر آرامبخشی این دارو را تشدید می‌کنند.

مصرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن دارو در بارداری ثابت نشده، در زنان شیرده دارو وارد شیر می‌شود و روی شیرخوار اثر می‌گذارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Clotrimazole**کلوتریمازول**

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

گروه دارویی: ضدقارچ

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: شیاف واژینال ، کرم ، اسپری و محلول موضعی

زمان و دفعات مصرف: کرم پوستی ، اسپری و محلول موضعی ۲-۳ بار در روز ، شیاف واژینال یک

بار در روز (هنگام خواب) و کرم واژینال یک تا دو بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: دارو ظرف ۲ تا ۳ روز شروع به اثر می‌کند و ۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز دانه‌های پوستی ، دوره درمان را تکمیل کنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از دارو حتماً پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس مشکلی ایجاد نمی‌کند - اگر از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید .

عوارض ناخواسته: فرآورده‌های موضعی می‌توانند باعث احساس گزیدگی یا تحریک در موضع شوند .
تداخل‌های دارویی : ندارد .

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی خطری ایجاد نمی‌کند .

Cloxacillin Sodium monohydrate**کلوگزاسیلین**

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک

اشکال دارویی موجود در ایران: پودر برای تهییه شربت ، قرص ، کپسول و ویال تزریقی

مقدار و روش مصرف: جهت درمان عفونت‌های هفیف تا متوسط : ۵۰۰ - ۲۵۰ میلی‌گرم از راه خوراکی هر ۶ ساعت

موارد عمده استعمال دارو: درمان عفونت‌های ناشی از استافیلوکوک‌های تولید کننده پنی‌سیلیناز و استافیلوکوک‌های مقاوم به پنی‌سیلین

عوارض جانبی مهم: تهوع ، استفراغ ، اسهال ، خارش ، کهیز ، حساسیت به دارو و تب دارویی .

Co - Amoxiclav

کو - آموکسی کلاو

گروه دارویی: آنتی بیوتیک
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش دار، کپسول و سوسپانسیون خوراکی
مقدار و روش مصرف: ۵۰۰ - ۲۵۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۸ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو: عفونت‌های مجاری تنفسی تحتانی (ریه)، اوتیت میانی، سینوزیت، عفونت‌های پوستی و عفونت‌های مجاری ادراری.
عوارض جانبی مهم: تهوع، اسهال، استفراغ، کهیر و واژینیت کاندیدایی.

Coaltar

کل تار

گروه دارویی: کراتولیتیک، ضدشوره سر، ضدپسوریازیس
اشکال دارویی موجود در ایران: لوسيون، شامپو، صابون و بالک (Bulk)
مقدار و روش مصرف: شامپو دو بار در هفته - لوسيون ۴-۲ بار در روز به صورت موضعی
موارد عمدۀ استعمال دارو: جهت تسکین خارش پوست، سوزش و سایر علائم ناشی از التهابات پوستی مزمن مثل: پسوریازیس، اگرما و درماتیت سبوره.
عوارض جانبی مهم: تیره شدن موی روشن، بثورات شبیه آکنه در پوست و حساسیت به نور.

Colchicine

کلشیسین

نیاز به تجویز پزشک: دارد
میزان خطر در مصرف اضافی: بالا
زمان و دفعات مصرف: برای پیشگیری از حمله نقرس ۳-۲ بار در شبانه‌روز و برای بهبود حملة نقرس هر ۲-۳ ساعت یک بار
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: عالیم حمله نقرس ۶-۲۴ ساعت اما آثار کامل دارو در پیشگیری از حمله نقرس، چندین روز وقت لازم دارد. دارو ۲ ساعت در بدن فعال است.
رژیم غذایی مناسب: برخی از غذاها با افزایش تولید اسید اوریک، نقرس را بدتر می‌کنند در این مورد با پزشک مشورت کنید.

نحوه نگهداری از دارو: دارو دور از نور و دسترس کودکان، در ظرف دربسته و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: اگر از آن به طور مکرر در حمله حاد نقرس استفاده می‌کنید، در صورت احساس دل درد یا ایجاد اسهال مصرف آن را متوقف کنید - اگر مصرف اضافه آن باعث تهوع شدید، اسهال خونی، استفراغ، شکم درد شدید و یا کاهش هوشیاری شد، اقدامات پزشکی فوری انجام دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورتی که مبتلا به زخم معده، بیماری‌های خونی، مشکلات قلبی، التهاب مزمن روده و مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی هستید و نیز اگر از داروهای دیگری استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید. مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث ریزش مو، دانه‌های پوستی، احساس سوزش در دست‌ها و پاها و ضعف عضلات یا درد آن‌ها شود.

عوارض ناخواسته: بی‌حسی و احساس گزش، خونریزی غیرعادی یا کبودی، دانه‌های پوستی، شکم درد، اسهال، تهوع و استفراغ.

تداخل‌های دارویی: در صورت مصرف همزمان با سیکلوسپورین می‌تواند آثار نامطلوبی روی کلیه‌ها بگذارد. **معرف در شیردهی و بارداری:** در بارداری تجویز نمی‌شود زیرا ممکن است باعث نقاچی در جنین شود. در شیردهی به دلیل ترشح دارو به داخل شیر و ایجاد تأثیراتی بر روی شیرخوار با پزشک مشورت کنید.

Codeine کدئین

گروه دارویی: ضدسرfe، ضداسهال، ضددرد اوپیوئیدی

نیاز به تجویز پزشک: دارد
میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

اشکال دارویی موجود: تزریقی، مایع و قرص

زمان و دفعات مصرف: برای درد: ۰_۳ ساعت یک بار - برای سرفه: ۳_۴ ساعت یک بار - برای کنترل اسهال: هر ۴_۶ ساعت یک بار

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: بعد از ۰_۳۰ دقیقه اثر دارو شروع می‌شود و دارو ۰_۴ ساعت بعد از مصرف در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو: دارو در ظرف دربسته، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مصرف بیش از حد آن می‌تواند باعث کند شدن سرعت تنفس، بی‌نظمی تنفس و کاهش هوشیاری یا خواب آلودگی

شدید شود که باید به پزشک اطلاع داده شود - قبل از آگاهی از اثر این دارو بر روی خودتان ، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون ممکن است باعث خوابآلودگی و سرگیجه شود - اگر مبتلا به برونشیت ، آسم و یا مشکلات بلندمدت کبدی و کلیوی هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - در بلندمدت می تواند باعث اعتیاد شود .

عوارض ناخواسته : استفراغ ، تهوع ، سرگیجه و خوابآلودگی که در دوز پایین دارو ، چندان مشکل زا نیستند .

تداخل‌های دارویی : همه داروهای آرامبخش مانند : ضدافسردگی‌ها ، ضدجنون‌ها ، آنتی هیستامین‌ها ، خوابآورها و الكل اثر آرامبخشی کدئین را افزایش می دهند .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری مشکلی ایجاد نمی کند . در شیردهی نیز مصرف مقادیر معمولی آن ایرادی ندارد . این دارو ممکن است هنگام زایمان روی تنفس بچه اثر بگذارد .

Colestyramine

کلستیرامین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : پایین آورنده چربی خون

اشکال دارویی موجود : پودر

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

زمان و دفعات مصرف : ۱-۴ بار در شبانه روز (قبل از خواب و غذا)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثرات مفید دارو بعد از چند هفته آشکار می شود و ۱۲-۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب : رژیم کم چربی و کم کالری توصیه می شود . از آن جا که دارو باعث افت جذب ویتامین‌ها می شود کمبود آن‌ها باید جبران شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علامت غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از دارو ، به پزشک اطلاع دهید - در هنگام رانندگی و انجام کارهای حساس می توانید آن را مصرف کنید - اگر دچار زخم معده یا بواسیر هستید و یا اگر از داروی دیگری نیز استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می تواند باعث کاهش جذب ویتامین‌های محلول در چربی از قبیل K ، D و A شده و منجر به کمبود آن‌ها شود .

عوارض ناخواسته : سوء‌هاضمه ، استفراغ ، یوست ، ناراحتی شکم و اسهال .

تداخل‌های دارویی : دارو ، توانایی بدن را برای جذب داروهای دیگر کاهش می دهد لذا مصرف داروهای دیگر باید ۳۰-۶۰ دقیقه قبل یا ۴ ساعت بعد از مصرف کلستیرامین صورت گیرد .

صرف در شیردهی و بارداری: بی ضرر بودن دارو در بارداری و شیردهی ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Contraceptive HD and LD

کنتراسپتیو اچ - دی و ال دی

گروه دارویی: ضدبارداری (غنی از پروژسترون)

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص

مقدار و روش صرف: روزی یک قرص به مدت ۲۱ روز، از اولین روز شروع قاعده‌گی تا اتمام قرص‌ها
موارد عمده استعمال دارو: جلوگیری از بارداری
عوارض جانبی مهم: افزایش فشارخون ، خونریزی مغزی ، آمبولی ریه ، اختلالات صفوایی ، ترومبوز
 قلبی ، ترومبوز مغزی ، کلواسمای ملاسما (لکه‌های رنگی در پوست) ، افزایش وزن ، تغییر در
 ترشحات رحم ، نفخ ، لکه‌بینی و خونریزی بی موقع از رحم .

Contraceptive Triphasic

کنتراسپتیو تریفازیک

گروه دارویی: ضد بارداری (حاوی استروژن و پروژسترون)

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص

مقدار و روش صرف: روزانه یک قرص به صورت خوراکی . صرف اولین قرص در روز اول قاعده‌گی
 یا روز هشتم پس از صرف آخرین قرص دورهٔ قبلی شروع شده تا ۲۱ روز ادامه می‌یابد ابتدا قرص‌های
 قهوه‌ای رنگ ، سپس قرص‌های سفید رنگ و در مرحلهٔ آخر قرص‌های زرد رنگ صرف می‌شوند .
موارد عمده استعمال دارو: جلوگیری از بارداری .

Conjugated estrogens

استروژن کانژوگه

گروه دارویی: هورمون جنسی زنانه و دارویی جهت درمان بیماری‌های استخوانی

میزان خطر در صرف اضافی: کم
نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: کرم و قرص

زمان و دفعات صرف: قرص ۱-۳ بار در روز و کرم یک بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثرات دارو ظرف ۵-۲۰ روز شروع می‌شود و ۱-۲ روز در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : به علت احتمال عود علایم ، مصرف آن را بدون دستور پزشک متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقادیر اضافی دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به فشارخون بالا ، نارسایی قلبی ، سابقه ایجاد لخته خون یا حمله مغزی ، بیماری پستان ، فیبروئید در رحم ، تشنج ، میگرن و یا مشکلات بلندمدت کبدی و کلیوی و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می تواند باعث افزایش خطر سلطان رحم ، احتمال ایجاد لخته خون در افراد مستعد و خطر بیماری های کیسه صفراء شود .

عوارض ناخواسته : تهوع ، استفراغ ، افزایش یا کاهش وزن و حساسیت یا تورم پستان .

تداخل های دارویی : تنباکو عوارض قلبی و عروقی دارو را افزایش می دهد - این دارو ، اثر ضدانعقادهای خوراکی را کاهش می دهد .

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی تجویز نمی شود .

Co - trimoxazole

کوتريموكسازول

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدبacterی

اشکال دارویی موجود : قرص ، تزریقی و مایع

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : روزی دو بار همراه غذا

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۱-۴ ساعت اثر دارو شروع می شود و تا ۱۲ ساعت در بدن فعال است .

رزیم غذایی مناسب : مایعات فراوان مصرف شود . (به ویژه در هوای گرم)

نحوه تگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض جانبی شدید ، دوره درمان را کامل کنید - مقدار زیاد این دارو می تواند باعث تهوع ، استفراغ ، سرگیجه و اغتشاش ذهنی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر دچار کمبود آنزیم G6PD هستید یا به سولفانامیدها حساسیت دارید و نیز اگر دچار بیماری پورفیری ، بیماری های خونی و مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی هستید و یا از داروهای دیگری نیز استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می تواند منجر به کمبود اسیدفولیک شود .

عوارض ناخواسته: تهوع ، اسهال و استفراغ .

تداخل‌های دارویی: این دارو اثر خدائعقادی وارفارین را افزایش می‌دهد - دوام فنی‌توئین را بیشتر می‌کند - اثر ضددیابت‌های خوراکی را تشدید می‌کند - مصرف همزمان فنی‌توئین و کوتريموكسازول باعث اختلال در کارکرد کلیه‌ها می‌شود .

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود . در شیردهی گرچه به داخل شیر ترشح می‌شود اما مقادیر معمولی آن مشکلی برای شیرخوار ایجاد نمی‌کند . در این مورد با پزشک مشورت کنید .

Cromolyn Sodium

کرومولین سدیم

گروه دارویی: پیشگیری کننده از آسم

اشکال دارویی موجود در ایران: اسپری بینی و کپسول استنشاقی

مقدار و روش مصرف: ۲۰ میلی‌گرم ، هر ۶ ساعت یک بار

موارد عمدۀ استعمال دارو: به عنوان داروی همراه در درمان آسم حساسیتی به کار می‌رود - در پیشگیری و درمان رینیت آرژیک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد .

عوارض جانبی مهم: سرفه ، اسپاسم برونش‌ها (مجاری هوایی ریه) ، ورم حنجره ، گرفتگی بینی ، خس خس سینه .

Cyproheptadine HCL

سیپروهیپتادین

گروه دارویی: آنتی هیستامین ، ضدغارش

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص دارای شیار

مقدار و روش مصرف: ۴ میلی‌گرم از راه خوراکی ، هر ۸ ساعت یک بار - مقدار آن را تا حداقل ۵/۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در یک شبانه‌روز ، می‌توان افزایش داد .

موارد عمدۀ استعمال دارو: تسکین علامتی حالت‌های مختلف ناشی از آرژی مانند : التهاب ملتحمه چشم ، کهیز ناشی از سرما ، تب یونجه و رینیت واژوموتور و تسکین سردردهای عروقی .

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی ، سرگیجه ، خستگی و اختلال هماهنگی ، خشکی بینی و گلو ، خشکی دهان ، تحریک اشتها ، افزایش وزن و اختلال در دفع ادرار .

Cyclizine HCL**سیکلیزین**

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص

گروه دارویی : آنتی‌هیستامین

مقدار و روش مصرف : ۵۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت یک بار

موارد عمده استعمال دارو : برای درمان تهوع و استفراغ ناشی از مسافرت مصرف می‌شود.

عوارض جانبی مهم : خشکی دهان و حلق و بینی، خواب آلودگی، بی‌اشتهاایی، تاری دید، احتباس ادرار، تپش قلب و تکرار ادرار.

Cyproterone Acetate**سیپروترون استات**

گروه دارویی : ضداندروژن (ضد هورمون جنسی مردانه)

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص دارای شیار

مقدار و روش مصرف : روزانه ۵۰ میلی‌گرم از راه خوراکی، هر ۱۲ ساعت یک بار

موارد عمده استعمال دارو : درمان آکنه و پرمومی، جهت کاستن از میل جنسی در جنس مذکور.

عوارض جانبی مهم : ناباروری، کاهش تعداد اسپرم‌ها و حجم مایع منی، بی‌اسپرمی، ایجاد اسپرم‌های غیرطبیعی، ژنیکوماستی (بزرگ شدن پستان) و کاهش رشد موهای بدن.

Cyproterone Compound**سیپروترون کامپاند**

گروه دارویی : ضدبارداری، ضداندروژن

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص (حاوی سیپروترون و اتینیل استرادیول)

مقدار و روش مصرف : روزانه یک قرص از راه خوراکی از روز پنجم قاعدگی به مدت ۲۱ روز

موارد عمده استعمال دارو : درمان پرمومی خفیف تا متوسط در زنان - جلوگیری از بارداری در زنانی که دچار ناراحتی‌های پوستی ناشی از اندروژن‌ها (هورمون‌های جنسی مردانه) هستند - درمان آکنه در زنانی که مدت زیادی داروهای ضدباکتری مصرف کرده‌اند.

عوارض جانبی مهم : ناباروری، کاهش تعداد اسپرم‌ها، کاهش حجم مایع منی، بی‌اسپرمی، ایجاد اسپرم‌های غیرطبیعی، ژنیکوماستی (بزرگ شدن پستان) و کاهش رشد موهای بدن.

Danazol دانازول

گروه دارویی: داروی مورد استفاده در بیماری‌های قاعده‌گی
نیاز به تجویز پزشک: دارد
میزان خطر در مصرف اضافی: کم
زمان و دفعات مصرف: ۴-۲ بار در روز
اشکال دارویی موجود: کپسول
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: برخی آثار این دارو ظرف چند روز و برخی چند ماه بعد بروز می‌کنند. دارو ۱-۲ روز در بدن فعال است.
موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن، پزشک را مطلع کنید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورتی که مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی و کلیوی، بیماری‌های قلبی، تشنج صرعی، میگرن و دیابت ملیتوس هستید یا داروی دیگری نیز مصرف می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث ضایعات کبدی شود.
عوارض ناخواسته: ورم پاشنه پا، کرامپ عضلانی، آکنه، تهوع، افزایش وزن، تغییرات صدا، رشد غیرعادی موها، کاهش اندازه پستان و سردرد.
تداخل‌های دارویی: این دارو باعث کاهش اثر ضددیابت‌های خوراکی شده و اثر ضدتشنج‌ها را تغییر می‌دهد - دانازول، آثار ضدانعقادهای خوراکی و مهارکننده‌های دستگاه ایمنی مثل: تاکرولیموس و سیکلوسپورین را افزایش می‌دهد.
صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود. در شیردهی باید با پزشک مشورت شود.

Deferoxamine Mesylate دفروکسامین مسیلات

گروه دارویی: داروی شلات کننده، پادزهر آهن
اشکال دارویی موجود در ایران: ویال تزریقی
مقدار و روش مصرف: ۱ گرم از راه وریدی یا عضلانی و بعد از آن ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۴ ساعت یک بار به مدت ۲ روز
موارد عمده استعمال دارو: در درمان مسمومیت حاد با آهن به کار می‌رود.
عوارض جانبی مهم: کاهش فشارخون، تندر شدن ضربان قلب، کاهش شنوایی، تاری دید، شبکوری، خارش عمومی بدن و درد و سفتی در محل تزریق.

Desmopressin

دسموپرسین

گروه دارویی: دارو مورد استفاده در درمان دیابت بی‌مزه

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: قرص ، تزریقی ، محلول داخل بینی و اسپری بینی

زمان و دفعات مصرف: هفده : ۳ بار در شبانه‌روز - اسپری بینی و محلول داخل بینی : ۱-۲ بار در شبانه‌روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر قرص ظرف ۹۰-۳۰ دقیقه ، اثر آمپول و محلول بینی ظرف چند دقیقه و اثر کامل آن در چند ساعت ظاهر می‌شود . قرص ۸ ساعت ، آمپول و محلول داخل بینی ۱۲-۸ ساعت و اسپری بینی ۱۰-۱۲ ساعت در بدن فعال است .

رزیم غذایی مناسب: ممکن است پزشک به شما توصیه کند که جذب روزانه مایعات خود را کنترل کنید .

نحوه تهداری از دارو: دارو باید در مقابل نور محافظت شود . قرص را در جای خشک و خنک نگهداری کنید و اسپری و محلول بینی را در یخچال نگهداری کنید اما مواضع باشید منجمد نشوند .

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورت بروز اسهال یا استفراغ ، بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید . مقدار زیاد آن می‌تواند مانع دفع آب بدن توسط کلیه‌ها شود که باید با پزشک تماس بگیرید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به مشکلات قلبی ، فشارخون بالا ، مشکلات کلیوی ، بیماری فیروزکیستیک ، آسم ، رینیت آلرژیک یا صرع هستید و اگر از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن در دیابت بی‌مزه اشکالی ندارد اما در درمان شب ادراری ، بعد از سه ماه درمان ، حداقل یک هفته برای ارزیابی ضرورت ادامه درمان مصرف آن را متوقف کنید .

عوارض ناخواسته: این دارو می‌تواند باعث احتباس آب در بدن و کاهش غلظت سدیم خون شده و منجر به تشنج شود . سردرد ، تهوع ، استفراغ ، خونریزی و اسهال از عوارض دیگر این دارو هستند .

داخل‌های دارویی: ضدافسردگی‌ها مانند آمی‌تریپتیلین و نیز داروهای کاربامازپین ، کلرپروپامید و داروی ضدالتهابی ایندوموتاسین تأثیرات این دارو را افزایش می‌دهند .

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری باید با احتیاط مصرف شود و در شیردهی نیز مصرف مقادیر معمولی آن اشکالی ندارد .

Dexamethasone**دگزامتاژون**

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: کورتیکواستروئید

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: قرص، آمپول، قطره چشمی و قطره گوشی

زمان و دفعات مصرف: قرص خوراکی ۲-۳ بار در روز همراه با غذا و قطره چشمی: هر ۱۵ ساعت یک بار زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: آثار آن ظرف ۱-۴ ساعت شروع می‌شود و چند روز در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو: دارو را در جای خشک و خنک، در ظرف دربسته، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط: مصرف دارو فقط با نظر پزشک و معمولاً به صورت تدریجی باید قطع شود - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورتی که مبتلا به زخم معده، آب سیاه، سل، بیماری‌های روانی، افسردگی و یا تبخال هستید و اگر از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث آب مروارید، آب سیاه، دیابت، اختلال روانی، تحلیل رفتن ماهیچه‌ها، شکنندگی استخوان‌ها، نازکی پوست و اختلال در رشد کودکان شود.

عوارض ناخواسته: افزایش وزن و سوءهاضمه از عوارض شایع هستند. آکنه، نازکی پوست، افزایش فشارخون، ضعف عضلانی و تغییرات خلقی ممکن است در صورت مصرف بلندمدت، ایجاد شوند.

تداخل‌های دارویی: این دارو با برخی واکسن‌ها تداخل دارد - ضداسیدها اثر این دارو را کم می‌کنند - این دارو اثر ضدانعقادهای خوراکی را افزایش می‌دهد - NSAID‌ها احتمال سوءهاضمه به وسیله این دارو را افزایش می‌دهند - باربیتورات‌ها، فنی‌توئین، ریفارمپین و کاربامازپین اثر دگزامتاژون را کاهش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است و مصرف مقادیر معمولی آن در شیردهی ایرادی ندارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Dexchlorpheniramine Maleate**دکس کلرفنیرامین**

گروه دارویی: آنتی‌هیستامین، ضدخارش

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص، قرص‌های کندآزادشونده (SR - tab) و شربت

مقدار و روش مصرف: ۲ میلی‌گرم از راه خوراکی هر ۶-۴ ساعت یا ۶-۴ میلی‌گرم از (SR - tab) هر ۱۲-۸ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو: رینیت آرژیک فصلی و دائمی ، تظاهرات دیگر آرژی مثل کهیر خفیف و ورم ملتهمه ، تخفیف علائم سرماخوردگی و سینوزیت .
عوارض جانبی مهم: خواب‌آlodگی ، سرگیجه ، سرخوشی ، وزوز گوش ، تاری دید ، اشکال در دفع ادرار و قاعده‌گی زودرس .

Dextromethorphan HBr**دکسترومتورفان**

گروه دارویی: ضدسرفه
اشکال دارویی موجود در ایران: شربت ، قرص و قطره
مقدار و روش مصرف: ۱۰ میلی‌گرم هر ۴ ساعت یا ۳۰ میلی‌گرم هر ۶-۸ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو: تسکین موقت سرفه در سرفه‌های بدون خلط ناشی از سرماخوردگی ، سیاه سرفه و آنفلوانزا .
عوارض جانبی مهم: خواب‌آlodگی ، گیجی ، منگی ، ناراحتی گوارشی و مقدار زیاد آن می‌تواند باعث کاهش تنفس شود .

Dextromethorphan - P**دکسترومتورفان - پی**

گروه دارویی: ضدسرفه و ضداحقان
اشکال دارویی موجود در ایران: شربت (حاوی سودوافدرین و دکسترومتورفان)
مقدار و روش مصرف: ۱۰ میلی‌لیتر هر ۶ ساعت از راه خوراکی
موارد عمدۀ استعمال دارو: تسکین سرفه‌های بدون خلط و احقان ناشی از گلودرد ساده و سرماخوردگی .
عوارض جانبی مهم: خواب‌آlodگی ، گیجی و منگی .

Dextrose (D - Glucose)**دکستروز**

گروه دارویی: جانشین مایعات ، تأمین کننده کالری
اشکال دارویی موجود در ایران: محلول‌های قابل تزریق وریدی (به صورت سرم ۵ درصد و ۱۰ درصد ، سرم قندی نمکی و محلول ۲۰ درصد و ۵۰ درصد)

مقدار و روش مصرف : ۰/۵ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر ساعت موارد عمدۀ استعمال دارو : محلول ۵ درصد و ۱۰ درصد به عنوان جانشین مایع و تأمین کالری - محلول ۲۰ درصد جهت تأمین کالری در حداقل حجم آب - محلول ۵۰ درصد برای جبران هیپوگلیسمی (کاهش قندخون) ناشی از تزریق انسولین .

عوارض جانبی مهم : افزایش فشار اسمزی خون ، تشدید فشارخون و نارسایی قلب ، ادم ریه ، اغتشاش ذهنی و قند در ادرار .

Diazepam دیازپام

گروه دارویی : ضدتشنج ، ضداضطراب ، شلکننده عضلانی

نیاز به تجویز پزشک : دارد

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : قرص ، آمپول ، شیاف ، مایع و محلول مقداری

زمان و دفعات مصرف : ۱-۴ بار در شبانه روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آمپول و محلول رکتال (مقداری) ظرف ۱ تا ۵ دقیقه و سایر فرآوردهای آن ظرف ۲ ساعت اثرشان ظاهر می شود . دارو ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : در صورتی که بیش از دو هفته از این دارو استفاده کرده اید ، بدون مشورت با پزشک ، مصرف آن را متوقف نکنید - مقدار زیاد دارو می تواند خوابآلودگی غیرعادی ایجاد کند که باید به پزشک اطلاع دهید - تا از اثر آن بر روی خود آگاه نیستید ، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می تواند باعث کاهش هوشیاری و کندی واکنش های رفتاری و حرکتی شود - اگر مبتلا به بیماری شدید تنفسی ، مشکلاتی در رابطه با الکل و اعتیاد یا مشکلات مزمن کبدی و کلیوی هستید و اگر از داروی دیگری نیز استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می تواند باعث اعتیاد به این دارو شود .

عوارض ناخواسته : خوابآلودگی در طول روز ، سرگیجه و عدم تعادل ، سردد ، تاری دید ، فراموشی و اغتشاش ذهنی .

تداخل های دارویی : آرامبخش ها اثر آرامبخشی دیازپام را تشدید می کنند - این دارو با تأثیر روی فرآیند شکسته شدن سایمیدین در کبد ، باعث افزایش عوارض جانبی این دارو می شود .

مصرف در شیردهی و بارداری : دارو می تواند به داخل شیر ترشح شود و در بارداری نیز بی ضرر بودن آن به اثبات نرسیده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Diclofenac

دیکلوفنac

گروه دارویی: ضدالتهاب غیراستروئیدی NSAIDs، ضددرد، ضدنقرس
نیاز به تجویز پزشک: دارد
میزان خطر در مصرف اضافی: کم
اشکال دارویی موجود: قرص، کپسول، آمپول، شیاف و ژل
زمان و دفعات مصرف: ۱-۳ بار در روز همراه غذا
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر ضددرد آن طرف یک ساعت و اثر ضدالتهاب
 کامل آن طرف دو هفته شروع می‌شود. دارو ۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: اگر برای تسکین درد و به مدت کوتاهی از آن استفاده کردہ‌اید، به راحتی
 می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید اما اگر برای درمان آرتربیت، به مدت طولانی از آن استفاده کردہ‌اید،
 بدون نظر پزشک مصرف آن را قطع نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از
 این دارو، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا
 به بیماری خونریزی دهنده، مشکلات بلندمدت کلیوی یا کبدی، ازوفاژیت، زخم معده، سوءهاضمه و
 پورفیری هستید یا به آسپرین حساسیت دارید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان
 قرار دهید - مصرف طولانی مدت آن احتمال زخم معده یا روده را افزایش می‌دهد.

عوارض ناخواسته: سردرد، سرگیجه، ورم پا، درد شکم، خونریزی از معده و روده و عوارض گوارشی
 مثل: تهوع و سوءهاضمه.

تداخل‌های دارویی: دارو با NSAID‌ها، ضدانعقادهای خوراکی و کورتون‌ها تداخل دارد و می‌تواند
 آثار مفید دیورتیک‌ها و داروهای ضدفسارخون را کاهش دهد. در صورت مصرف هم‌زمان با
 سیکلوسپورین، ممکن است احتمال آسیب‌های کلیوی افزایش یابد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری به علت به تأخیر انداختن زایمان یا تأثیر بر روی قلب
 جنین تجویز نمی‌شود. اگرچه این دارو به داخل شیر ترشح می‌شود اما مقادیر معمولی آن مشکلی
 برای شیرخوار ایجاد نمی‌کند.

Dicyclomine

دی‌سیکلومین

گروه دارویی: داروی مورد استفاده در سندروم روده تحریک‌پذیر
نیاز به تجویز پزشک: دوز 10 mg یا کمتر نیاز به تجویز پزشک ندارد اما بالای 10 mg نیاز به تجویز
 پزشک دارد.

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط اشکال دارویی موجود : قرص و مایع

زمان و دفعات مصرف : ۳ بار در روز قبل یا بعد از غذا

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر آن ظرف ۱-۲ ساعت شروع می‌شود و ۶-۴ ساعت در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو : دارو را در جای خشک و خنک، دور از نور و دسترس کودکان و در ظرف درسته نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط : مصرف آن را بدون اجازه پزشک قطع نکنید - مقدار زیاد آن می‌تواند باعث اختلال در بلع، سرگیجه و خواب آلودگی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - تا از اثر این دارو بر روی خود آگاه نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید - اگر مبتلا به آبسیاه، بیماری‌های ادراری و فتق هیاتوس هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : خواب آلودگی، خشکی دهان، بیوست، تاری دید، تپش قلب، سردرد شدید و اشکال در دفع ادرار.

تداخل‌های دارویی : داروهای آرامبخش، اثر آرامبخشی این دارو را تشدید می‌کنند. داروهای آنتی کولینرژیک عوارض این دارو را تشدید می‌کنند.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری خطری ندارد و در شیردهی نیز مقادیر معمولی آن مشکلی ایجاد نمی‌کند.

Digestive

دایجستیو

گروه دارویی : آنزیم گوارشی

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص پوشش دار روده‌ای

مقدار و روش مصرف : ۲ - ۱ قرص، همراه هر وعده غذا

موارد عمده استعمال دارو : کمک در هضم مقادیر بیش از حد غذاهای چرب و در اختلال گوارشی ناشی از کمبود آنزیم‌های پانکراس که به صورت نفخ و دلپیچه بروز می‌کند

عوارض جانبی مهم : اسهال، تهوع (جهت اطلاعات بیشتر به داروی پانکراتین مراجعه شود)

Dimenhydrinate

دیمن هیدرینات

گروه دارویی : آنتی‌هیستامین، ضداستفراغ، ضدسرگیجه

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص شیاردار

مقدار و روش مصرف : ۱۰۰ - ۵۰ میلی گرم از راه خوراکی ، هر ۶ - ۴ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو : جهت پیشگیری و درمان تهوع ، استفراغ و سرگیجه ناشی از مسافت
عوارض جانبی مهم : خواب آلودگی ، تاری دید ، کاهش فشارخون ، تپش قلب ، خشکی دهان و بینی
 و گلو ، بی اشتہایی و سوزش ادرار .

Dimethicone

دایمتیکن

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص و قطره

گروه دارویی : ضدنفخ

مقدار و روش مصرف : قرص ۸۰ - ۴۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۶ ساعت یک بار ، قطره ۴۰ میلی گرم هر ۶ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو : بلع هوا ، نفخ بعد از جراحی ، زخم معده ، سوء هاضمه ، اسپاسم و
 تحریک کولون (روده بزرگ) .

Diphenhydramine Compound

دیفن هیدرامین کامپاند

اشکال دارویی موجود در ایران : شربت

گروه دارویی : ضدسرفه

مقدار و روش مصرف : ۱۰ - ۵ میلی لیتر ، هر ۱۲ - ۸ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو : تسکین سرفه های ناشی از سرماخوردگی و سرفه های ناشی از آرژی .

Diphenhydramine HCL

دیفن هیدرامین

گروه دارویی : ضداستفراغ ، ضدسرفه ، آرامبخش ، خواب آور ، آنتی هیستامین ، آنتی کولینرژیک ،
 ضدپارکینسونیزم

اشکال دارویی موجود در ایران : الگزیر ، قرص دارای شیار و آمپول
مقدار و روش مصرف : جهت نشانه های آرژی ، آرامش هنگام خواب ، بیماری مرگت و پارکینسونیزم :
 ۲۵ - ۲۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۶ ساعت یک بار . در تسکین سرفه بدون فلک : ۲۵ میلی گرم
 از راه خوراکی هر ۶ - ۴ ساعت یک بار

موارد عمده استعمال دارو: درمان آلرژی‌های فصلی و بهاره، ورم ملتحمه ناشی از حساسیت کنترل واکنش‌های آنافیلاکتیک به همراه اپی‌نفرین، تسکین سرفه‌های ناشی از سرماخوردگی و پیشگیری و درمان استفراغ ناشی از مسافت.

عوارض جانبی مهم: خوابآلودگی، سرگیجه، سنگینی و ضعف دست‌ها، لرز، اغتشاش ذهنی، تپش قلب، خشکی بینی و تاری دید.

Diphenoxylate

دیفنوکسیلات

گروه دارویی: ضداسهال اوپیوئیدی

نیاز به تجویز پزشک: دارد

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

اشکال دارویی موجود: قرص

زمان و دفعات مصرف: ۳-۴ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: دارو ظرف یک ساعت اثر می‌کند و ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب: رژیم غذایی حاوی مایعات کافی باشد.

نحوه تگهداری از دارو: دارو در ظرف دربسته، جای خشک و خنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث خشکی پوست و دهان، خوابآلودگی و ناآرامی شود و حتی مقادیر خیلی بیشتر آن ممکن است منجر به کاهش هوشیاری شود که اقدامات اورژانس لازم است - قبل از آگاهی از اثر آن روی خودتان از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خوابآلودگی و سرگیجه شود - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی، دلدرد شدید، اسهال خونی و کولیت هستید و اگر اخیراً از آنتی‌بیوتیک استفاده کرده‌اید یا از داروهای دیگری استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته: خوابآلودگی، ناآرامی، سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ و اتساع شکم.

تداخل‌های دارویی: مصرف هم‌زمان آن با ضدافسردگی‌های گروه MAOIs، باعث افزایش فشارخون می‌شود. همه داروهای آرامبخش، اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری بی‌ضرر بودن آن ثابت نشده است. در شیردهی وارد شیر شده باعث خوابآلودگی کودک می‌شود، پس با پزشک مشورت شود.

Dipyridamole

دی‌پیریدامول

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدپلاکت

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

اشکال دارویی موجود: قرص ، کپسول ، مایع و تزریقی (جهت تست‌های تشخیصی)

زمان و دفعات مصرف: قرص و کپسول ۳-۴ بار در روز و یک ساعت قبل از غذا

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر دارو شروع می‌شود و تا ۸ ساعت در بدن فعال است.

تحوّه نگهداری از دارو: دارو در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز عوارض شدید ، مصرف آن را بدون دستور پزشک نطع نکنید - مصرف اضافی آن می‌تواند باعث سرگیجه و استفراغ شود که باید به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر دچار فشارخون پایین ، میگرن یا آنژین صدری هستید و اگر اخیراً دچار حمله مغزی شده‌اید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک ا در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکال ندارد .

عوارض ناخواسته: سرگیجه ، غش ، تهوع ، استفراغ و دانه‌های پوستی (راش) .

نداخل‌های دارویی: ضداسیدها ، اثر این دارو را کاهش می‌دهند . این دارو اثر ضدانعقادها را افزایش آده و منجر به خونریزی‌های کنترل نشده می‌شود .

مصرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده و باید با پزشک مشورت شود . در شیردهی ، دارو به داخل شیر ترشح می‌شود اما مصرف مقداری معمولی آن مشکلی در شیردهی ایجاد نمی‌کند .

Domperidon

دامپریدون

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

بروگ دارویی: ضداستفراغ

اشکال دارویی موجود: قرص ، مایع و شیاف

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: برای تهوع و استفراغ هر ۴-۸ ساعت یک بار - برای سوءهاضمه ۳ بار در روز

بل از غذا و همراه با آب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو ظرف یک ساعت شروع می‌شود و تا ۶ ساعت در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو : دارو را در ظرف دربسته، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقدار زیاد آن می‌تواند باعث سرگیجه شود که باید به پزشک اطلاع داده شود - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی دارید یا دچار بیماری تیروئید هستید و نیز اگر از داروی دیگری هم استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو برای مصرف بلندمدت تجویز نمی‌شود.

عوارض ناخواسته : عوارض این دارو که چندان هم شایع نیستند عبارتند از: احساس گرفتگی عضله‌ها، لرز، دانه‌های پوستی، کاهش قدرت جنسی و بزرگی پستان‌ها.

تداخل‌های دارویی : آنتی کولینزیک‌ها و ضددردهای اوپیوئیدی، آثار مثبت دامپریدون را کاهش می‌دهند - این دارو، آثار برومکربیتین و کابرگولین را در برخی افراد کاهش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری : در شیردهی مصرف دارو با مقدار معمولی، اشکالی ایجاد نمی‌کند اما بی‌ضرر بودن آن در بارداری به اثبات نرسیده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Donepezil

دانپزیل

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: خددمانس (زوال عقل)

اشکال دارویی موجود: قرص

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: یک بار در شبانه‌روز هنگام خواب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو ظرف یک ساعت شروع می‌شود اما اثر کامل آن سه ماه بعد ظاهر می‌گردد. دارو ۱-۲ روز در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیاد این دارو، به پزشک اطلاع دهید - اصولاً بیمار مبتلا به آלצהیمر که از این دارو استفاده می‌کند توانایی پرداختن به کارهای حساس و رانندگی را ندارد - در صورت ابتلا به مشکل تنفسی مثل آسم، مشکلات قلبی و زخم معده یا استفاده از داروهای گروه NSAID‌ها یا دیگر داروها پزشک را در جریان قرار دهید - تا هر زمان این دارو برایتان مفید است می‌توانید آن را مصرف کنید.

عوارض ناخواسته: برافروختگی ، خستگی ، بی خوابی ، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، کرامپ عضلانی و سردرد .
تداخل‌های دارویی: این دارو اثر برخی شلکننده‌های عضلانی را مهار کرده و اثر بعضی از آن‌ها را تشدید می‌کند - بعضی داروهای گروه ضدمالاریا و ضدآریتمی قلب اثر دانپزیل را مهار می‌کند - آمینوگلیکوزیدها ، کلیندامایسین و کلیستین آثار این دارو را مهار می‌کند .
صرف در شیردهی و بارداری: برای زنان باردار و شیرده تجویز نمی‌شود .

Dosulepin**داسولپین**

گروه دارویی: ضدافسردگی سه حلقه‌ای
میزان خطر در مصرف اضافی: بالا
زمان و دفعات مصرف: ۲-۳ بار در شب روز یا یک بار هنگام شب
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: آثار ضدافسردگی دارو زودتر از ۴-۲ هفته ظاهر نمی‌شود و دارو چند روز در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز عوارض جانبی شدید ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت ایجاد تپش قلب یا کاهش هوشیاری در اثر مصرف مقادیر بالای این دارو اقدامات اورژانس انجام دهید - تا از تأثیر این دارو بر روی خودتان آگاه نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث کاهش هوشیاری ، سرگیجه ، تاری دید و خوابآلودگی شدید شود - در صورت ابتلا به تشنج صرعی ، مشکلات پروستات ، آب سیاه ، مشکلات قلبی یا بیماری‌های مزمن کبدی یا کلیوی و نیز در صورت مصرف داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید .

عوارض ناخواسته: خوابآلودگی ، خشکی دهان ، تعزیق و تاری دید که بیشتر در روزهای اول ظاهر می‌شود .
تداخل‌های دارویی: استعمال دخانیات ، اثر ضدافسردگی دارو را کاهش می‌دهد - این دارو اثر ضدتشنج‌ها را کم می‌کند - همه داروهایی که اثر آرامبخش دارند اثر آرامبخشی این دارو را تشدید می‌کنند .
صرف در شیردهی و بارداری: بی ضرر بودن دارو در بارداری ، به اثبات نرسیده است . در شیردهی به داخل شیر ترشح می‌شود . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Doxazosin**دگزاروسین**

گروه دارویی: گشادکننده عروق ، ضدفسارخون
میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط
نیاز به تجویز پزشک: دارد
اشکال دارویی موجود: قرص

زمان و دفعات مصرف : یک بار در شبانه‌روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۲ ساعت اثر می‌کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید چون می‌تواند باعث بالا رفتن فشارخون شود - مقادیر زیاد این دارو می‌تواند باعث غش و سرگیجه شود که باید به پزشک اطلاع داده شود - تا از اثرات این دارو بر روی خود آگاه نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید، چون می‌تواند باعث ایجاد خواب‌آلودگی و سرگیجه شود - در صورت ابتلاء به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید.
عوارض ناخواسته : تهوع، گرفتگی بینی، سردرد، خواب‌آلودگی، ضعف، سرگیجه و غش و ضعف.

تداخل‌های دارویی : داروهای ضدفسارخون، اثر ضدفسارخون دارو را تشديد می‌کنند.
صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است و نیز می‌تواند به داخل شیر ترشح شود. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Dydrogesterone

دیدروژستررون

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : هورمون جنسی زنانه

اشکال دارویی موجود : قرص

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

زمان و دفعات مصرف : ۱-۳ بار در روز و در خیلی از موارد در ایام خاصی از دوره ماهیانه
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آثار مفید دارو چند ماه بعد از آغاز مصرف آن ظاهر می‌شود. دارو تا ۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک، مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، پزشک را باخبر کنید - تا از تأثیر این دارو روی خودتان آگاه نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - در صورتی که دچار دیابت، پورفیری، فشارخون بالا، مشکلات قلبی و عروقی یا بیماری‌های بلندمدت کلیوی هستید و نیز اگر از داروهای دیگر استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : سیکل ماهیانه نامنظم و خونریزی بیشتر، احتباس آب در بدن و در نتیجه ورم دست و پا، افزایش وزن، تهوع، استفراغ، حساسیت پستان‌ها، سردرد و سرگیجه.

تداخل‌های دارویی: این دارو اثر سیکلوسپورین را تشدید می‌کند.

صرف در شیردهی و بارداری: مصرف مقادیر معمولی آن در بارداری و شیردهی اشکالی ندارد. از این دارو برای جلوگیری از سقط جنین نیز استفاده می‌شود و مصرف مقدار زیاد آن می‌تواند تولید شیر را مهار کند.

Doxycycline

داکسی‌سیکلین

نیاز به تجوییز پزشک: دارد

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک گروه تتراسیکلین

اشکال دارویی موجود: قرص و کپسول

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: ۲-۱ بار در روز همراه با غذا یا بعد از آن

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ۱۲-۴ ساعت بعد از مصرف، اثرات آن شروع می‌شود و ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: حتی در صورت بھبود عالیم، دوره درمان را کامل کنید - در صورت بروز عالیم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت داشتن سابقه حساسیت به داروهای گروه تتراسیکلین، ابتلا به پورفیری و مشکلات بلندمدت کبدی و نیز استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - جز در درمان بیماری آکنه، به صورت بلندمدت تجوییز نمی‌شود.

علورض ناخواسته: تهوع، استفراغ، اسهال، دانه‌های پوستی، خارش و حساسیت به نور آفتاب.

تداخل‌های دارویی: داکسی‌سیکلین، اثر ضدانعقادی داروهای ضدانعقاد خون را افزایش می‌دهد - باربیتورات‌ها، کاربامازین و فنی‌توئین اثر این دارو را کاهش می‌دهند - اثر داروهای ضدبارداری خوراکی در مصرف هم‌زمان با این دارو کم می‌شود - ضداسیدها و ترکیبات محتوی آهن یا منیزیم یا کلسیم باعث اختلال در جذب دارو می‌شوند، لذا بین مصرف داکسی‌سیکلین و این داروها باید ۳-۲ ساعت فاصله باشد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری می‌تواند در استخوان‌ها رسوب کرده، باعث رنگی شدن استخوان‌های جنین در حال رشد شود و در شیردهی، منجر به رنگی شدن دندان‌های شیرخوار می‌شود؛ بنابراین از این دارو در شیردهی و بارداری نباید استفاده کرد.

Emetine HCL

امتین

اشکال دارویی موجود در ایران: محلول تزریقی

گروه دارویی: ضدآمیب

مقدار و روش مصرف : برای درمان عفونت آمیبی (وده) : ۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به مدت ۱۰ - ۳ روز از راه تزریق عضلانی یا زیر جلدی

موارد عدمه استعمال دارو : درمان عفونت آمیبی روده و عفونت آمیبی خارج از روده (مثل آسسه‌های آمیبی و هپاتیت ناشی از آمیب) .

عوارض جانبی مهم : بی‌اشتهاایی، تهوع، استفراغ، اسهال، بیوست، ضعف عمومی، بی‌حالی، آسیب دیدن اعصاب محیطی و کهیر.

Enalapril انالاپریل

گروه دارویی : گشادکننده عروق از گروه مهارکننده‌های ACE

نیاز به تجویز پزشک : دارد	میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط
اشکال دارویی موجود : قرص و ویفر	زمان و دفعات مصرف : ۱-۲ بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف یک ساعت اثر دارو شروع می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.	

نحوه نگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض جانبی شدید، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث غش و سرگیجه شود - قبل از آگاهی از اثرات این دارو بر روی خودتان، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - در صورت ابتلاء به دیابت، پرکاری تیروئید، بیماری قلبی، فشارخون بالا، گلوكوم (آب مروارید)، مشکلات ادراری و نیز مشکلات بلندمدت کلیوی و یا در صورتی که از داروهای دیگر هم استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در بلندمدت مشکلی ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته : سرگیجه، تهوع، سردرد، سرفه مقاوم و خشک، دانه‌های پوستی و خارش.

تداخل‌های دارویی : NSAIDها و ضدفسارخون‌ها، اثر ضدفسارخون این دارو را تشدید می‌کنند - این دارو، سطح لیتیم خون را بالا برده و عوارض آن را تشدید می‌کند - مصرف همزمان سیکلوسپورین و انالاپریل، سطح پتاسیم خون را افزایش می‌دهد - مصرف این دارو همراه با فرآورده‌های محتوی پتاسیم یا دیورتیک‌های افزاینده پتاسیم، باعث افزایش سطح پتاسیم خون می‌شود و NSAIDها باعث کاهش تأثیرات انالاپریل می‌شوند - مصرف همزمان NSAIDها و انالاپریل می‌تواند باعث آسیب‌دیدگی کلیه‌ها شود.

صرف در شیردهی و بارداری : به علت ایجاد نقص در جنین در بارداری تجویز نمی‌شود. در شیردهی مصرف مقادیر معمولی دارو اشکالی ایجاد نمی‌کند.

Ephedrine افرین

گروه دارویی : ضداحتقان، گشادکننده برونش‌ها
نیاز به تجویز پزشک : ندارد
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : قرص، شربت، آمپول و قطره داخل بینی.

زمان و دفعات مصرف : اشکال خوراکی ۳ بار در روز و قطره داخل بینی ۴-۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۶۰-۱۵ دقیقه اثر می‌کند و ۳-۶ ساعت در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو : دارو را در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون هیچ نگرانی می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث تنگی نفس، تب بالا، تشنگ یا کاهش هوشیاری شود که باید فوراً با پزشک تماس بگیرید - مصرف قطره بینی مشکلی هنگام رانندگی و کارهای حساس ایجاد نمی‌کند اما در مصرف اشکال دیگر افرین، بدون آگاهی از تأثیر آن روی بدن تان از چنین کارهایی دوری کنید - در صورت ابتلا به بیماری‌های قلبی، فشارخون بالا، دیابت، پرکاری تیروئید، گلوکوم، مشکلات ادراری و بیماری‌های مزمن کبدی یا کلیوی و نیز در صورت مصرف داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن جز با دستور پزشک توصیه نمی‌شود.

عوارض ناخواسته : قطره بینی عوارضی ندارد. اشکال خوراکی عوارض زیر را ایجاد می‌کنند: بی‌خوابی، اضطراب، تپش قلب، درد قفسه سینه، اگتشاش ذهنی، لرز، خشکی دهان و مشکلات ادراری.

تداخل‌های دارویی : با گروه MAOIs می‌تواند باعث افزایش خطرناک فشارخون شود - با اثر ضدفشارخون برخی داروهای کاهنده فشارخون مقابله می‌کند - این دارو در اثر تداخل با بتاپلوكرها نیز می‌تواند باعث افزایش خطرناک فشارخون شود.

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری اثبات نشده است و در شیردهی دارو وارد شیر می‌شود اما در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Epinephrine اپی‌نفرین (آدرنالین)

گروه دارویی: ضدگلوكوم، مورد استفاده در احیاء قلبی و شوک آنافیلاکسی

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: آمپول و قطره چشمی

زمان و دفعات مصرف: بستگی به روش استعمال و مشکل اصلی بیمار دارد.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: قطره چشمی ظرف یک ساعت و آمپول ظرف ۵ دقیقه اثر می‌کند. آمپول تا ۴ ساعت و قطره چشمی تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو: دارو را در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - همه موارد مصرف اضافی آن نیازمند توجه جدی است اما در صورت ایجاد تپش قلب، مشکلات تنفسی و کاهش هوشیاری، اقدامات اورژانس لازم است - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات قلبی، دیابت، پرکاری تیروئید، مشکلات دستگاه عصبی و فشارخون بالا و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت قطره چشمی آدرنالین همراه با لنز تماسی نرم توصیه نمی‌شود.

عوارض ناخواسته: تپش قلب، عصبی شدن و نارامی، خشکی دهان، سردرد و تاری دید. قطره چشمی می‌تواند باعث ورم یا سوختگی شود.

تداخل‌های دارویی: داروهای گروه MAOIs و ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای با این دارو تداخل کرده اثر آن را در افزایش فشارخون و ایجاد تپش قلب تشدید می‌کنند - اپی‌نفرین اثر داروهای ضددیابت خوراکی را کاهش می‌دهد - در اثر تداخل با بعضی بتابلوکرها مثل پروپرانولول، احتمال افزایش خطربناک فشارخون را بیشتر می‌کند.

صرف در شیردهی و بارداری: در شیردهی اثر آن مشخص نیست. در بارداری ممکن است باعث نقاچی در جنین شود یا زایمان را به تأخیر اندازد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Ergotamine ارگوتامین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدمیگرن

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

اشکال دارویی موجود: قرص بلعیدنی یا زیر زبانی ، شیاف و استنشاقی زمان و دفعات مصرف : ابتدا یک بار مصرف می‌شود . اگر نیاز شد قرص را ۳۰ دقیقه بعد و شکل استنشاقی را ۵ دقیقه بعد مصرف می‌کنیم .
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو ۱۵-۳۰ دقیقه بعد از مصرف بروز می‌کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رزیم غذایی مناسب : مصرف برخی غذاها باعث تحریک پروسمه میگرن (در برخی از مردم) می‌شود .
موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقادیر اضافی آن می‌تواند باعث سرگیجه ، استفراغ ، تشنج یا کما شود که در این صورت باید به پزشک اطلاع دهید - قبل از آگاهی از اثر این دارو روی خودتان از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید ، چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - در صورتی که دچار مشکلات قلبی ، ضعف گردش خون ، فشارخون بالا و پرکاری تیروئید هستید و نیز در صورتی که جدیداً دچار حمله مغزی شده‌اید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - آن را به صورت بلندمدت و با دوز بالا منصرف نکنید ، چون می‌تواند جریان خون را در پاها و دست‌ها کاهش دهد .

عوارض ناخواسته : اختلال گوارشی ، تهوع ، سفتی عضلانی و درد ، اسهال ، سرگیجه ، سردی و بی‌حسی انگشتان دست و پا .

تداخل‌های دارویی : مصرف اریترومایسین با این دارو ، عوارض احتمالی را افزایش می‌دهد - مصرف در زنانی که این دارو را همراه با ضدبارداری‌های خوراکی OCP مصرف می‌کنند ، احتمال لخته شدن غیرطبیعی خون را افزایش می‌دهد - بتابلوکرها و سوماتریپتان همراه با این دارو باعث افزایش مشکل گردش خونی می‌شوند .

مصرف در شیردهی و بارداری : در هر دو مورد تجویز نمی‌شود زیرا در بارداری باعث انقباض رحم می‌شود و در شیردهی وارد شیر شده روی شیرخوار اثر می‌گذارد و باعث کاهش ترشح شیر می‌شود .

Erythromycin

اریترومایسین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : آنتی‌بیوتیک

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : قرص ، کپسول ، آمپول ، مایع و محلول موضعی

زمان و دفعات مصرف : هر ۱۲-۶ ساعت ، قبل از غذا یا همراه آن

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ۱-۴ ساعت بعد از مصرف اثر دارو شروع می‌شود و ۶-۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : اگر دوره درمان کامل نشود ممکن است عفونت دوباره عود کند - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیاد دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری پورفیری و نیز داشتن سابقه حساسیت به اریترومایسین و یا استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بیش از دو هفتة آن اختلال آسیب‌ها و ضایعات کبدی را افزایش می‌دهد.

عوارض ناخواسته : تهوع و استفراغ شایع‌ترین عوارض مصرف خوراکی دارو هستند - در افرادی که کارکرد کلیه‌شان مشکل دارد مصرف مقادیر زیاد دارو می‌تواند باعث کری شود.

تداخل‌های دارویی : این دارو سطح خونی کاربامازپین و دیگوکسین را افزایش می‌دهد - مصرف همزمان وارفارین و این دارو می‌تواند باعث خونریزی شود - این دارو عوارض ارگوتامین، تئوفیلین و آمینوفیلین را تشدید می‌کند.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری مشکلی ندارد و مصرف مقادیر معمولی آن در شیردهی اشکالی ندارد اما در این مورد با پزشک نیز مشورت کنید.

Estradiol

استرادیول

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : هورمون جنسی زنانه

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : قرص، ژل پوستی، کاشتنی، پچ (چسب) و شیاف واژینال

زمان و دفعات مصرف : قرص و ژل پوستی یک بار در شبانه‌روز، پچ‌های پوستی هر ۱-۷ روز یک بار - شکل کاشتنی هر ۴-۸ ماه - شیاف و واژینال هر ۱-۷ روز یک بار - حلقة واژینال هر ۳ ماه یک بار

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۲۰-۱۰ دقیقه اثر می‌کند و ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات قلب و گردش خون، مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، پورفیری، سابقه حمله مغزی یا لخته شدن خون، صرع و میگرن و نیز در صورت

استعمال دخانیات یا مصرف داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهد - مصرف بیش از پنج ماه ممکن است منجر به افزایش احتمال سرطان پستان شود.

عوارض ناخواسته: تهوع، استفراغ، ورم پستان و حساسیت آن، افزایش وزن، سردرد و بروز علایم افسردگی.

تداخل‌های دارویی: استعمال دود تباکو ممکن است عوارض این دارو را روی قلب افزایش دهد - ریفارمپین، کاربامازپین، فنیتوئین و فنوباربیتال اثر این دارو را کاهش می‌دهند - این دارو اثر ضدانعقادها را کم می‌کند.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود زیرا می‌تواند باعث مهار تولید شیر در پستان شود. در صورتی که ضرورتی برای مصرف این دارو در شیردهی پیش آید باید با پزشک مشورت کنید.

Ethinyl Estradiol اتینیل استرادیول

گروه دارویی: هورمون جنسی زنانه، ضدبارداری خوراکی

میزان خطر در مصرف اضافی: کم **نیاز به تجویز پزشک:** دارد

اشکال دارویی موجود: قرص

زمان و دفعات مصرف: یک بار در روز و در دوره زمانی خاصی از سیکل ماهیانه زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۲۰-۱۰ روز دارو اثر می‌کند. اثر ضدبارداری دارو بیشتر از ۷ روز طول می‌کشد و ۱-۲ روز در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف این دارو را نباید قطع کنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، به پزشک اطلاع دهد - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر دچار نارسایی قلبی، فشارخون بالا یا مشکلات بلندمدت کبدی و کلیوی هستید و اگر سابقه لخته شدن غیرطبیعی خون در خود یا خویشاوندانتان دارید (البته بستگان نزدیک) و نیز در صورتی که دخانیات استعمال می‌کنید یا به دیابت، صرع و میگرن دچار هستید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهد - مصرف آن به مدت بیش از پنج ماه می‌تواند احتمال سرطان رحم بعد از یائسگی را افزایش دهد.

عوارض ناخواسته: تهوع، استفراغ، افزایش وزن، حساسیت و ورم پستان‌ها، بروز علایم افسردگی و سردرد.

تداخل‌های دارویی : دود تنبکو عوارض قلبی و عروقی این دارو را افزایش می‌دهد - ضدتشنج‌ها و ریفامپین ، اثر ضدبارداری این دارو را کم می‌کنند - این دارو اثر ضدفسخارخون‌ها و دیورتیک‌ها را کم می‌کند - آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند اثر این دارو و سایر ضدبارداری‌های خوراکی را کم کنند .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود و در شیردهی می‌تواند تولید شیر را مهار کند لذا در این مورد با پزشک مشورت کنید .

Etidronate

اتیدرونات

گروه دارویی : دارو مورد استفاده در درمان بیماری‌های استخوانی

میزان خطر در صرف اضافی : متوسط

نیاز به تجویز پزشک : دارد

اشکال دارویی موجود : قرص

زمان و دفعات صرف : یک بار در روز با معدہ خالی (دو ساعت بعد یا قبل از غذا)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : در بیماری پاژه و استئوپروز ، تأثیر مفید دارو نیاز به چند ماه زمان دارد . برخی آثار دارو ، ماهها و هفته‌ها در بدن باقی می‌ماند .

رزیم غذایی مناسب : جذب دارو توسط مواد غذایی ، به ویژه غذاهای محتوی کلسیم کاهش می‌یابد . لذا هنگام صرف دارو معده باید خالی باشد ، همچنین مقدار کافی ویتامین D و کلسیم از راه مواد غذایی یا تجویز دارویی باید وارد بدن شود .

نحوه نگهداری از دارو : دارو باید در ظرف دربسته ، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع صرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک صرف آن را متوقف نکنید - صرف مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث گرفتگی عضلات شود که باید به پزشک اطلاع دهید - صرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به کولیت ، حساسیت قبلی به این دارو و مشکلات بلندمدت کلیوی و نیز صرف داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - صرف بلندمدت آن می‌تواند باعث افزایش احتمال شکستگی استخوان شود .

عوارض ناخواسته : شایع‌ترین عارضه آن ، اسهال است . عوارض دیگر عبارتند از تهوع ، یبوست ، شکم‌درد ، خارش یا دانه‌های پوستی و درد استخوان در ابتدای درمان در برخی بیماران مبتلا به بیماری پاژه .

تداخل‌های دارویی : ضداسیدها یا آهن باید حداقل دو ساعت قبل یا بعد از صرف این دارو صرف شوند تا اثر آن‌ها بر روی جذب این دارو جلوگیری شود یا به حداقل برسد .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Ethosuximide

اتوسوکسیماید

گروه دارویی : ضدتشنج

اشکال دارویی موجود : کپسول و مایع

میزان خطر در صرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات صرف : ۱-۲ بار در شبانه‌روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف یک ساعت اثر آن بروز می‌کند و ۲ روز در بدن فعال است.

موارد منع صرف و احتیاط : صرف آن را بدون مشورت با پزشک متوقف نکنید - صرف مقادیر بالای آن می‌تواند باعث خواب آلودگی شود که باید با پزشک مشورت کنید - ابتلا به بیماری اصلی که صرف اتوسوکسیماید را ضروری ساخته، ممکن است انجام کارهای حساس یا رانندگی را منتفی سازد - در صورت ابتلا به ناراحتی کبدی یا کلیوی بلندمدت یا بیماری پورفیری و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - صرف بلندمدت آن خطر بیماری‌های خونی را افزایش می‌دهد.

عوارض ناخواسته : عوارضی که معمولاً در صورت صرف دارو با دوز بالا ایجاد می‌شوند عبارتند از: تهوع، استفراغ، سردرد و خواب آلودگی.

תداخل‌های دارویی : داروهای دارای اثر آرامبخش، اثر آرامبخشی دارو را افزایش می‌دهند - کاربامازپین، سطح اتوسوکسیماید را در خون کاهش می‌دهد - فنی‌تئین و والپتروات سدیم ممکن است غلظت این دارو را در خون تغییر دهند.

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری به اثبات نرسیده است و در شیردهی نیز می‌تواند به داخل شیر ترشح شده و باعث عوارضی مانند: کاهش قدرت مکیدن پستان در شیرخوار شود. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Eucalyptus

اوکالیپتوس

گروه دارویی : بُخور

مقدار و روش صرف: روزانه چند بار، هر بار یک قاشق سوپ‌خوری از محلول را در یک ظرف آب داغ (در حال جوشیدن نباشد) ریخته، به مدت ۵-۱۰ دقیقه، در حالی که چشم‌ها بسته هستند بخور می‌دهند.

موارد عمده استعمال دارو : جهت تسکین علائم سرماخوردگی مثل گرفتگی بینی و سرفه ، سردرد گریپ ، زکام ، آنفلوآنزا ، برونشیت و سینوزیت .

Expectorant

اکسپکتورانت

گروه دارویی : خلط‌اور ، خدسرفه ، خداحتقان بینی **اشکال دارویی موجود در ایران :** شربت مقدار و روش مصرف : ۱- قاشق مرباخوری هر ۶ ساعت یک بار

موارد عمده استعمال دارو : تسکین سرفه و تسکین علامتی علائم آلرژی .

عوارض جانبی مهم : حساسیت به نور ، خشکی دهان و گلو و بینی ، کاهش فشارخون ، رخوت ، منگی ، سرگیجه ، خستگی ، سرخوشی ، تاری دید ، دوبینی ، بی‌اشتهاایی ، اشکال در دفع ادرار ، گرفتگی بینی .

Famotidine

فاموتیدین

گروه دارویی : خذراخم معده و روده ، مهار کننده ترشح اسید معده

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص پوشش‌دار و آمپول

مقدار و روش مصرف : جهت درمان **زخم دوازدهه :** ۴۰ میلی‌گرم از راه خوراکی قبل از خواب یا ۲۰ میلی‌گرم دو بار در روز ؛ یا ۲۰ میلی‌گرم از راه وریدی هر ۱۲ ساعت یک بار . **جهت درمان نگهدارنده زخم معده و دوازدهه :** ۲۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ، قبل از خواب .

موارد عمده استعمال دارو : درمان کوتاه مدت زخم فعال اثنی عشر (دوازدهه) — درمان نگهدارنده برای زخم اثنی عشر — درمان زخم معده خوش‌خیم — درمان ترشح زیادی اسید معده .

عوارض جانبی مهم : خواب‌آلودگی ، افسردگی ، تاری دید ، سرگیجه ، اضطراب ، اسهال ، خشکی دهان ، ناتوانی جنسی و دندان قریچه در خواب .

Fenfluramine HCL

فن‌فلورامین

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص پوشش‌دار

گروه دارویی : کم‌کننده اشتها

مقدار و روش مصرف : ۲۰ میلی‌گرم (یک قرص) ، قبل از هر وعده غذا

موارد عمده استعمال دارو : درمان کوتاه مدت چاقی همراه با رژیم غذایی کم کالری .

عوارض جانبی مهم : بی‌نظمی قلبی ، تنگی نفس ، افزایش ضربان قلب ، افسردگی ، کسالت ، سردرد ، خواب آلودگی ، سرخوشی و گیجی .

Ferrous Fumarate فروس فومارات آهن (فومارات آهن)

گروه دارویی : فراورده آهن
اشکال دارویی موجود در ایران : قرص

مقدار و روش مصرف : درمان کم‌فونی : ۲۰۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ، ۳-۴ بار در روز . پیشگیری از کم‌فونی : ۲۰۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ، یک بار در روز .

موارد عمده استعمال دارو : پیشگیری و درمان کم‌خونی ناشی از کمبود آهن ، رژیم غذایی نامناسب ، سوء جذب ، بارداری و از دست دادن خون .

عوارض جانبی مهم : تحریک دستگاه گوارش و ایجاد تهوع و اسهال ، تیره شدن مدفوع ، تیره شدن دندان در کودکان .

Ferrous Sulfate فروسولفات آهن (سولفات آهن)

گروه دارویی : داروی خون‌ساز ، ترکیب آهن خوراکی
اشکال دارویی موجود در ایران : شربت ، قطره و قرص

مقدار و روش مصرف : درمان کم‌فونی ناشی از کمبود آهن : ۱۵۰۰ - ۷۵۰ میلی‌گرم روزانه از راه خوراکی در ۱ تا ۳ نوبت . به عنوان مکمل آهن در زنان باردار : روزانه ۳۰۰ میلی‌گرم ، در چند نوبت .
موارد عمده استعمال دارو : پیشگیری و درمان کم‌خونی ناشی از کمبود آهن .

عوارض جانبی مهم : تحریک دستگاه گوارش و ایجاد تهوع و اسهال ، تیره شدن مدفوع و تیره شدن دندان در کودکان .

Finasteride فیناستراید

گروه دارویی : داروی مورد استفاده در بیماری‌های دستگاه ادراری
میزان خطر در مصرف اضافی : کم
زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز
نیاز به تجویز پزشک : دارد
اشکال دارویی موجود : قرص

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف یک ساعت اثر آن شروع می‌شود اما چند ماه طول می‌کشد تا آثار مفید آن کاملاً ظاهر شود و به مدت ۲۴ ساعت در بدن فعال است.
نحوه نگهداری از دارو : در ظرف درسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - بعد از ۶ ماه مصرف، باید ارزیابی کرد که آیا مصرف آن مفید بوده است یا نه.

عوارض ناخواسته : کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی، کاهش حجم منی، ورم پا و حساسیت پستان که به ندرت اتفاق می‌افتد.
تداخل‌های دارویی : ندارد.

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود و در شیردهی معمولاً ضرورت تجویز آن پیش نمی‌آید.

Fluocinolone Acetonide

فلوئوسینولون

گروه دارویی : کورتیکو استروئید (کورتون) موضعی اشکال دارویی موجود در ایران: پماد و کرم مقدار و روش مصرف: یک لایه نازک روی پوست تمیز هر ۱۲-۶ ساعت یک بار مالیده می‌شود.

موارد عمده استعمال دارو : تسکین التهابات پوستی قابل درمان با کورتون‌ها
عوارض جانبی مهم : پرمومی، کمرنگ شدن یا شیاردار شدن پوست، تحریک یا خشکی پوست، تحلیل رفتن پوست، عفونت ثانویه، خارش پوست.

Fluconazole

فلوکونازول

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی : خدقارچ

اشکال دارویی موجود: کپسول، مایع و تزریقی

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : دارو ظرف چند ساعت اثر می‌کند اما ظهور اثر کامل آن چند روز طول می‌کشد و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو: دارو در ظرف دربسته ، جای خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : دوره درمان باید کامل شود - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر به مشکلات کبدی یا کلیوی مبتلا هستید یا سابقه حساسیت به داروهای ضدقارچ دارید و نیز اگر از داروهای دیگر استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - گرچه دوره مصرف آن معمولاً کوتاه است اما ممکن است برای جلوگیری از عود منژیت منگوکوکی در بیماران مبتلا به نقص اینمی به صورت نامحدود مصرف شود .

عوارض ناخواسته : ناراحتی شکم ، تهوع ، استفراغ و اسهال .

تداخل های دارویی : این دارو ، اثر ضدانعقادهای خوراکی مثل وارفارین را افزایش می دهد - این دارو خطر کاهش قندخون در اثر ضددیابت های خوراکی مثل گلی بن کلامید را افزایش می دهد .
صرف در شیردهی و بارداری : در شیردهی تجویز نمی شود و در بارداری بی ضرر بودن آن ثابت نشده است .

Fluphenazine فلوفنازین

گروه دارویی : ضدسایکوز (جنون)

اشکال دارویی موجود در ایران : آمپول و قرص پوشش دار
مقدار و روش مصرف : همه اگر : ۰/۵-۱۰ میلی گرم در هر روز در ۴-۱ نوبت . تزریقی : ۲۵-۵/۱۲ میلی گرم ، از راه عضلانی یا زیر جلدی هر ۴-۱ هفته یک بار
موارد عدمه استعمال دارو : درمان علائم اختلالات ناشی از جنون .

عوارض جانبی مهم : خواب آلودگی ، حرکات ناهمجارت ، سرگیجه ، احتباس ادرار ، خشکی دهان ، تاری دید ، احتقان بینی و نشانه های خارج هرمی (مشابه بیماری پارکینسون) .

Fluoxetine فلوکستین

گروه دارویی : ضدافسردگی

نیاز به تجویز پزشک : دارد
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : کپسول و مایع

زمان و دفعات مصرف: یک بار در روز هنگام صبح زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: برخی آثار مفید دارو ظرف دو هفته ظاهر می‌شود اما آثار مفید و کامل آن ظرف ۴ هفته نمایان می‌شود. دارو تا ۶ هفته در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز راش‌های پوستی، مصرف آن را بدون هماهنگی با پزشک متوقف نکنید - مقدار زیاد آن می‌تواند عوارض نامطلوبی ایجاد کند که باید به پزشک اطلاع داده شود - تا از اثر آن روی خودتان آگاه نیستید، از رانندگی و کارهای حساس بپرهیزید، چون می‌تواند باعث خواب‌آلودگی شود - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری‌های قلبی، دیابت یا تشنج صرعی هستید و نیز به این دارو یا مصرف داروهای دیگر حساسیت دارید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن مشکلی ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته: بی‌خوابی، نارامی، سردرد، بی‌نظمی‌های روده مانند تهوع و استفراغ، کاهش وزن، خواب‌آلودگی و اختلالات جنسی.

تداخل‌های دارویی: تمام آرامبخش‌ها اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می‌دهند - مصرف همزمان آن با تریپتوфан می‌تواند منجر به برافروختگی، نارامی و زخم معده شود - این دارو می‌تواند با افزایش سطح خونی لیتیم سمیت آن را افزایش دهد - درمان با فلوکستین نباید زودتر از دو هفته بعد از توقف مصرف داروهای MAOIs شروع شود و مصرف داروهای گروه MAOIs نباید زودتر از پنج هفته بعد از توقف مصرف فلوکستین شروع شود؛ چون این کار می‌تواند باعث عوارض شدید شود.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری بی‌ضرر بودن آن به اثبات نرسیده و در شیردهی به داخل شیر ترشح می‌شود پس با پزشک مشورت کنید.

Flupentixol

فلوپنتیکسل

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدجنون (سایکوز)

اشکال دارویی موجود: تزریقی و قرص

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: قرص ۲-۱ بار در روز و شکل تزریقی هر ۲-۴ هفته یک بار

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر دارو ظرف ۱۰ روز ظاهر می‌شود. شکل خوراکی تا ۱۲ ساعت و شکلی تزریقی ۲-۴ هفته در بدن فعال است.

نحوه تwendاری از دارو: دارو را در دمای اتاق، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض شدید مصرف آن را به طور ناگهانی متوقف نکنید - مقدار زیاد آن می‌تواند باعث خوابآلودگی ، تشنّج ، کاهش فشارخون و نیز افزایش یا کاهش دمای بدن یا شوک شود که باید به اطلاع پزشک رسانده شود - تا از اثر این دارو روی خودتان آگاه نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید ، چون می‌تواند باعث خوابآلودگی شود - اگر مبتلا به بیماری‌های قلبی ، پورفیری ، تشنّج صرعی ، بیماری‌های تیروئید ، گلوکوم و پارکینسون هستید و یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث بیماری‌های خونی ، یرقان و سایر اختلالات کبدی شود .

عوارض ناخواسته : تاری دید ، خشکی دهان ، اختلال ادراری ، خوابآلودگی ، تهوع ، افزایش وزن ، لرز ، پارکینسونیزم و تندر شدن ضربان قلب .

تداخل‌های دارویی : این دارو باعث کاهش اثر داروهای ضدتشنج می‌شود - در صورت مصرف همزمان با داروهای ضدآریتمی ، خطر آریتمی را افزایش می‌دهد - اثر داروهای آنتی کولینرژیک را نیز افزایش می‌دهد . این دارو همراه با داروهای آرامبخش اثر آرامبخشی این دارو را تشديد می‌کند .

صرف در شیردهی و بارداری : در شیردهی وارد شیر می‌شود و باید در خصوص مصرف آن با پزشک مشورت شود . در بارداری باعث کرختی در جنین می‌شود لذا تجویز نمی‌شود .

Flurazepam HCL

فلورازپام

گروه دارویی : خوابآور

مقدار و روش مصرف : ۳۰ میلی‌گرم قبل از خواب و برای برخی افراد ۱۵ میلی‌گرم

موارد عمده استعمال دارو : درمان انواع بی‌خوابی مثل : اشکال در به خواب رفتن ، بی‌خوابی ناشی از تکرر ادرار و بیداری بی‌موقع .

عوارض جانبی مهم : گیجی ، خوابآلودگی ، منگی ، تلوتلو خوردن ، چرت زدن ، عدم جهت‌یابی ، پرحرفی ، تحریک‌پذیری ، طپش قلب .

Fluticasone

فلوتیکازون

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : کورتیکواستروئید

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : پماد ، کرم ، اسپری نازال (اسپری داخل بینی) و استنشاقی

زمان و دفعات مصرف: برای درمان آسم ۲ بار و برای درمان رینیت الرژیک روزی ۱-۲ بار زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر دارو در درمان آسم ظرف ۴-۷ روز و در درمان رینیت الرژیک ظرف ۳-۴ روز ظاهر می‌شود. آثار دارو می‌تواند چندین روز بعد از توقف مصرف در بدن باقی بماند.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مصرف مقدار زیاد آن در یک دوره طولانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود - در رانندگی و کارهای حساس مصرف آن اشکال ندارد - در صورت ابتلا به سینوزیت مزمن یا داشتن سابقه جراحی بینی یا زخم بینی، سابقه سل یا عفونت‌های تنفسی دیگر و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - در صورت طولانی مدت برای درمان رینیت الرژیک از آن استفاده می‌کنید مشکلی ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته: تحریک سطح داخلی بینی و خون آمدن از بینی در مصرف اسپری بینی، زخم گلو یا دهان و گرفتگی صدا ناشی از عفونت قارچی کاندیدایی در دهان، تغییرات پوستی (در مصرف پماد و کرم) و اختلال در حس بویایی و چشایی. **تداخل‌های دارویی:** ندارد.

مصرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری و شیردهی ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Folic Acid (Vitamine B₉)

اسید فولیک

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص و آمپول

گروه دارویی: ویتامین گروه B

مقدار و روش مصرف: ۱ میلی‌گرم در روز. درمان کم‌فونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود اسید فولیک: ۲۰ - ۵ میلی‌گرم در روز

موارد عمده استعمال دارو: آنمی ماکروسیتیک ناشی از سوء تغذیه - آنمی مگالوبلاستیک ناشی از بارداری، شیرخوارگی و طفولیت - درمان آنمی مگالوبلاستیک و ماکروسیتیک ناشی از کمبود اسید فولیک.

عوارض جانبی معمم: واکنش‌های حساسیتی که به صورت قرمزی، دانه‌های پوستی، خارش و اشکال در تنفس بروز می‌کنند.

Fosinopril

فوژینوپریل

گروه دارویی: گشادکننده رگ‌ها (از گروه مهارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آئریوتانسین ACE)

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

نیاز به تجویز پزشک : دارد

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز

اشکال دارویی موجود : قرص

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : دارو ظرف یک ساعت اثر می‌کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض جانبی شدید مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مقادیر زیاد این دارو می‌تواند باعث سرگیجه، غش و افت فشارخون شود که باید بی‌درنگ به پزشک اطلاع دهید - تا از اثر آن بر روی خودتان آگاه نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - در صورت ابتلا به آلرژی شدید، مشکلات بلندمدت کلیوی، بیماری عروق کرونر قلب و بیماری عروق محیطی و نیز اگر رژیم کم سدیم دارید یا به سایر داروهای این گروه حساسیت دارید و نیز در صورتی که از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت این دارو ندرتاً در بعضی افراد منجر به تغییراتی در شماره سلول‌های خونی و نیز کارکرد طبیعی کلیه می‌شود.

عارضن ناخواسته : سرگیجه، تهوع، سردد، سرفه خشک و مقاوم، راش (دانه‌های پوستی) و خارش پوست.

داخل‌های دارویی : آنتی‌اسیدها، باعث اختلال در جذب فوزینوپریل می‌شوند - ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی (NSAIDs) باعث کاهش آثار این دارو می‌شود - مصرف همزمان NSAID‌ها با این دارو خطر آسیب‌های کلیوی را افزایش می‌دهد - این دارو سطح لیتیم خون را افزایش می‌دهد - گشادکننده‌های عروقی، دیورتیک‌ها و سایر کاهنده‌های فشارخون می‌توانند اثرات این دارو را افزایش دهند - مصرف همزمان این دارو با دیورتیک‌های نگهدارنده پتابسیم می‌تواند خطر بالا رفتن پتابسیم خون را افزایش دهد.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود زیرا باعث تقایصی در جنین می‌شود. مصرف مقادیر معمولی آن در شیردهی اشکالی ندارد اما در این مورد با پزشک مشورت کنید.

Furesemide

فورز‌ماید

گروه دارویی : دیورتیک (ضدفشارخون ادرارآور) **نیاز به تجویز پزشک :** دارد

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز هنگام صبح - در صورت درمان با دوز بالا ۴-۶ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : شکل تزریقی در ۵ دقیقه و شکل خوراکی در یک ساعت اثر می‌کند و به مدت ۶ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب: این دارو ممکن است ذخایر پتاسیم بدن را کاهش دهد. در رژیم غذایی باید از مواد غذایی غنی از پتاسیم مانند سبزیجات و میوه‌های تازه استفاده کرد.

نحوه نگهداری از دارو: دارو در جای خشک و خنک، در ظرف دربسته و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

مولارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز عوارض شدید، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیاد این دارو، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلاء به مشکل بلندمدت کبدی، نقرس، دیابت و مشکلات پروستات و نیز در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو یا استفاده از مسهل‌ها و داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن مشکلی ایجاد نمی‌کند اما ممکن است باعث کاهش سطح املاح بدن مثل کلسیم، سدیم و پتاسیم شود.

عارض ناخواسته: سرگیجه، تهوع، کرتختی، گرفتگی عضلات، سردرد و صدای زنگ در گوش‌ها که ممکن است در اثر تزریق زیاد این دارو ایجاد شود.

تداخل‌های دارویی: بعضی از ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی (NSAIDs) می‌توانند اثر این دارو را کاهش دهند. فورزمايد، غلظت لیتیم را در خون بالا برده و احتمال عوارض جانبی را تشديد می‌کند. این دارو با کاهش غلظت پتاسیم خون اثر سمی دیگوکسین را تشديد می‌کند. مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها اثر سمی آن‌ها را روی دستگاه شنوایی و کلیه‌ها تشديد می‌کند. مصرف همزمان دارو با مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)، باعث کاهش بیشتر فشارخون می‌شود.

مصرف در شیردهی و بارداری: زیان‌آور بودن آن در شیردهی مشخص نیست و بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است پس باید با پزشک مشورت شود.

Furazolidone

فورازولیدون

گروه دارویی: ضدباکتری، ضدتک‌یاخته

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص و سوسپانسیون

مقدار و روش مصرف: در درمان اسهال میکروبی یا تکبیافت‌های و عفونت (ودهای: ۱۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز) موارد عمده استعمال دارو: اسهال میکروبی و تک‌یاخته‌ای - عفونت روده در اثر میکروب‌های حساس به این دارو.

عارض جانبی مهم: اسهال، استفراغ، تهوع، بی‌اشتهاایی، دانه‌های پوستی، تب و درد مفاصل.

Gemfibrozil**جم فیبروزیل**

اشکال دارویی موجود در ایران: کپسول

گروه دارویی: کاهش دهنده چربی خون
مقدار و روش مصرف: در درمان هایپر تری گلیسریدمی (سطح بالای تری گلیسرید در فون) : ۶۰۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۱۲ ساعت یک بار؛ نیم ساعت قبل از غذا

موارد عمده استعمال دارو: درمان بیمارانی که سطح تری گلیسرید خون در آنها بالا است.
عوارض جانبی مهم: سردرد، سرگیجه، درد شکم، نفح، اسهال، استفراغ، تهوع، کم خونی، درد عضلانی، درد مفاصل، خارش، کهیر و خستگی.

Gentamicin**جنتامایسین**

نیاز به تحویز پزشک: دارد

گروه دارویی: آنتی بیوتیک گروه آمینو گلیکوژید
میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: پماد، کرم، تزریقی، پماد چشمی و قطره چشمی و گوشی
زمان و دفعات مصرف: شکل تزریقی ۳ بار در روز و سایر اشکال دارویی دیگر ۳-۴ بار در روز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: دارو ظرف ۲-۱ ساعت در بدن اثر می کند و ۸-۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: دوره درمان باید کامل شود - مصرف اضافی شکل تزریقی این دارو خطرناک است اما اشکال دیگر آن (مثل پماد و قطره) اشکالی ندارد - مصرف آن در راندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به بیماری های دستگاه شنوایی، بیماری میاستنی گراو، بیماری پارکینسون و مشکلات بلندمدت کلیوی و نیز در صورت حساسیت به آمینو گلیکوژیدها و مصرف داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته: سرگیجه، اختلال در تعادل، شنیدن صدای زنگ در گوش، اختلال شنوایی، تهوع، استفراغ، خارش و راش پوستی و نیز اختلال دید و تحریک چشم که ممکن است در اثر مصرف فرآورده های پوستی ایجاد شود.

תداخل های دارویی: داروهایی مانند فوروزماید، وانکومایسین و سفالوسپورین ها می توانند عوارض جانبی جنتامایسین را روی دستگاه شنوایی و کلیه ها تشدید کنند.

صرف در شیردهی و بارداری : فرآورده‌های مخصوصی آن مشکل خاصی در بارداری ایجاد نمی‌کند اما شکل تزریقی آن می‌تواند باعث کاهش شناوی‌ی درجنین شود. در شیردهی نیز فرآورده‌های مخصوصی آن مشکلی ندارد اما در خصوص صرف شکل تزریقی دارو با پزشک مشورت کنید.

Glibenclamide

گلی بن کلامید

نیاز به تعویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضددیابت خوراکی

اشکال دارویی موجود : قرص

میزان خطر در صرف اضافی : بالا

زمان و دفعات صرف : بسته به وضعیت بیمار، قبل از وعده غذایی

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : دارو ظرف ۳ ساعت اثر می‌کند و ۱۵-۱۰ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب : رژیم غذایی کم‌چربی و کم کربوهیدرات (قند) صرف شود.

نحوه تَّعْدَارِی از دارو : دارو در ظرف درسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع صرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک صرف آن را متوقف نکنید - صرف زیادی آن در هر شرایطی اقدامات فوری می‌طلبد اما در صورت ایجاد علایم کاهش قندخون مثل تعریق، سردرد و غش، فوراً غذای محتوی قند یا یک نوشیدنی شیرین صرف کنید و در صورت تشنج یا کاهش هوشیاری، اقدامات اورژانس انجام دهید - صرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد ولی در صورت مشاهده علایم کاهش قندخون، از چنین کارهایی دوری کنید - در صورت داشتن سابقه مشکلات بلندمدت کلیوی یا کبدی، بیماری‌های تیروئید، مشکلات غده آдрنال (فوق کلیه) و نیز سابقه حساسیت به سولفانامیدها و صرف داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - صرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : غش و ضعف، اغتشاش ذهنی، ضعف یا لرز، تعریق، تهوع، استفراغ و تغییرات وزن.

تداخل‌های دارویی : کورتون‌ها، استروژن، دیورتیک‌ها و ریفامپین، اثر این دارو را کاهش داده و قندخون را افزایش می‌دهند - صرف هم‌زمان این دارو با بتابلوکرهای ACE Inhibitors، وارفارین، سولفانامیدها، ضدبacterی‌ها و آسپیرین، خطر کاهش قندخون را تشدید می‌کند.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری به جای این قرص، انسولین تزریق می‌شود زیرا دیابت را بهتر کنترل می‌کند. در شیردهی می‌تواند به داخل شیر ترشح شود اما مقادیر معمولی آن مشکلی ایجاد نمی‌کند اما بهتر است در این مورد با پزشک مشورت کنید.

Gliclazide

کلیکلازید

نیاز به تجویز پزشک: دارد
اشکال دارویی موجود: قرص
زمان و دفعات مصرف: دو بار در روز صبح و عصر همراه غذا
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر می‌کند و ۱۲–۲۴ ساعت در بدن فعال است.

رزیم غذایی مناسب: رژیم غذایی کم چربی و کم کربوهیدرات (قند) برای ایجاد حداقل اثر دارو لازم است. در این مورد با پزشک نیز مشورت کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک، مصرف آن را متوقف نکنید - مصرف اضافی آن در همه موارد نیازمند اقدام فوری است اما در صورت بروز علایم هشداردهنده کاهش قندخون مثل غش، سردرد، تعريق و اغتشاش ذهنی، فوراً غذا یا نوشیدنی شیرینی مصرف کنید و در صورت بروز تشنج یا کاهش هوشیاری، اقدامات اورژانس را انجام دهید - تا از اثرات این دارو بر روی خود آگاهی ندارید، از رانندگی و کارهای حساس بپرهیزید، چون می‌تواند باعث سرگیجه و خواب آلودگی شود - اگر اخیراً دچار ترومما شده‌اید یا مبتلا به عفونت بوده‌اید، اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کلیوی یا کبدی و بیماری‌های تیروئید و یا آدیسون هستید و نیز در صورت حساسیت به داروهای سولفونیل اوره یا داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته: غش، اغتشاش ذهنی، ضعف یا لرز و تعريق که می‌تواند در اثر مصرف کم غذا یا مصرف زیاد این دارو ایجاد شود.

تداخل‌های دارویی: باربیتورات‌ها، کورتون‌ها، آسپیرین و وارفارین، در صورت مصرف همزمان با این دارو می‌توانند باعث افزایش قندخون شوند.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود؛ زیرا باعث کاهش قندخون جنین می‌شود. در بارداری به جای این قرص از انسلولین استفاده می‌شود. در شیردهی می‌تواند وارد شیر شود و باعث کاهش قندخون شیرخوار شود. پس در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Glyceril Trinitrate

کلیسریل تری‌نیترات

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدآنژین

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : تزریقی ، پماد ، قرص‌های زیرزبانی ، چسب‌های پوستی (پچ‌های پوستی) ، اسپری ، قرص‌های کندآزادشونده (SR-tablets) و قرص‌های خوراکی زمان و دفعات مصرف : **جهت ملودی از آنژین :** قرص‌های خوراکی و قرص‌های کندآزادشونده ۳ بار در روز ، پیچ‌ها یک بار در روز و پماد هر ۳-۴ ساعت یک بار — **جهت بهبود حمله آنژینی :** قرص خوراکی یا قرص زیرزبانی یا اسپری ، در آغاز یا هنگام وقوع حملات آنژینی زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر قرص‌های خوراکی ، قرص‌های زیرزبانی و اسپری در چند ساعت و اثر پچ‌های پوستی ، پماد و قرص‌های کندآزادشونده ظرف ۱-۳ ساعت شروع می‌شود .

رژیم غذایی مناسب : قرص‌های دهانی و زیرزبانی باید در ظرف شیشه‌ای کاملاً دربسته و در جای خشک و خنک ، دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شوند . در صورت باز شدن ظرف محتوی قرص ، این قرص‌ها ظرف ۸ هفته خراب می‌شوند . در مورد فرآورده‌های دیگر به برچسب دارو نگاه کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : مصرف آن را بدون مشورت با پزشک متوقف نکنید — مقدار زیاد آن می‌تواند باعث سرگیجه ، استفراغ ، سردرد شدید ، تشنج و کاهش هوشیاری شود که باید سریع به پزشک اطلاع داده شود — تا از اثر این بر روی خودتان آگاه نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید ، چون می‌تواند باعث سرگیجه شود — در صورتی که مبتلا به بیماری‌های قلبی ، بیماری‌های ریوی ، بیماری‌های خونی ، مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و بیماری‌های تیروئید هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید — مصرف بلندمدت آن می‌تواند اثرات آن را کاهش دهد . عوارض ناخواسته : کاهش فشارخون ، سرگیجه ، سردرد و گرگرفتگی .

تداخل‌های دارویی : در صورت مصرف هم‌زمان با داروهای ضدفسارخون ، می‌تواند باعث افت فشارخون و غش شود .

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است و ترشح آن به داخل شیر نیز مشخص نیست . در هر دو مورد با پزشک مشورت شود .

Gold Sodium Thiomalate

کلد سدیم (ملح طلا)

اشکال دارویی موجود در ایران : محلول تزریقی

گروه دارویی : خدروماتیسم

مقدار و روش مصرف : درمان **(ماتیسم مفصلی)** : در هفته اول ۱۰ میلی‌گرم از راه عضلانی ، در هفته دوم ۲۵ میلی‌گرم از راه عضلانی و سپس ۰-۵-۲۵ میلی‌گرم هر هفته تجویز می‌شود تا مجموعه داروی مصرفی به یک گرم برسد .

موارد عمده استعمال دارو : به عنوان داروی همراه در درمان آرتربیت روماتوئید فعال در بزرگسالان و اطفال به کار می‌رود.

عوارض جانبی مهم : سرگیجه، برافروختگی، کندی ضربان قلب، تهوع، استفراغ، یرقان، خون در ادرار، پروتئین در ادرار، خارش گذرا، افتادن ناخن‌ها، رسوب طلا در بافت‌های زنده.

Gripe Mixture

گریپ میکچر

اشکال دارویی موجود در ایران : شربت

گروه دارویی : ضداسپاسم، ضدنفخ

مقدار و روش مصرف : در کودکان بزرگتر از ۲ سال: ۳-۲ قاشق مرباخوری از راه خوراکی - در کودکان ۴ ماه تا دو سال: ۲ قاشق مرباخوری از راه خوراکی - در کودکان ۶-۱ ماهه یک قاشق مرباخوری - در نوزادان یک قاشق چایخوری

موارد عمده استعمال دارو : درمان نفخ، تهوع، درد معده و قولنج، مقوی معده و بادشکن.

عوارض جانبی مهم : عوارض جانبی چندان شایع نیستند. برخی از این عوارض عبارتند از: سردرد شدید، بی‌خوابی، خستگی، سوزش سر دل، کاهش قدرت چشمایی، بی‌اشتهاایی، کهیز و حساسیت به نور.

Griseofulvin

گریزو فولوین

گروه دارویی : ضدقارچ

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص دارای شیار

مقدار و روش مصرف : روزانه ۱-۵/۰ گرم، در چند نوبت (جذب آن همراه با غذاهای چرب بهتر صورت می‌گیرد)

موارد عمده استعمال دارو : بیماری قارچی پوست، مو و ناخن‌ها؛ که به درمان‌های موضعی عادی جواب نمی‌دهد.

عوارض جانبی مهم : اسهال، گیجی، بی‌خوابی، کهیز و بثورات جلدی.

Guaifenesin

کایافنزین

اشکال دارویی موجود در ایران : شربت

گروه دارویی : خلط آور

مقدار و روش مصرف : ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم هر ۳-۴ ساعت یک بار از راه خوراکی

موارد عمده استعمال دارو : به عنوان خلط‌آور در سرفه‌های خشک عوارض جانبی مهم : تهوع ، استفراغ ، ناراحتی گوارشی و خواب‌آلودگی .

Haloperidol

هالوپریدول

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدجنون (دسته بوتیروفنون)

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، تزریقی ، کپسول و دپوت اینجکشن (Depot injection) زمان و دفعات مصرف : ۴ - ۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : شکل خوراکی دارو ۲-۳ ساعت و شکل تزریقی ظرف ۳۰-۲۰ دقیقه اثر می‌کند . مدت فعالیت شکل خوراکی در بدن ۶-۲۴ ساعت و شکل تزریقی ۴-۲ ساعت می‌باشد .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض جانبی شدید مصرف آن را بدون مشورت با پزشک متوقف نکنید - مصرف مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث خواب‌آلودگی ، ضعف یا سفتی ماهیچه و غش شود که باید سریع به پزشک اطلاع داده شود - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس بپرهیزید چون این دارو می‌تواند باعث سرگیجه و کندی عکس‌العمل شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، بیماری‌های قلب و دستگاه گردن خون ، سابقه تشنگ صرعی ، پرکاری تیروئید ، پارکینسون ، گلوکوم ، آسم ، برونشیت و سایر بیماری‌های ریه و نیز بیماری فئوکروموموستیوم و یا مصرف داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث نوعی اختلال حرکتی به نام « تاردیودیسکنزی » شود که عالیمی چون حرکات غیرارادی چشم ، صورت و زبان را ایجاد می‌کند .

عوارض ناخواسته : خشکی دهان ، تاری دید ، اختلال در دفع ادرار ، کاهش اشتها ، خواب‌آلودگی ، کرختی ، سرگیجه و غش . بارزترین عارضه جانبی دارو پارکینسونیزم است .

تداخل‌های دارویی : ریفارمپین و داروهای ضدتشنج اثر این دارو را کاهش می‌دهند - آرامبخش‌ها اثر آرامبخشی دارو را افزایش می‌دهند - این دارو اثر داروهای آنتی کولینرژیک مثل هیوسین را افزایش داده و سبب تشدید عوارض جانبی آن‌ها می‌شود - لیتیم می‌تواند باعث افزایش احتمال پارکینسونیزم توسط این دارو شود - مตیل دوپا خطر پارکینسونیزم و کاهش فشارخون به وسیله این دارو را افزایش می‌دهد .

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری به اثبات نرسیده است و در شیردهی نیز وارد شیر می‌شود لذا در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Hematinic**هماتینیک**

گروه دارویی: خونساز

اشکال دارویی موجود در ایران: کپسول (حاوی: ویتامین C، فومارات آهن، فاکتور داخلی، ویتامین B₁₂ و اسید فولیک)

مقدار و روش مصرف: روزی یک کپسول همراه غذا یا بعد از غذا

موارد عمدۀ استعمال دارو: درمان کم خونی‌های معمولی شامل کم خونی ناشی از کمبود آهن و سوء تغذیه، کم خونی مگالوبلاستیک و کم خونی دوران بارداری.

عوارض جانبی مجم: واکنش‌های حساسیتی و ندرتاً عوارض گوارشی مثل: اسهال یا بیوست.

Heparin lmwh (Low molecular weight heparins)**هپارین**

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدانعقاد

اشکال دارویی موجود: تزریقی

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

زمان و دفعات مصرف: هپارین‌های با مولکول سبک (LMWH) یک بار در روز و آنفوزیون مداوم داخل وریدی هر ۸-۱۲ ساعت

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۱۵ دقیقه اثر می‌کند و ۱۲-۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - اثر مصرف زیادی این دارو را می‌توان با مصرف دارویی به نام پروتامین خنثی کرد که این کار باید توسط پزشک صورت گیرد - اگر مصرف زیادی آن باعث سردرد، خونریزی شدید و یا کاهش هوشیاری شد اقدامات فوری انجام دهید - اگر در حین رانندگی یا انجام کارهای حساس زخمی در بدن شما ایجاد شود، مصرف این دارو می‌تواند باعث خونریزی شدید شود که باید به این موضوع توجه داشته باشید - در صورتی که مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، فشارخون بالا، زخم معده و آرژی هستید و نیز اگر به راحتی دچار خونریزی می‌شوید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت می‌تواند اثر دارو را کاهش دهد و باعث پوکی استخوان و ریزش مو شود.

عوارض ناخواسته: مهم‌ترین عارضه آن خونریزی است.
تداخل‌های دارویی: دی‌پیریدامول و آسپیرین اثر ضدآنعقادی هپارین را افزایش می‌دهند.
صرف در شیردهی و بارداری: در شیردهی اشکالی ایجاد نمی‌کند. در بارداری، در زمان نزدیک زایمان می‌تواند باعث تشدید خونریزی در مادر شود، لذا در این موقعیت باید صرف آن به دقت کنترل شود.

Homatropine HBr هم آتروپین

گروه دارویی: گشادکننده مردمک چشم
اشکال دارویی موجود در ایران: قطره استریل چشمی
مقدار و روش صرف: جهت گشاد شدن مردمک برای معاینات چشمی - درمان حالت التهابی عنیبه و جسم مژگانی و مشیمیه - به عنوان گشادکننده طولانی اثر مردمک.
موارد عمده استعمال دارو: **جهت التهاب عنیبه، جسم مژگانی و مشیمیه:** ۱-۲ قطره، ۳-۲ بار در روز.
جهت گشاد کردن مردمک جهت معاینات: یک قطره هر ۱۵-۱۰ دقیقه در ۵ نوبت.
عوارض جانبی مهم: تحریکات موضعی در صرف بلندمدت، افزایش فشار داخل چشمی، خشکی دهان، ترس از نور، سردرد و خواب آلودگی.

Hydrocortisone هیدروکورتیزون

گروه دارویی: کورتیکواستروئید (کورتون)
نیاز به تجویز پزشک: جز برخی فرآوردهای موضعی دارو، بقیه اشکال دارویی نیاز به تجویز پزشک دارد.
میزان خطر در صرف اضافی: کم
اشکال دارویی موجود: قرص، تزریقی، کرم، پماد، پماد چشمی، قطره چشمی و قرص مکیلنی
زمان و دفعات صرف: بستگی به شرایط بیمار دارد.
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۴ ساعت تا چند روز بعد از صرف اثر می‌کند و تا ۱۲ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب: هنگام صرف دارو به شکل خوراکی ممکن است نیاز به محدود کردن صرف نمک باشد؛ همچنین نیاز به صرف جبرانی پتابسیم دارد.
موارد منع صرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک صرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا صرف مقدار زیادی از دارو، به پزشک اطلاع دهید - صرف آن در رانندگی و

کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورتی که مبتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی، زخم معده، گلوکوم، سل، دیابت و بیماری‌های قلبی هستید و نیز در صورتی که سابقه تشنجه دارید یا از داروهای دیگر استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث دیابت، گلوکوم، شکنندگی استخوان، نازکی پوست و کندی رشد در بچه‌ها شود.

عوارض ناخواسته: سوءهاضمه، افزایش وزن، آکنه، احتباس آب در بدن و افزایش فشارخون - مقدار زیاد دارو می‌تواند باعث ضعف عضلات و تغییر در خلق می‌شود.

تداخل‌های دارویی: این دارو اثر ضددیابت‌ها و ضدفسارخون‌ها را کاهش می‌دهد - ضدتشنج‌ها، باربیتورات‌ها و ریفامپین باعث کاهش اثر این دارو می‌شوند - مصرف این دارو با برخی واکسن‌ها باعث واکنش‌های شدید می‌شود.

مصرف در شیردهی و بارداری: فرآورده‌های موضعی ضرری در بارداری ندارند اما مصرف خوراکی آن می‌تواند آثار نامطلوبی روی جنین بگذارد و در شیردهی می‌تواند به داخل شیر ترشح شود و آثار نامطلوبی روی شیرخوار بگذارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Hyocine هیوسین

گروه دارویی: مورد استفاده در تهوع و استفراغ و سندرم روده تحریک‌پذیر و مؤثر بر مردمک چشم
نیاز به تجویز پزشک: ندارد

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

اشکال دارویی موجود: تزریقی، قرص، قطره چشمی و بیج (چسب) پوستی

زمان و دفعات مصرف: بیچهای پوستی هر ۳ روز یک بار - جهت سندرم روده تحریک‌پذیر شکل خوراکی دارو ۴ بار در روز - جهت تهوع و استفراغ ۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر می‌کند. بیچ پوستی تا ۷۲ ساعت و شکل خوراکی تا ۶ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مصرف زیاد آن می‌تواند باعث آسفتگی و خواب‌آلودگی شود - تا زمانی که از اثر آن بر روی خودتان آگاه نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون هیوسین می‌تواند باعث خواب‌آلودگی و تاری دید شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری‌های قلبی، احتباس ادرار یا مشکلات پروسات و مگاکولون یا انسداد روده و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - معمولاً مصرف بلندمدت آن ضرورت ندارد.

عوارض ناخواسته: خواب آلودگی ، خشکی دهان ، تاری دید ، بیوست ، اختلال در دفع ادرار و تپش قلب .

تداخل‌های دارویی: داروهای اثر آرامبخش ، اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می‌دهند - داروهای آنتی کولینرژیک در صورت مصرف هم‌زمان با این دارو ، آثار جانبی آن مثل خشکی دهان ، تاری دید و بیوست را تشدید می‌کنند .

معرف در شیردهی و بارداری: در شیردهی اشکالی ندارد . در بارداری چون بی‌ضرر بودن آن به اثبات نرسیده باید با پزشک مشورت کنید .

Hydrogen Peroxide

پروکسید هیدروژن (آب اکسیژن)

گروه دارویی: ضد عفونی کننده موضعی
اشکال دارویی موجود در ایران: بالک (Bulk)

مقدار و روش مصرف: به مقدار مورد نیاز از محلول ۳ درصد استفاده می‌شود (محلول غلیظ آن ۳۵ درصد است)

موارد عمده استعمال دارو: ضد عفونی کننده و از بین برندۀ بوی نامطبوع ، تمیز کننده زخم‌ها ، قطره گوشی برای خروج سروم ، دهان‌شویه در استوماتیت حاد

عوارض جانبی مهم: محلول غلیظ آن می‌تواند در روی پوست باعث سوزش و تحریک شود .

Hydroquinone

هیدروکینون

گروه دارویی: بی‌رنگ کننده پوست
اشکال دارویی موجود در ایران: کرم موضعی و لوسيون

مقدار و روش مصرف: لایه نازکی از دارو ، هر ۱۲ ساعت یک بار (صبح و شب) ، روی لکه‌های رنگی مالیده می‌شود .

موارد عمده استعمال دارو: در افتلالات نگدانه‌ای پوست مثل : کک و مک ، کلوآسماء ، ملاسماء و لنتیگوی منتشر دوران پیری - جهت سفید کردن تدریجی و از بین بردن لکه‌ها .

عوارض جانبی مهم: خشکی نواحی اطراف بینی و زیر حدقه چشم ، قرمزی ، احساس سوزن سوزن شدن ناحیه ، تحریک پوست ، احساس گرش و سوزش در پوست .

Hydroxychloroquine Sulfate

هیدروکسی کلروکین

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص

گروه دارویی: ضد مalaria ، ضد التهاب

مقدار و روش مصرف: جهت درمان (وماتیسم) : ۶۰۰ - ۴۰۰ میلی گرم در روز . به عنوان دوز نگهدارنده در (وماتیسم مفصلی) : ۴۰۰ - ۲۰۰ میلی گرم در روز . جهت درمان لوپوس : ۴۰۰ میلی گرم ، ۲ - ۱ بار در روز .
موارد عمده استعمال دارو: پیشگیری و درمان حملات حاد مالاریا ، درمان آرتربیت روماتوئید (روماتیسم مفصلی) ، درمان لوپوس ارتمیاتوز .

عوارض جانبی مهم: تشنج ، سرد درد ، فلنج عضلات خارجی چشم ، اختلالات دید ، دید مه آلود ، اشکال در خواندن و نوشتن ، وزوز گوش ، پایین آمدن فشارخون ، بی رنگ شدن مو و رنگی شدن پوست و مخاط .

Hydroxyzine HCL

هیدروکسیزین

گروه دارویی: ضد خارش ، ضد استفراغ ، ضد اضطراب ، آنتی هیستامین
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش دار ، شربت و آمپول

مقدار و روش مصرف: در درمان اضطراب : ۱۰۰ - ۲۵ میلی گرم از راه خوراکی ۴ - ۳ بار در روز یا ۲۵ - ۱۰۰ میلی گرم از راه عضلانی ، هر ۶ - ۴ ساعت یک بار . در درمان هاش : ۲۵ میلی گرم از راه خوراکی ۴ - ۳ بار در روز یا ۲۵ میلی گرم از راه عضلانی هر ۶ - ۴ ساعت یک بار .

موارد عمده استعمال دارو: تسکین اضطراب ، کنترل تهوع و استفراغ و درمان خارش ناشی از آرژی .
عوارض جانبی مهم: سرگیجه ، خشکی دهان ، کاهش فشار ، سرد درد ، لرز ، کهیر و خس خس سینه .

Ibuprofen

ایبوپروفن

گروه دارویی: ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)

نیاز به تجویز پزشک: ندارد
میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: قرص ، کپسول ، مایع ، کرم ، ژل و قرص کند آزادشونده (SR - tab)
زمان و دفعات مصرف: ۴ - ۳ بار در روز همراه با غذا برای درمان آرتربیت - قرص های کند آزادشونده ۲ - ۱ بار در روز برای تسکین درد

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر ضد درد ظرف ۱ - ۲ ساعت ظاهر می شود و اثر ضد التهاب آن به دو هفته وقت نیاز دارد . دارو ۱۰ - ۵ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورتی که از آن برای تسکین درد استفاده می کنید هر وقت بخواهید می توانید مصرف آن را متوقف کنید اما در صورتی که برای درمان آرتربیت از آن استفاده می کنید ، جز

در صورت بروز دانه‌های پوستی ، خس خس سینه و اشکالات تنفسی ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - استفاده از آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، فشارخون بالا ، ازوفاژیت یا زخم معده و نیز در صورت حساسیت به آسپیرین یا استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - اثر مصرف بلندمدت این دارو در ایجاد خونریزی معده و روده ، کم اما حتمی و جدی است .

عوارض ناخواسته : شایع‌ترین عوارض جانبی دارو اختلالات گوارشی مانند : سوزش سردل ، تهوع و استفراغ هستند . اگر مدفوع تان سیاه رنگ بود ، بی‌درنگ پزشک را مطلع سازید .

تداخل‌های دارویی : مصرف هم‌زمان این دارو با داروهایی مثل آسپیرین و خداناعقادهای خوراکی می‌تواند خطر خونریزی در معده و روده را افزایش دهد - آین دارو می‌تواند اثر مفید داروهای دیورتیک و ضدفسارخون را کاهش دهد - سیپروفلوکسازین و آنتی‌بیوتیک‌های مشابه همراه با این دارو خطر تشنج را افزایش می‌دهند - این دارو می‌تواند سطح لیتیم و متوترکسات را در خون افزایش دهد .

معرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود؛ زیرا روی جنین اثر گذاشته و باعث طولانی شدن زایمان می‌شود اما مصرف مقادیر کم دارو در شیردهی اشکالی ندارد .

Imipramine ایمیپرامین

گروه دارویی : ضدافسردگی سه حلقه‌ای که برای برخی بیماری‌های دستگاه ادراری مثل شب ادراری تجویز می‌شود .

میزان خطر در مصرف اضافی : بالا

نیاز به تجویز پزشکه : دارد

زمان و دفعات مصرف : ۱-۴ بار در روز

اشکال دارویی موجود : قرص و مایع

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : برخی آثار آن ظرف چند ساعت ظاهر می‌شود اما آثار کامل آن زودتر از ۲-۵ هفته بعد از شروع مصرف بروز نمی‌کند . آثار بلندمدت دارو تا ۶ هفته بعد از قطع مصرف دارو باقی می‌ماند اما عوارض جانبی آن ظرف چند روز بعد از توقف مصرف دارو عمدتاً ناپدید می‌شوند .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - گرچه در همه موارد مصرف اضافی این دارو اقدامات جدی لازم است اما در صورت کاهش هوشیاری حتماً باید اقدامات پزشکی اورژانس انجام گیرد - تا از اثر این دارو بر روی خودتان مطلع نیستید ، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون این دارو می‌تواند باعث تاری دید و کاهش

دقت و هوشیاری شود - در صورتی که مبتلا به مشکلات قلبی ، مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، تشنج صرعی ، گلوکوم . بیماری‌های پروستات و مانیا هستید و اگر از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن به صورت بلندمدت اشکالی ندارد اما در درمان شب ادراری در کودکان نباید بیش از سه ماه تجویز شود .

عوارض ناخواسته : تعریق ، گرگرفتگی ، خشکی دهان ، یبوست ، اختلال در دفع ادرار ، صرع در ابتدای درمان ، تاری دید ، سرگیجه و خواب آلودگی .

تداخل‌های دارویی : امکان تداخل شدید بین مهارکننده‌های منوامینوکسیداز MOAIs با این دارو وجود دارد - مصرف هم‌زمان آن با سوتالول و آمیودارون باعث افزایش خطر بی‌نظمی در ریتم قلب می‌شود - دارو ممکن است اثر آرامبخش‌ها را افزایش و اثر ضدفسارخون‌ها را کاهش دهد - این دارو ، می‌تواند سطح خونی فنی‌توئین را افزایش دهد .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن دارو در بارداری ، به اثبات نرسیده است و مصرف مقداری معمولی آن در شیردهی اشکالی ندارد . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Indomethacine

ایندومتاسین

گروه دارویی : ضدالتهاب غیراستروئیدی ، ضدتب ، ضددرد غیر مخدر
اشکال دارویی موجود در ایران : شیاف ، کپسول و قرص
مقدار و روش مصرف : برای تسکین داد : یک شیاف ۱۰۰ میلی‌گرم هنگام خواب . درمان (روماتیسم)
مفصلی : ۲۵ میلی‌گرم هر ۸-۱۲ ساعت یک بار . درمان التهاب ماد مفصلی همراه با نقرس : ۵۰ میلی‌گرم هر ۸ ساعت یک بار
موارد عمده استعمال دارو : درمان روماتیسم مفصلی حاد و مزمن ، درمان آرتروز ، التهاب حاد مفصلی ناشی از نقرس .

عوارض جانبی مهم : تهوع ، سوء‌هضم ، ترش کردن ، اسهال ، بی‌اشتهایی ، زخم معده و روده ، خونریزی از راست روده ، تشنج ، اختلال شنوایی و طیش قلب .

Indoramin

ایندورامین

گروه دارویی : ضدفسارخون و مورد استفاده در درمان احتباس ادرار
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط
نیاز به تجویز پزشک : دارد

اشکال دارویی موجود : قرص

زمان و دفعات مصرف : برای درمان فشارخون ۲-۳ بار در روز و برای درمان احتباس ادرار ۱-۲ بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : دارو ظرف یک ساعت اثر می‌کند و ۱۲-۶ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون موافقت پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقدار زیاد این دارو می‌تواند باعث تشنج شود که باید سریع پزشک را در جریان قرار دهید - تا از اثر آن بر روی خودتان مطلع نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود - اگر مشکل کبدی یا کلیوی دارید، اگر به بیماری پارکینسون مبتلا هستید، اگر مبتلا به صرع و نارسایی قلبی هستید یا سابقه افسردگی دارید و نیز در صورت استفاده از داروهای گروه MAOIs (مهارکننده‌های آنزیم مونوآمین‌اکسیداز) یا داروهای دیگر، پزشک را مطلع نمائید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : خستگی، احتقان بینی، خشکی دهان، سردرد و خواب آلودگی.

تداخل‌های دارویی : ضدافسردگی‌ها، بتابلوکرها و بلوک‌کننده‌های کانال کلسیم، دیورتیکها و تیموکسامین اثر ضدفشارخون این دارو را کاهش می‌دهند.

معرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن دارو در شیردهی و بارداری ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Insulin انسولین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی : ضددیابت

میزان خطر در مصرف اضافی : بالا

اشکال دارویی موجود : تزریقی و پمپ انفوریون

زمان و دفعات مصرف : ۱-۴ بار در روز. انسولین کوتاه اثر معمولاً ۱۵-۳۰ دقیقه قبل از غذا تزریق می‌شود.
 زمان مناسب برای تزریق فرآورده‌های بلند اثر انسولین، براساس نیاز شخص تنظیم می‌شود.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : فرآورده‌های کوتاه اثر ظرف ۶۰-۳۰ دقیقه و فرآورده‌های بلند اثر و میان اثر ظرف ۱-۲ ساعت شروع به فعالیت می‌کنند که فرآورده‌های کوتاه اثر ۶-۸ ساعت، فرآورده‌های میان اثر ۱۸-۲۶ ساعت و فرآورده‌های بلند اثر ۲۸-۳۶ ساعت در بدن فعال هستند.

رزیم غذایی مناسب : رژیم غذایی با قند و کربوهیدرات کم توصیه می‌شود.

نحوه نگهداری از دارو : دارو در یخچال نگهداری شود. از يخزدگی محافظت شود و به دستورات درج شده روی برچسب دارو توجه شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون موافقت پزشک مصرف آن را متوقف نکنید چون ممکن است باعث اغما یا اغتشاش ذهنی شود - مصرف اضافی آن در هر شرایطی نیازمند توجه جدی است اما در صورت بروز علایم کاهش قندخون مثل : غش ، گرسنگی ، تعریق و لرز ، خوردنی یا نوشیدنی شیرینی بخورید که البته بهترین ماده ، عسل است و نیز در صورت بروز تشنج یا کاهش هوشیاری اقدامات اورژانس انجام دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد اما در صورت بروز علایم کاهش قندخون ، از چنین کارهایی دوری کنید - در صورت داشتن سابقه حساسیت به انسولین یا استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید .

عوارض ناخواسته : تعریق ، ضعف ، سرگیجه و اغتشاش ذهنی .

تداخل‌های دارویی : آنتی‌بیوتیک‌ها ، داروهای گروه MAOIs و ضددیابت‌های خوراکی ، خطر کاهش قندخون را افزایش می‌دهند - کورتون‌ها و دیورتیک‌ها با اثر ضد قند انسولین مقابله می‌کنند - بتابلوکرها ، برخی علایم قندخون را کاهش می‌دهند .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در هر دو مورد دقت و کنترل بیشتری لازم است .

IodochlorhydroxyQuin

یدوکلرهیدروکسی کین

گروه دارویی : ضدقارچ ، ضدآمیب

اشکال دارویی موجود در ایران : کرم موضعی و قرص

مقدار و روش مصرف : موقعي : ۴ - ۲ بار در روز روی موضع مالیده می‌شود . فوارکی در درمان عفولت آمیبی (وده) : ۲۵۰ میلی‌گرم ۶ - ۳ بار در روز به مدت ۱۰ روز

موارد عدمه استعمال دارو : عفونت‌های قارچی پوست - عفونت آمیبی روده

عوارض جانبی مهم : ناراحتی شکم ، اسهال ، سبز شدن رنگ زبان و ادرار و مدفعه ، از دست دادن بینایی .

Iodoquinol

یدوکینول

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص

گروه دارویی : ضدآمیب ، ضدتک‌یاخته

مقدار و روش مصرف : درمان عفولت آمیبی (وده) : ۶۳۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ، هر ۸ ساعت به مدت ۲۰ روز که پس از ۳ - ۲ هفته دوره درمان مجدد تکرار می‌شود .

موارد عمده استعمال دارو : درمان عفونت آمیبی روده ، درمان ناقلان بدون علامت کیستهای آمیبی و درمان اسهال مسافران .

عوارض جانبی مهم : سردرد ، سرگیجه ، آسیب‌دیدگی اعصاب محیطی ، درد عضلات ، تاری دید ، از بین رften بینایی ، التهاب عصب بینایی و تغییر رنگ مو و ناخن‌ها .

Iron Dextran Complex

کمپاکس آیرن دکستران

گروه دارویی : ضد کم خونی
اشکال دارویی موجود در ایران : آمپول

موارد عمده استعمال دارو : در مواردی که کم خونی مشخص شده و درمان‌های خوراکی موثر یا کافی نیست از این ترکیب استفاده می‌شود .

عوارض جانبی مهم : سردرد ، سرگیجه ، کما ، برافروختگی عروق محیطی ، بی‌نظمی‌های قلبی کشنده ، احساس طعم فلزی ، اسهال ، درد شکمی ، درد عضلانی ، درد مفصلی ، هموسیدروز ، درد در محل تزریق عضلانی و آسیب کبدی .

Isoniazid

ایزو‌نیازید

گروه دارویی : ضدسل
نیاز به تجویز پزشک : دارد
میزان خطر در مصرف اضافی : بالا
اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع و تزریقی
زمان و دفعات مصرف : معمولاً یک بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : بعد از ۲-۳ ساعت اثر دارو شروع می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب : این دارو ممکن است باعث کاهش سطح پیریدوکسین (ویتامین ۶B) در بدن شود ؛ لذا نیاز به مصرف جبرانی ویتامین ۶B می‌باشد .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض شدید ، دوره درمان را کامل کنید - در صورت بروز اختلال تنفسی ، تشنج و کاهش هوشیاری ناشی از مصرف مقدار زیاد این دارو ، اقدامات اورژانس انجام دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مشکل بلندمدت کبدی یا کلیوی و سابقه ضایعه کبدی ناشی از مصرف ایزو‌نیازید در گذشته دارید و اگر با داروی خاصی مشکل دارید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید یا به الکل عادت دارید ، پزشک را در

جريان قرار دهيد - مصرف بلندمدت آن می‌تواند ضایعات کبدی را افزایش دهد یا با ایجاد کمبود ویتامین B₆ باعث ضایعات عصبی شود.

عوارض ناخواسته: احتمال ضایعات کبدی و عصبی، استفراغ، تهوع، خستگی و راش پوستی.

تداخل‌های دارویی: این دارو اثر داروهای ضدتشنج را تشدید می‌کند - ضداسیدها جذب این دارو را کم می‌کنند - مصرف هم‌زمان ریفارمین یا الکل همراه این دارو، احتمال ضایعات کبدی را افزایش می‌دهد.

مصرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است. در شیردهی می‌تواند به داخل شیر ترشح شود و تأثیراتی روی شیرخوار داشته باشد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

ایزوسورباید دی‌نیترات / مونونیترات

Isosorbide dinitrate / mononitrate

گروه دارویی: ضدآرثیں و گشادکننده عروق از دسته نیترات‌ها

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط **نیاز به تجویز پزشک:** دارد

اشکال دارویی موجود: قرص‌های بلعیدنی، جویدنی و زیرزبانی‌دی‌نیترات، تزریقی، اسپری، قرص کندآزادشونده و کپسول کندآزادشونده دی‌نیترات. ترکیب مونونیترات نیز به صورت قرص کندآزادشونده و کپسول کندآزادشونده عرضه می‌شود.

زمان و دفعات مصرف: برای تسکین حمله آرثیں، قرص‌های جویدنی یا زیرزبانی یا اسپری، متناسب با نیاز مصرف می‌شوند - برای جلوگیری از آرثیں ۲-۴ بار در روز از این دارو استفاده می‌شود و نباید دارو را دیرتر از ساعت ۶ بعد از ظهر به مریض داد.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: در صورت جویده شدن یا زیر زبان گذاشتن قرص یا استفاده از اسپری اثر دارو ظرف ۲-۳ دقیقه و در صورت بلعیدن قرص یا کپسول ظرف ۳۰ دقیقه اثر دارو ظاهر می‌شود.

رژیم غذایی مناسب: دارو در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک، دور از دسترس اطفال و دور از نور نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقدار زیاد آن می‌تواند باعث سردد یا سرگیجه شود که باید به پزشک اطلاع دهید - تا از اثر این دارو بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - در صورت

ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، آنمی یا دیگر بیماری‌های خونی ، گلوکوم ، فشارخون پایین ، کم کاری تیروئید ، داشتن سابقه حمله قلبی و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - اثرات آن در مصرف بلندمدت کاهش می‌یابد .

عوارض ناخواسته : گرگرفتگی و سردرد شایع است . جدی‌ترین عارضه آن کاهش فشارخون است که می‌تواند باعث سرگیجه ، ضعف و غش شود که باید در این موارد به پزشک اطلاع دهید .

تداخل‌های دارویی : مصرف این دارو همراه با سایر داروهای ضدفسارخون می‌تواند باعث تشديد اثر ضدفسارخون این داروها شود .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در شیردهی و بارداری ثابت نشده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Isotretinoin

ایزوترتینوئین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدآکنه

اشکال دارویی موجود : ژل و کپسول

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : ۱-۲ بار در روز - کپسول‌ها همراه شیر یا غذا میل شوند .

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۲-۴ هفته اثر دارو شروع می‌شود . آثار دارو چند هفته بعد از قطع مصرف آن در بدن باقی می‌مانند .

نحوه توجهداری از دارو : دارو را در ظرف دربسته ، جای خشک و خنک ، دور از نور و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقادیر زیاد این دارو می‌تواند باعث سردرد ، دل درد ، استفراغ ، ناهماهنگی ، سرگیجه و قرمزی پوست شود که باید به پزشک اطلاع دهید - تا از اثر آن بر روی خودتان مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس بپرهیزید چون این دارو می‌تواند در تاریکی یا نور ضعیف ، باعث اختلال در بینایی شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، آرتربیت ، دیابت ، نقرس و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - معمولاً مصرف بیش از ۱۶ هفته تجویز نمی‌شود اما مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث افزایش چربی خون و در نتیجه عوارض نامطلوب روی قلب و عروق شود .

عوارض ناخواسته : خشکی دهان و بینی و چشم ، تورم لب‌ها و فلسفی شدن پوست ، تغییرات خلقی ، درد عضله‌ها و ماهیچه‌ها و ریزش یا رویش بیشتر موها .

تداخل‌های دارویی: مصرف هم‌زمان تتراسیکلین و ترتینوئین باعث تغییر در فشار مایع مغزی نخاعی شده و موجب سردرد می‌شود - مصرف هم‌زمان ترتینوئین و فرآورده‌های خشک کننده پوست مانند: صابون‌ها و ضدآکنه‌ها می‌تواند باعث خشکی و تحریک پوست شود - ویتامین A می‌تواند اثر جانبی ترتینوئین را افزایش دهد.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود. در شیردهی به داخل شیر ترشح می‌شود. در این مورد با پزشک مشورت کنید.

Ketoconazole

کتوکونازول

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: خطرهای ضدقارچ

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

اشکال دارویی موجود: قرص، مایع، کرم و شامپو

زمان و دفعات مصرف: فوارگی: یک بار در روز (همراه غذا) - ۵۰۰ میکروگرم - ۱ بار در روز - شامپو:

۲ - ۱ بار در هفته

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثرات آن چند ساعت بعد از مصرف شروع می‌شود اما اثر کامل آن ممکن است بعد از چند روز ظاهر گردد. این دارو ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: دوره درمان را کامل کنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت داشتن مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، ابتلا به پوروفیری، سابقه حساسیت به داروهای خطرهای ضدقارچ یا استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - در صورت مصرف بیش از ۱۴ هفته، خطر آسیب‌های کبدی افزایش می‌یابد.

عوارض ناخواسته: تهوع، استفراغ، دل درد و سردرد. ضایعه کبدی نیز به ندرت ممکن است ایجاد شده و منجر به یرقان گردد.

تداخل‌های دارویی: اگر ضداسیدها، سایمتدین، رانی‌تیدین و فنی‌توئین ظرف دو ساعت قبل یا بعد از این دارو مصرف شوند، اثر آن را کاهش می‌دهند - این دارو، اثر آرامبخش‌ها و وارفارین را افزایش می‌دهد - مصرف آن همراه با سیمواتستین، خطر آسیب‌دیدگی عضلانی را افزایش می‌دهد.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود چون باعث ایجاد نقایصی در جنین می‌شود. این دارو می‌تواند وارد شیر شده و روی شیرخوار اثر گذارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Lactulose

لاكتولوز

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

گروه دارویی: مسهل

اشکال دارویی موجود: مایع و پودر

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: در نارسایی کبد ۳-۴ بار در روز - در بیوست ۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۲۴-۴۸ ساعت اثر آن شروع می‌شود و ۱۸ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب: بیمار روزی ۸ لیوان آب همراه با مصرف این دارو بنوشد.

موارد منع مصرف و احتیاط: در درمان بیوست هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به عدم تحمل لاكتولوز و شکم‌درد شدید و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته: عوارضی مانند نفخ شکم، اتساع شکم، تهوع و کرامپ معده به ندرت ایجاد می‌شوند. اگر دچار اسهال شدید نشانه بالا بودن دوز دارو است.

تداخل‌های دارویی: دارو با مسالازین تداخل ایجاد می‌کند و باعث کاهش آزاد شدن آن در موضع فعالیتش می‌شود.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی اشکالی ایجاد نمی‌کند.

Lamotrigine

لاموتریزین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدتشنج

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

اشکال دارویی موجود: قرص و قرص‌های قابل پخش شدن (Dispersible tablets)

زمان و دفعات مصرف: ۱-۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: با دوز ثابت آثار آن تا ۵ روز ظاهر می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: مصرف آن را بدون مشورت با پزشک متوقف نکنید - مقدار زیاد آن می‌تواند باعث تهوع، او بین رفتن هماهنگی عضلات، دویینی و استفراغ شود که باید با پزشک خود

مشورت کنید - عوارض جانبی این دارو همراه با بیماری اصلی شما (تشنج) ، امکان انجام کارهای حساس و رانندگی را منتفی می‌سازد - در صورتی که مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، تالاسمی و بیماری‌های قلبی هستید و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : دانه‌های پوستی (راش) ، تهوع ، سردرد ، خستگی ، بی‌خوابی ، تاری دید ، دوبینی ، آشفتگی ، اغتشاش ذهنی و ضعف ماهیچه‌ها .

داخل‌های دارویی : والپروات سدیم اثر این دارو را طولانی‌تر می‌کند - این دارو اثر کاربامازین را افزایش می‌دهد - فنی‌توئین و فنوباریتال سطح خونی این دارو را کاهش می‌دهند .

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری و شیردهی ثابت نشده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت شود .

Lansoprazole

لانزوپرازول

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدزخم معده

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : کپسول و سوسپانسیون خوراکی

زمان و دفعات مصرف : ۱-۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو ظرف ۱-۲ ساعت بروز می‌کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب : رژیم غذایی خاصی توصیه نمی‌شود اما الکل و غذاهای پرادویه باعث بدتر شدن بیماری اصلی می‌شوند .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز دانه‌های پوستی ، خارش ، خس خس سینه و اشکال در تنفس ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو ، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به بیماری کبدی یا مصرف داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : سردرد ، خستگی ، سرگیجه ، سوءهاضمه ، نفخ‌شکم ، شکم‌درد ، اسهال و بیوست .

داخل‌های دارویی : این دارو ، اثر فنی‌توئین ، ضدبارداری‌های خوراکی ، وارفارین و تئوفیلین را کاهش می‌دهد . سوکرalfat و آنتی‌اسیلها می‌توانند جذب این دارو را کاهش دهند ، لذا نباید همزمان با آن مصرف کنید .

صرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن دارو در بارداری و شیردهی ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Levamisole لوامیزول

گروه دارویی : محرک دستگاه ایمنی بدن، ضدکرم
اشکال دارویی موجود در ایران : قرص پوشش‌دار و شربت
مقدار و روش صرف : درمان آلودگی به آسکاریس: ۱۵۰ - ۱۲۰ میلی‌گرم از راه خوراکی به صورت تک دوز. درمان آلودگی به گرم‌های قلاب‌دار: روزانه ۵ - ۲/۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن از راه خوراکی به مدت ۳ - ۲ روز
موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان کرم‌های قلاب‌دار و آسکاریس، به عنوان محرک دستگاه ایمنی در موارد اختلال پاسخ دستگاه ایمنی.

عوارض جانبی مهم : بی‌اشتهاایی، اسهال، خستگی، تب، قرمزی و پوسته پوسته شدن پوست، آسیب‌دیدگی اعصاب محیطی، کم‌خونی متوسط تا شدید، استفراغ و دانه‌های پوستی.

Levodopa لودوپا

نیاز به تجویز پزشک: دارد
گروه دارویی : ضدپارکینسون
میزان خطر در صرف اضافی : متوسط
اشکال دارویی موجود : قرص و کپسول
زمان و دفعات صرف : ۳-۶ باز در روز همراه با غذا یا شیر
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف یک ساعت دارو اثر می‌کند و ۱۲-۲ ساعت در بدن فعال است.

نحوه تَّعْدِيَة از دارو : دارو را در ظرف درسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع صرف و احتیاط : جز در صورت وقوع تپش قلب بدون مشورت با پزشک صرف آن را متوقف نکنید - صرف زیاد این دارو می‌تواند باعث استفراغ و خواب آلودگی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - ابتلا به پارکینسون و عوارض دارو اجازه رانندگی و کارهای حساس را به شخص نمی‌دهد - در صورت ابتلا به مشکلات قلبی، مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری‌های ریوی مثل آسم و برونشیت، پرکاری

تیروئید ، دیابت ، زخم معده ، گلوكوم ، بیماری‌های روانی جدی ، ملانوم بدخیم و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - در صورت مصرف بلندمدت ، اثرات آن کاهش می‌یابد .

عوارض ناخواسته : اختلالات گواراشی ، حرکات غیرعادی ، آشفتگی و حالت عصبی ، سرگیجه ، غش ، اغتشاش ذهنی و خواب‌های آشفته .

تداخل‌های دارویی : خدجنون‌ها و مصرف زیاد پیریدوکسین ، اثر این دارو را کاهش می‌دهند . این دارو با داروهای ضدافسردگی گروه مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز MAOIs تداخل کرده و منجر به افزایش خطر فشارخون می‌شود . آهن می‌تواند جذب لودوپا را کاهش دهد .
مصرف در شیردهی و بارداری : کمتر ممکن است چنین ضرورتی پیش بیاید .

Levofloxacin لوفلوكساسین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدباکتری
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : قرص‌ها بسته به نوع عفونت ۱-۲ بار در روز و به مدت ۷-۱۴ روز تجویز می‌شوند .
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف یک ساعت اثر دارو شروع می‌شود و ۱۲-۲۴ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : دوره درمان را کامل کنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث اختلالات روانی یا تشنج شود - تا زمانی که از اثر آن بر روی خودتان مطلع نیستید ، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه ، خواب‌آلودگی ، اختلالات بینایی و توهمند شود - در صورت ابتلا به بیماری‌های کلیوی ، صرع ، کمبود آنزیم گلوکز فسفاتاز دهیدروژناز (G6PD) و نیز استفاده از آسپیرین یا مصرف داروی دیگری از گروه NSAID ها ، سابقه حساسیت به گروه دارویی کینولون‌ها ، سابقه التهاب تاندون‌ها در اثر مصرف کینولون‌ها و استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو معمولاً به صورت بلندمدت تجویز نمی‌شود .

عوارض ناخواسته : تهوع ، استفراغ ، شکم‌درد ، اسهال ، سرگیجه ، سرد درد ، ناآرامی ، خواب‌آلودگی و راش‌های پوستی .

تداخل‌های دارویی : اگر تئوفیلین یا ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی NSAIDs همراه با این دارو مصرف شوند احتمال تشنج را افزایش می‌دهند . این دارو اثر ضدانعقادها را افزایش می‌دهد .

آنتی اسیدها ، سوکرالفات ، آهن و روی جذب این دارو را کاهش می‌دهند . در مصرف هم‌زمان دارو ب سیکلوسپورین ، خطر آسیب‌های کلیوی افزایش می‌یابد .

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن این دارو در شیردهی و بارداری ثابت نشده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Levonorgestrel

لوُنورژستِرِل

گروه دارویی : هورمون جنسی زنانه و ضدبارداری خوراکی

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

نیاز به تجویز پزشک : دارد

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز

اشکال دارویی موجود : قرص

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو ظرف ۴ ساعت شروع می‌شود . اثر ضدبارداری دارو ۲ هفته طول می‌کشد . دارو ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید اما در صورت مصرف آن برای درمان علایم یائسگی ، بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکل کبدی ، نارسایی قلبی ، فشارخون بالا ، دیابت ، خونریزی غیرعادی و نامشخص از رحم ، سابقة حملة مغزی ، لخته شدن خون و سابقة میگرن و سردرد شدید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : بی‌نظمی در قاعده‌گی به صورت لکه‌بینی بین دوره‌های قاعده‌گی ، احتباس مایع در بدن که خود را به صورت ورم پا ، مج پا و افزایش وزن نشان می‌دهد ، استفراغ و حساسیت پستان‌ها .

تداخل‌های دارویی : ضدتشنج‌ها ، ضدسل‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند اثر ضدبارداری این دارو را تضعیف کنند . آثار مفید داروهایی مانند برومکریپتین ، ضدانعقادهای خوراکی ، ضدتشنج‌ها ، ضددیابت‌ها و ضدفسارخون‌ها می‌توانند تحت تأثیر این دارو قرار گیرند .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود . در شیردهی مصرف با مقادیر معمولی اشکالی ندارد ، در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

(Levothyroxine Na (T₄

لوُتیروکسین

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص

گروه دارویی : هورمون تیروئید (T4)

مقدار و روش مصرف: دوز مقدماتی ۱/۰ میلی‌گرم یک بار در روز تجویز می‌شود و به تدریج بر مقدار آن (هر ۳-۱ هفته ۱/۰-۰/۵ میلی‌گرم) افزوده می‌شود تا مقدار دلخواه به دست آید .

موارد عمدۀ استعمال دارو: به عنوان جانشین هورمون تیروئید در موارد کمبود این هورمون تجویز می‌شود .

عوارض جانبی مهم: تحریک‌پذیری ، عصبی شدن ، بی‌خوابی ، لرز ، طپش و بی‌نظمی قلب ، آنژین صدری ، افزایش فشارخون ، تهوع ، تغییر در اشتها ، بی‌نظمی قاعده‌گی ، کاهش وزن ، تب و ریزش موقت مو در کودکان .

Lidocaine

لیدوکائین (با نام تجاری کزیلوکائین)

گروه دارویی: بی‌حس کننده موضعی - مخاطی

اشکال دارویی موجود در ایران: پماد موضعی ، اسپری موضعی ، ژل ، محلول موضعی

مقدار و روش مصرف: دوز مصرفی برای بی‌حسی موضعی به عوامل مختلفی مثل سن و سطح بدن بستگی دارد اما حدأکثر دوز مصرفی در بالغین با وزن متوسط ۷۵ کیلوگرم ، نباید از ۲۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد .

موارد عمدۀ استعمال دارو: برای تسکین خارش‌های خیلی سخت ، به منظور ایجاد بی‌حسی در غشاء مخاطی (حلق ، مری ، حنجره ، نای) ، قبل از سوندگذاری .

Lidocaine HCL

لیدوکائین

گروه دارویی: ضدآریتمی ، بی‌حس کننده موضعی **اشکال دارویی موضعی:** اشکال دارویی موضعی

مقدار و روش مصرف: در آریتمی‌های قلبی (بی‌نظمی‌های قلبی) : ۰-۱۰۰ - ۵۰ میلی‌گرم از راه وریدی با سرعت ۵۰ - ۲۰ میلی‌گرم در هر دقیقه تجویز می‌شود و این دوز هر ۵ دقیقه تکرار می‌شود .

موارد عمدۀ استعمال دارو: کنترل آریتمی‌های بطنی که در خلال سکته قلبی ، جراحی قلب و کاتتریزاسیون قلبی روی می‌دهند - بی‌حس کننده سطحی .

عوارض جانبی مهم: خواب‌آلودگی ، سرگیجه ، سرخوشی ، بی‌حسی لبها یا زبان ، اشکال در تنفس یا بُل ، کاهش ضربان قلب ، ایست قلبی ، وزوز گوش ، دویینی ، بی‌اشتهاای و حساسیت مفرط به این دارو .

Lindane (Gamma Benzene Hexachloride)

لیندان

اشکال دارویی موجود در ایران: لوسيون و شامپو

گروه دارویی: ضد جرب ، ضد شپش

مقدار و روش مصرف : لایه نازکی از لوسيون را به تمامی نواحی بدن به جز صورت بمالید و سپس لوسيون ر ۸ ساعت بعد از روی پوست بشوئید. شامپو پس از ۵ دقیقه به طور کامل از روی مناطق شسته شود.

موارد عدم استعمال دارو : جهت درمان آلوودگی به شپش و جرب و از بین بردن تخم‌های آن‌ها تجویز می‌شود.

عوارض جانبی مهم : آنمی‌آپلاستیک و سایر مشکلات خونی، سرگیجه، تهوع، استفراغ و بثورات اگزمازی.

Lisinopril لیزینوپریل

گروه دارویی : گشادکننده عروق (از دسته مهارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE))

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط نیاز به تجویز پزشک : دارد

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز اشکال دارویی موجود : قرص

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : بعد از ۱-۲ ساعت آثار دارو شروع می‌شود و ۱۲-۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز عوارض شدید مصرف آن را متوقف نکنید - مصرف اضافی آن می‌تواند باعث سرگیجه و غش شود - قبل از آگاهی از اثر این دارو بر روی خودتان از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث غش و سرگیجه شود - در صورت ابتلا به آرژی شدید، مشکلات بلندمدت کلیوی، بیماری عروق کرونر و بیماری عروق محیطی و نیز در صورت داشتن رژیم غذایی کم نمک و استفاده از داروهای دیگر یا داشتن حساسیت به گروه دارویی ACE inhibitors، پزشک را در جریان قرار دهد - مصرف بلندمدت لینرینوپریل، به ندرت ممکن است باعث تغییر در سلول‌های خونی یا آسیب‌های کلیوی شود.

عوارض ناخواسته : سرگیجه، تهوع، سرد درد و سرفه خشک و مقاوم.

تداخل‌های دارویی : مصرف دارو همراه با دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم، سیکلوسپورین و داروهای حاوی پتاسیم می‌تواند باعث بالا رفتن سطح پتاسیم خون شود. این دارو اثر انسولین و داروهای ضددیابت و سطح خونی لیتیم را افزایش می‌دهد - داروهای کاهنده فشارخون، اثر لیزینوپریل را تشدید می‌کنند - ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی اثر این دارو را افزایش می‌دهند - برخی ضدالالتهاب‌های غیراستروئیدی (NSAIDs) در صورت مصرف همزمان با این دارو اثر آن را کاهش داده و خطر آسیب‌های کلیوی را افزایش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود. در شیردهی با مقادیر معمولی آن مشکلی ایجاد نمی‌گردد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Lofepramine**لوفپرامین**

نیاز به تجویز پزشک : متوسط

گروه دارویی : ضدافسردگی سه حلقه‌ای

اشکال دارویی موجود : قرص

میزان خطر در صرف اضافی : دارد

زمان و دفعات صرف : ۲-۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو ظرف چند ساعت بعد از صرف شروع می‌شود اما اثر کامل ضدافسردگی آن نیاز به چند هفته زمان دارد. آثار ضدافسردگی دارو تا چند هفته باقی می‌ماند.

موارد منع صرف و احتیاط : جز با نظر پزشک صرف آن را متوقف نکنید؛ پزشکان ابتدا مقدار داروی تجویزی را کاهش داده و سپس اجازه توقف صرف آن را می‌دهند - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا صرف مقادیر زیاد این دارو، به پزشک اطلاع دهید - قبل از آگاهی از اثرات این دارو بر روی خودتان از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث کاهش دقیق و هوشیاری و نیز دویینی شود - در صورت ابتلا به مشکلات قلبی، مشکلات بلندمدت کبدی و کلیوی، گلوكوم، پرکاری تیروئید، بیماری‌های پروستات، داشتن سابقه تشنج صرعی و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - صرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عواضن ناخواسته : تعریق، گرگرفتگی، خواب آلودگی، خشکی دهان و تاری دید.

תداخل‌های دارویی : سیگار اثر دارو را کم می‌کند - این دارو باعث کاهش اثر داروهای ضدفسارخون شده و صرف همزمان آن با داروهای گروه MAOIs باعث واکنش‌های شدید می‌شود - در صورت صرف همزمان با داروهای ضدآریتمی و سوتالول باعث افزایش خطر ریتم غیرطبیعی قلب می‌شود - همه داروهای دارنده اثر آرامبخش می‌توانند اثر آرامبخشی این دارو را تشدید کنند.

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن دارو در بارداری ثابت نشده و در شیردهی نیز می‌تواند به داخل شیر ترشح شود. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Lopramide**لوپرامید**

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضداسهال

اشکال دارویی موجود : مایع و کپسول

میزان خطر در صرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : برای اسهال مزمن ۲ بار در روز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۱-۲ ساعت اثر دارو ظاهر می‌شود و ۶-۱۸ ساعت در بدن فعال است.

رزیم غذایی مناسب: در طی بیماری اسهال سعی شود از قند و نمک به حد کافی استفاده گردد و مایعات به مقدار زیادی مصرف شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث استفراغ، بیوست و خوابآلودگی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، عفونت روده، کولیت اولسراتیو، کولیت با غشای کاذب و نیز در صورت داشتن سابقه جراحی اخیر روی شکم یا استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - گرچه به صورت بلندمدت تجویز نمی‌شود اما استفاده طولانی از آن مشکلی ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته : خوابآلودگی، سرگیجه، خشکی دهان و بیوست.
تداخل‌های دارویی : ندارد.

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن دارو در بارداری ثابت نشده اما در شیردهی می‌تواند وارد شیر شود اما در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Loratadine

لوراتادین

گروه دارویی : آنتی هیستامین

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر می‌کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - در صورت بروز علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در بارداری و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورتی که از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : عوارض دارو که چندان هم شایع نیستند عبارتند از خستگی، تهوع و سرد درد.

تداخل‌های دارویی: سایمیدین اثر این دارو را افزایش می‌دهد.
صرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن دارو در بارداری و شیردهی ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Lorazepam لورازپام

گروه دارویی: ضداضطراب، آرامبخش، خواب‌آور
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص دارای شیار
مقدار و روش مصرف: جهت درمان اضطراب: روزانه ۶ - ۲ میلی‌گرم از راه خوراکی، در چند نوبت تجویز می‌شود. جهت درمان بی‌خوابی: ۴ - ۲ میلی‌گرم از راه خوراکی قبل از خواب مصرف می‌شود.
موارد عمده استعمال دارو: درمان اضطراب، درمان صرع امادگی پیش از بی‌هوشی.
عوارض جانبی مهم: فراموشی، خواب‌آلودگی، سرگیجه، اختلال خواب، اغتشاش ذهنی، تهوع، بی‌اشتهاایی، تاری دید و تضعیف شنوایی.

Lovastatinine لواستاتین

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص
مقدار و روش مصرف: ۴۰ - ۲۰ میلی‌گرم از راه خوراکی، ۲ - ۱ بار در روز
موارد عمده استعمال دارو: پایین آوردن کلسترول خون هنگامی که رژیم غذایی و سایر تدابیر درمانی موثر واقع نشوند.
عوارض جانبی مهم: سرگیجه، خستگی، خستگی، سوء‌هاضمه، اختلال در حس چشایی، بفح، دانه‌های پوستی و خارش.

Mafenide Acetate مافنید استات

اشکال دارویی موجود در ایران: کرم موضعی
مقدار و روش مصرف: هر روز ۲ - ۱ بار لایه‌ای به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر از این پماد، روی سطح سوخته مالیده شود.
موارد عمده استعمال دارو: پیشگیری از سپسیس - درمان کمکی در سوختگی‌های درجه ۲ و ۳.

عوارض جانبی مهم: خارش، کهیر، تاول، درد شدید، احساس سوزن سوزن شدن در محل استعمال دارو و افزایش از دست رفتن آب از بدن.

Magnesium Hydroxide

هیدروکسید منیزیم

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

گروه دارویی: ضداسید، مسهل

اشکال دارویی موجود: قرص، مایع و پودر

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: ۴ بار در روز همراه با آب و ترجیحاً یک ساعت بعد از غذا

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر ضداسیدی دارو ظرف ۱۵ دقیقه و اثر مسهل آن ظرف ۲-۸ ساعت ظاهر می‌شود و دارو ۲-۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورتی که به عنوان ضداسید استفاده می‌شود، هر وقت بخواهد می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید اما اگر برای درمان زخم معده از آن استفاده می‌کنید، در خصوص توقف مصرف آن با پزشک مشورت کنید - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کلیوی و بیماری روده و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - نباید بدون اجازه پزشک به صورت بلندمدت از آن استفاده کنید - افراد مبتلا به آسیب‌های کلیوی، به علت تجمع زیاد منیزیم در بدن ممکن است دچار خواب آلودگی، سرگیجه و ضعف شوند.

عوارض ناخواسته: شایع‌ترین عارضه اسهال است - در افراد دارای اختلال کلیوی، مصرف دوز بالای آن به صورت بلندمدت، باعث سرگیجه و ضعف عضلانی می‌شود.

تداخل‌های دارویی: منیزیم می‌تواند جذب گوارشی طیف وسیعی از داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، آهن، فنی‌توئین و پنی‌سیلامین را تحت تأثیر قرار دهد - این دارو می‌تواند باعث از بین رفتن پوشش قرص‌های پوشش دار روده‌ای در معده شده و منجر به تحریک آن شود.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

Magnesium Sulfate

سولفات منیزیم

اشکال دارویی موجود در ایران: تزریقی

گروه دارویی: ضدتشنج، الکترولیت تزریقی

مقدار و روش مصرف: در درمان مسمومیت بلاداری : ابتدا ۴ گرم از راه عضلانی یا به صورت رقیق شده در محلول دکستروز ۵ درصد تزریق می‌شود، سپس ۵ - ۴ گرم از راه عضلانی هر ۴ ساعت تزریق می‌شود.
موارد عمدۀ استعمال دارو: کنترل فوری تشنجات خطرناک ناشی از مسمومیت بارداری، مهار زایمان زودرس، پیشگیری و درمان هیپومنیزیمی (کاهش منیزیم خون) .
عوارض جانبی مهم: گرگرفتگی، تشنگی شدید، افت فشار، آرامش، اغتشاش ذهنی، کاهش کلسیم خون و ضعف عضلانی .

Malathion ملاتیون

گروه دارویی: ضدانگل پوستی

میزان خطر در مصرف اضافی: کم (در صورت بلعیده شدن خطر آن متوسط است) .

اشکال دارویی موجود: لوسيون و شامپو

زمان و دفعات مصرف: در بیماری جرب یک بار از لوسيون ملاتیون استفاده می‌شود. در آلدگی به شپش شامپو ۳ بار، هر سه روز یک بار و لوسيون دو بار، هر هفت روز یک بار استفاده شود.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: تازمانی که شسته شود در بدن فعال است - لوسيون برای درمان شپش بعد از ۱۲ ساعت و برای درمان جرب، بعد از ۲۴ ساعت از روی بدن شسته شود و شامپو ۵ دقیقه بعد شسته شود و مجدداً تکرار شود و سپس شانه دانه‌ریز برای شانه کردن موی سر استفاده شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: این دارو به صورت تک دوز یا کوتاه مدت تجویز می‌شود - کاربرد مقدار زیاد آن مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی در صورتی که خورده شود، اقدامات اورژانس لازم است - استفاده از آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به آسم پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو صرفاً برای مصارف محدود تجویز می‌شود و لوسيون آن نباید بیش از یک بار در هفته و سه هفته متوالی مورد استفاده قرار گیرد.

عوارض تاخوسته: در صورت مصرف صحیح جز اندکی تحریکات پوستی مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اکل به کار رفته در برخی لوسيون‌های ملاتیون در بیماران مبتلا به آسم می‌تواند باعث خس سینه شود.
تداخل‌های دارویی: ندارد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

Mebendazole مبندازول

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص جویدنی

گروه دارویی: ضدکرم

مقدار و روش مصرف : هر روز ۲ - ۱ قرص به مدت ۳ - ۱ روز - می‌توان بعد از سه هفته درمان را تکرار کرد.

موارد عمده استعمال دارو : درمان کرم شلاقی (تیریکوریس تریکیورا) ، درمان کرم سنجاقی (اکسیور یا کرمک) ، درمان آسکاریس ، درمان کرم قلابدار ، درمان کرم قلابدار آمریکایی .
عوارض جانبی مهم : اسهال ، دل درد گذرا ، سرگیجه .

Medroxy progesterone مدروكسی پروژسترون

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : هورمون جنسی زنانه

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : قرص و دپوت اینجکشن (depot injection)

زمان و دفعات مصرف : دپو هر ۳ ماه یک بار و قرص‌های خوراکی ۱-۳ بار در روز (همراه با غذا یا آب فراوان)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۱-۲ ماه در درمان سرطان و ظرف ۱-۲ هفته برای درمان موارد دیگر اثر می‌کند. شکل خوراکی ۱-۲ روز و شکل تزریقی تا ۲ ماه در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز خارش ، آکنه و دانه‌های پوستی ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس مشکلی ایجاد نمی‌کند - در صورت ابتلا به دیابت ، فشارخون بالا ، مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و نیز داشتن سابقه لخته شدن خون در رگ‌ها ، حمله مغزی و همچنین استفاده از داروهای دیگر پزشک را مطلع سازید - در صورت استفاده بلندمدت از این دارو ، احتمال ایجاد لخته خون در سیاهرگ‌ها افزایش می‌یابد و ممکن است در ایام بین دو دوره قاعدگی لکه‌های خون دیده شود .

عوارض ناخواسته : احتیاس مایعات در بدن ، افزایش وزن ، ورم پاهای و مج پاهای ، تورم و حساسیت پستان‌ها ، تهوع ، خستگی ، افسردگی و قاعدگی نامنظم .

تداخل‌های دارویی : ضدباکتری‌ها و ضدپیروس‌ها مثل نویراپین اثر این دارو را کاهش می‌دهند . این دارو سطح خونی سیکلوسپورین را افزایش می‌دهد .

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود . در شیردهی با مصرف مقادیر معمولی اشکالی ایجاد نمی‌کند .

مدوکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate

گروه دارویی: ضدبارداری، تنظیم قاعدگی
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص، قرص دارای شیار و تزریقی
مقدار و روش مصرف: از راه هوایی: ۵ میلی گرم در روز به مدت ۱۰-۵ روز
موارد عمده استعمال دارو: جلوگیری از بارداری، خونریزی غیرطبیعی از رحم، توقف ثانویه عادت ماهیانه، شکل تزریقی در درمان کمکی سرطان اندومنتر یا کلیه
عوارض جانبی مهم: سردرد، افزایش فشارخون، آمبولی ریه، یرقان، تهوع، استفراغ، خونریزی بین قاعدگی، کاندیدیاز واژن، قطع قاعدگی، تغییر در جریان خون قاعدگی، حساسیت پستان و تغییرات وزن.

Mefenamic Acid

مفنامیک اسید

گروه دارویی: ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی (NSAIDs)
نیاز به تجویز پزشک: دارد
میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط
اشکال دارویی موجود: قرص، کپسول و مایع
زمان و دفعات مصرف: ۳ بار در روز همراه غذا زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۱-۲ ساعت اثر دارو شروع می‌شود و تا ۶ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقدار زیاد این دارو می‌تواند منجر به تضعیف هماهنگی بدن یا تشنج یا حرکت ماهیچه‌ها شود که باید به پزشک اطلاع دهید - تا از اثرات این دارو بر روی خودتان مطلع نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خواب‌آلودگی و سرگیجه شود - در صورت ابتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی، زخم معده یا ازووفازیت، آسم، فشارخون بالا، پورفیری و نیز استفاده از داروهای دیگر یا داشتن سابقه بیماری‌های التهابی روده یا آرژی نسبت به آسپرین، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت این دارو می‌تواند احتمال خونریزی از زخم معده و روده را افزایش دهد و به ندرت ممکن است روی خون و کبد نیز اثر بگذارد.

عوارض ناخواسته: اختلالات گوارشی مثل تهوع و سوءهاضمه شایع هستند. خواب‌آلودگی و سرگیجه نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

تدخلات دارویی: استفاده از داروهای ضدانعقادی خوراکی، کورتون‌ها و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی همزمان با این دارو احتمال زخم معده و خونریزی از معده را افزایش می‌دهد - این دارو آثار

مفید دیورتیک‌ها و داروهای ضدفسارخون را کاهش می‌دهد - این دارو می‌تواند اثر ضددیابت‌های خوارکی و نیز سطح خونی لیتیم را افزایش دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود. در شیردهی می‌تواند به داخل شیر ترشح شود اما مصرف مقادیر معمولی دارو اشکالی ایجاد نمی‌کند. در این خصوص با پزشک مشورت کنید.

Mefloquin

مفلوکین

گروه دارویی: ضدمالاریا

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

زمان و دفعات مصرف: جهت پیشگیری از بیماری: یک بار در هفته - جهت درمان ۳ بار در روز و هر ۸ ساعت یک بار

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۳-۲ روز اثر دارو شروع می‌شود و بیش از یک هفته در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب: جز در صورت بروز عوارض شدید، مصرف این دارو را بدون مشورت با پزشک متوقف نکنید.

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورت بروز سرگیجه، کلاپس و کاهش هوشیاری ناشی از مصرف مقدار زیاد این دارو اقدامات فوری لازم است - طی مدتی که از مفلوکین برای پیشگیری از مalaria استفاده می‌کنید، تا از اثرات آن بر روی خود آگاه نشده‌اید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه و اختلال در حفظ تعادل شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، تشنج ناشی از صرع، افسردگی یا سایر اختلالات روانی و مشکلات قلبی و نیز در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو و استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو ممکن است تا یک سال برای پیشگیری از مalaria مصرف شود.

عوارض ناخواسته: سرگیجه و اختلال در تعادل، تهوع، دلدرد و سردرد. همچنین عوارضی مانند اضطراب، حمله پانیک، افسردگی، توهّم و اختلال پارانوئید نیز به ندرت ممکن است روی دهند.

تداخل‌های دارویی: مفلوکین، اثر ضدتشنج‌ها، عوارض جانبی مalaria اثر داروهای دیجیتال، بتابلوکرهای و مسدود کننده‌های کانال کلسیم روی قلب را افزایش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود و تا سه ماه بعد از مصرف مفلوکین باید از بارداری جلوگیری شود.

Meloxicam ملوكسي كام

گروه دارویی: ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط
بیاز به تجویز پزشک: دارد

زمان و دفعات مصرف: یک بار در روز
شکال دارویی موجود: قرص و شیاف

مان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر آن شروع می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: اگر به صورت کوتاه مدت از آن استفاده می‌کنید هر وقت بخواهد می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید اما در صورت مصرف بلندمدت آن، جز در صورت بروز عوارض شدید، بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مصرف زیاد آن می‌تواند باعث آسیب‌دیدگی درد معده و روده شود که باید در این مورد با پزشک مشورت کنید - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث اختلال در تعادل و خواب آلودگی شود - در صورت ابتلا به آسم، آرژی نسبت به آسپیرین یا دیگر ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی (NSAIDs)، مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری‌های خونریزی دهنده یا واسیر و نیز داشتن سابقه زخم معده یا ازوفاژیت یا استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان فرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته: دل درد، اختلال در هضم غذا، اسهال، یبوست، سردرد، احساس سبکی سر، خواب آلودگی، راش پوستی و خارش.

نداخل‌های دارویی: مصرف این دارو با اوکسپنتیفیلین، داروهای ضدانعقادی و سایر ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی باعث افزایش احتمال خونریزی از دستگاه گوارش می‌شود - مصرف هم‌زمان این دارو با سیکلوسپورین احتمال آسیب‌های کلیوی را افزایش می‌دهد خطر تشنگ در اثر مصرف کینولون افزایش می‌یابد.

مصرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Menotropins (HMG) منوتروپین

اشکال دارویی موجود در ایران: تزریقی

گروه دارویی: گنادوتروپین انسانی

مقدار و روش مصرف: جهت تمیک تهمک‌گذاری : در هر روز یک آمپول به مدت ۱۲-۹ روز از راه تزریق عضلانی سپس ۱۰/۰۰۰ واحد HCG یک روز بعد از آخرین تزریق HMG موارد عمده استعمال دارو : به منظور القاء تخمک‌گذاری در زنان نازا ، همراه با HCG برای درمان ناباروری در مردان .

عوارض جانبی مهم : بزرگ شدن تخدمان ، درد و اتساع شکم ، اسهال ، تهوع ، استفراغ ، بزرگ شدن پستان در مردان ، تخمک‌گذاری متعدد .

Menthol Salicylate

منتول سالیسیلات

اشکال دارویی موجود در ایران : پماد موضعی

گروه دارویی : ضددرد موضعی

مقدار و روش مصرف : هر ۶ ساعت یک بار روی موضع دردناک مالیده می‌شود .

موارد عمده استعمال دارو : تسکین علامتی دردهای عضلانی ، دردهای روماتیسمی ، کمردرد ، رگ به رگ شدن ، کشیدگی و کوفتگی دردناک عضلات .

Mesalazin

مسالازین

نیاز به تجوییز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدالتهاب روده

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : قرص ، شیاف و شکلی از دارو که از راه تنقیه تجوییز می‌شود (انما) .

زمان و دفعات مصرف : قرص‌ها ۳ بار در روز - شیاف ۳ بار در روز - شکل تنقیه‌ی یک بار در شبانه رو هنگام خواب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف چند روز عوارض دارو ظاهر می‌شود و تا ۲ ساعت در بدن فعال است اما آثار کامل آن به چند هفته وقت نیاز دارد .

رزیم غذایی مناسب : پزشک معالج ممکن است توصیه‌هایی در خصوص غذاهای مؤثر روی بیماری شما داشته باشد .

تحوّه نگهداری از دارو : در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود . شکل آئروسل آن نباید در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گیرد .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت بروز علایب غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای

حساس اشکالی ندارد – در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و نیز داشتن آرژی نسبت به سپرین یا استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید – مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

سوارض ناخواسته: عوارض شایع این دارو عبارتند از تهوع، دلدرد، اسهال، خونریزی امشخص، خس خس ریه، تب، گلودرد، کبدی بدن و بی حالی که در صورت وقوع باید به رشک گزارش داده شود.

داخل‌های دارویی: اثر این دارو به وسیله لاکتولوز کاهش می‌یابد.

صرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری و شیردهی ثابت نشده است. در هر دو ورد با پزشک مشورت کنید.

Metformin

متفورمین

روه دارویی: ضدیابت خوراکی

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

مان و دفعات مصرف: ۲-۳ بار در روز همراه غذا

مان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۲ ساعت اثر می‌کند و ۸-۱۲ ساعت در میان فعال است.

زیم غذایی مناسب: رژیم کم‌چربی و کم‌قدم مورد نیاز است، با پزشک مشورت کنید.

وارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید – مصرف اضافی آن در ر شرایطی نیازمند اقدامات جدی است اما در صورت وقوع تشنج یا کاهش هوشیاری، اقدامات اورژانس "زم" است – مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد اما در صورت بروز علایم اهش قندخون، از چنین فعالیت‌هایی دوری کنید – در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، نارسایی قلبی، پرنوشی یا استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید – صرف بلندمدت این دارو می‌تواند باعث کاهش ذخایر ویتامین B12 در بدن و در نتیجه کم‌خونی شود.

وارض ناخواسته: عوارض جزئی مثل: تهوع، استفراغ و کاهش اشتها در صورت مصرف دارو همراه غذا بهبود می‌یابند. اغتشاش ذهنی، سرگیجه، ضعف، تعزیق و راش پوستی، از عوارض یک‌گر این دارو هستند.

داخل‌های دارویی: این دارو اثر وارفارین را افزایش می‌دهد – کورتون‌ها، استروژن‌ها و دیورتیک‌ها ر این دارو را کاهش می‌دهند – برخی داروها مانند ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی (NSAIDs) و ابلوکرها اثر این دارو را افزایش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری مصرف نمی‌شود و به جای آن انسولین مصرف می‌شود بی‌ضرر بودن آن در شیردهی ثابت نشده و باید با پزشک مشورت کنید.

Methadone

متادون

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضددرد اوپیوئیدی

اشکال دارویی موجود : تزریقی، مایع و قرص

میزان خطر در مصرف اضافی : بالا

زمان و دفعات مصرف : جهت تسکین درد ۳-۴ بار در روز و برای تسکین بلندمدت درد ۲ بار در روز برای تسکین سرفه ۴ بار در روز در ابتدای درمان و دو بار در روز در صورت مصرف بلندمدت - در افرا معتمد به عنوان ترکیب جایگزین یک بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آثار دارو ظرف ۶۰-۱۵ دقیقه بروز می‌کند ۳۶-۴۸ ساعت در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکار نگهداری شود. شکل تزریقی و مایع آن باید در مقابل نور محافظت شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت نیازی به مصرف آن ندارید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید گرچه بهتر است با پزشک نیز مشورت کنید - همه موارد مصرف اضافی متادون نیازمند توجه جدی اسند اما در صورت آهسته شدن سرعت تنفس یا بی‌نظمی در آن، خواب آلودگی شدید و کاهش هوشیاری اقدامات اورژانس لازم است - در خصوص مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس با پزشک مشوره کنید - در صورت ابتلا به مشکلات قلبی یا عروقی، مشکلات کبدی یا کلیوی، آسم یا برونشیت بیماری‌های غده تیروئید و فیز در صورت اعتیاد به الکل، داشتن سابقه تشنج صرعی و استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن باید تحت نظارت پزشک صورت گیرد.

عوارض ناخواسته : خواب آلودگی، تهوع، بیوست، سرگیجه و اغتشاش ذهنی.

تداخل‌های دارویی : در اثر مصرف هم‌زمان دارو با ضدافسردگی‌های گروه MAOIs ممکن اسند فشارخون بالا یا پایین برود - اثر آرامبخشی تمام داروهای آرامبخش به وسیله این دارو افزایش می‌یابد.

صرف در شیردهی و بارداری : در اواخر بارداری بهتر است تجویز نشود زیرا باعث اختلال تنفس و طی نوزادی می‌شود و در شیرخوار نیز می‌تواند وارد شیر شده اثر نامطلوبی روی شیرخوار بگذارد - هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Methimazole**متیمازول**

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص
قدار و روش مصرف : در ابتدا : ۲۰ - ۵ میلی گرم هر ۸ ساعت . سپس جهت درمان نگهدارنده : ۱۵ - ۳ میلی گرم در روز
وارد عمده استعمال دارو : درمان پرکاری تیروئید
وارض جانبی مهم : تهوع ، استفراغ ، بثورات جلدی ، درد مفاصل ، از دست دادن حس چشایی ، درد نصلات ، سردرد و اختلالات دید .

Methocarbamol**متوکاربامول**

روه دارویی : شل کننده عضلانی
شکال دارویی موجود در ایران : قرص و محلول تزریقی
قدار و روش مصرف : فواراکی : ۱/۵ گرم هر ۶ ساعت یک بار به مدت ۳ - ۲ روز . دوز نگهدارنده : ۴/۱ - ۴ گرم در روز . تزریق عضلانی : ۱ گرم هر ۱۲ - ۸ ساعت یک بار ، به مدت سه روز . تزریق ییدی : ۱ گرم هر ۱۲ - ۸ ساعت به مدت سه روز
وارد عمده استعمال دارو : برای رفع ناراحتی حاصل از حالات دردناک عضلانی ، همراه سایر ندامات در درمان کزار .
وارض جانبی مهم : کهیر ، خارش ، احتقان بینی ، تاری دید ، احساس طعم فلزی ، گرگرفتگی ، ااهش فشارخون ، کاهش ضربان قلب و سنکوپ .

Methotrexate**متوترکسات**

روه دارویی : داروی ضدسرطان ، ضدروماتیسم ، ضدپسوریازیس
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط باز به تجویز پزشک : دارد
شکال دارویی موجود : تزریقی و قرص
مان و دفعات مصرف : هر روز یا هر دو روز یک بار به اندازه ۴-۵ دوز و تکرار آن بعد از یک هفته (جهت یمی درمانی و به صورت کوتاه‌مدت) - برای موارد دیگر مثل روماتیسم مفصلی یک بار در هفته

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو ظرف ۶۰-۳۰ دقیقه شروع می‌شود و ۱۰ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت ایجاد گلودرد ، تب و دانه‌های پوستی ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مقدار زیاد این دارو می‌تواند باعث آسیب‌دیدگی مغز استخوان ، تهوع ادلدرد شود که باید به اطلاع پزشک رسانده شود - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی ، پورفیری ، زخم معده یا قسمت‌های دیگر لوله گوارش ، اعتیاد به الكل یا استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - گرچه در بیماری آرتربیت ممکن است مصرف طولانی این دارو مورد نیاز باشد اما بعد از تحت کنتrol قرار گرفتن ایز بیماری ، دوز آن باید به کمترین میزان مؤثر کاهش یابد .

عوارض ناخواسته : تهوع ، استفراغ ، اغتشاش ذهنی ، اسهال ، زخم دهان ، زردی ، تغییرات خلقی درد قفسه سینه و سرفه خشک .

تداخل‌های دارویی : داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) ، دیورتیک‌ها ، سیکلوسپورین فنی توئین و پروبنساید ، سطح خونی و سمی بودن متوترکسات را افزایش می‌دهند - داروهایی مانند تریمتوپریم ، نیتروس اکساید و کوتوبیموکساژول آثار جانبی دارو را تشدید می‌کنند .

صرف در شیردهی و بارداری : در شیردهی تجویز نمی‌شود زیرا می‌تواند باعث نقاچی در جنین شود در شیردهی ممکن است آثار نامطلوبی روی شیرخوار داشته باشد .

Methoxsalen متوكسالن (سيستميک)

گروه دارویی : ضدپوریاژیس ، محرک رنگدانه‌سازی ، پسورالن
اشکال دارویی موجود در ایران : قرص

مقدار و روش مصرف : تمیک رنگدانه‌سازی : ۳۰-۲۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ۴-۲ ساعت قبل اقرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ۳-۲ بار در هفته . درمان پسوریاژیس : ۲-۱/۵ ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ۳-۲ بار در هفته

موارد عدمه استعمال دارو : به همراه قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش (UVA) به صورت کنتrol شده برای تولید رنگدانه مصرف می‌شود ، برای درمان علامتی پسوریاژیس شدید و مقاوم بسایر اشکال درمان تجویز می‌شود .

بوارض جانبی معم: سرگیجه ، سردرد ، آسیب چشمی ، آب مروارید ، تهوع ، ورم و قرمزی شدید ، لتهاب پوست و تب دارویی .

Methoxsalen

متوكسالن (موضعی)

لروه دارویی: محرک رنگدانه‌سازی ، خدپسوريازيس
شکال دارویی موجود در ایران: محلول برای استعمال موضعی
قدار و روش مصرف: لوسيون را ۲ - ۱ ساعت قبل از قرار گرفتن در مقابل اشعه ماوراء بنفسج (UVA) بک بار در هفته روی ضایعات بمالید .

بوارد عمدۀ استعمال دارو: درمان پسوریازيس شدید ، درمان طاسی ناحیه‌ای ، اگزما ، تحریک نگدانه‌سازی در ویتیلیگو (لک و پیس) .

بوارض جانبی معم: التهاب پوست ، ورم و قرمزی شدید .

Methylcellulose

متیل سلولز

اشکال دارویی موجود در ایران: گرانول
لروه دارویی: ملین حجیم کننده مدفوع
قدار و روش مصرف: یک قاشق سوپ‌خوری در ۲۴۰ میلی‌لیتر آب ۳ - ۱ بار در روز
بوارد عمدۀ استعمال دارو: از راه خوراکی به عنوان داروی کمکی در درمان یبوست مزمن ، به صورت فرآورده‌های چشمی برای تسکین خشکی چشم و نیز به صورت لوبریکانت چشمی برای پشم‌های مصنوعی و لنزهای تماسی .

بوارض جانبی معم: دو شکل فوراگی : اسهال ، تهوع ، استفراغ و انسداد مری .

Methyldopa

متیل دوپا

نیاز به تجویز پزشک: دارد

لروه دارویی: ضدفسارخون

اشکال دارویی موجود: تزریقی و قرص

بیزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

مان و دفعات مصرف: ۲-۴ بار در روز
مان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر دارو ظرف ۶ - ۳ ساعت شروع می‌شود ولی اثر نامل آن ۳-۲ روز طول می‌کشد . این دارو ۶-۱۲ ساعت در بدن فعال است .

نحوه نگهداری از دارو: دارو در ظرف دربسته، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز زردی یا راش پوستی بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث خواب آلودگی یا تپش قلب شود که باید با پزشک مشورت کنید - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند ایجاد خواب آلودگی کند - در صورت ابتلا به کم‌خونی، آثربین و افسردگی و نیز استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن به ندرت ممکن است باعث مشکلات خونی یا کبدی شود.

عوارض ناخواسته: خواب آلودگی، سرگیجه، تب، افسردگی و احتباس آب در بدن.

تداخل‌های دارویی: این دارو باعث افزایش سطح لیتیم و افزایش سمیت دارو می‌شود - ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای اثر این دارو را کاهش می‌دهند - لودوپا اثر مตیل دوپا را افزایش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری اشکالی ندارد و مقادیر معمولی آن مشکلی برای شیرخوار ایجاد نمی‌کند اما با پزشک نیز مشورت کنید.

Methylphenidate HCL

متیل فنیدات

گروه دارویی: محرک تنفسی و مغزی

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص
مقدار و روش مصرف: در درمان نارکولپسی: ۱۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ۳-۲ بار در روز، ۴۵-۳۰ دقیقه پس از غذا

موارد عمدۀ استعمال دارو: درمان کمکی در سندروم‌های ازدیاد فعالیت حرکتی که با اختلالات کاهش توجه، نارکولپسی و افسردگی خفیف مشخص می‌شود.

عوارض جانبی مهم: عصبی شدن، بی‌نظمی قلبی، طپش قلب، خواب آلودگی، خشکی گلو، تاری دید، بی‌اشتهاایی، سمیت کبدی و حساسیت مفرط به دارو.

Methylprednisolone Acetate

متیل پردنیزولون استات

گروه دارویی: ضدالتهاب، گلیکوکورتیکوئید (کورتون)

اشکال دارویی موجود در ایران: سوسپانسیون تزریقی

مقدار و روش مصرف : در درمان آسم و رینیت آلرژیک : ۱۲۰ - ۸۰ میلی گرم هر هفته از راه تزریق عضلانی - در درمان روماتیسم مفصلی : ۱۲۰ - ۴۰ میلی گرم از راه عضلانی یک بار در هفته - درمان ضایعات پوستی : ۱۲۰ - ۴۰ میلی گرم از راه عضلانی یک بار در هفته به مدت ۴ - ۱ هفته
موارد عمده استعمال دارو : درمان روماتیسم مفصلی ، درمان ضایعات حساسیتی پوست ، درمان آسم (تنگی نفس) .

عوارض جانبی مهم : کاهش شدید پتابسیم خون ، نارسایی مزمن قلب ، سرخوشی ، تأخیر در التیام زخم ، پوکی استخوان .

Methyl Salicylate

متیل سالیسیلات

گروه دارویی : ضددرد موضعی
مقدار و روش مصرف : چندین بار روی موضع مالییده شود .

موارد عمده استعمال دارو : تسکین درد مفاصل و عضلات ، تسکین التهاب موضعی .

عوارض جانبی مهم : احساس سوزش در ناحیه ، قرمزی و دانه‌های پوستی .

Methyltestosterone

متیل تستوسترون

گروه دارویی : آندروژن (هورمون جنسی مردانه) **اشکال دارویی موجود در ایران :** قرص

مقدار و روش مصرف : بحث درمان هایگزینی هورمون جنسی مردانه : روزانه ۱۰ - ۵ میلی گرم از راه خوراکی ، در چند دوز منقسم . **بحث درمان بیضه نزول نگرده :** ۳۰ میلی گرم روزانه از راه خوراکی .

موارد عمده استعمال دارو : درمان بلوغ دیررس در مردان ، درمان پایین نیامدن بیضه‌ها بعد از بلوغ ، جایگزینی هورمون جنسی مردانه ، تسکین سرطان پستان در زنان .

عوارض جانبی مهم : سنگ کلیه ، تحریک مخاط دهان ، آکنه ، بزرگ شدن پستان در مردان ، بی‌نظمی قاعدگی در زنان ، کاهش تعداد اسپرم‌ها در مردان .

Metoclopramid

متوکلوبرامید

گروه دارویی : ضداستفراغ و تنظیم کننده حرکات دستگاه گوارش

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط **نیاز به تجویز پزشک :** دارد

اشکال دارویی موجود: قرص ، تزریقی ، مایع ، کپسول و قرص‌های کندآزادشونده
زمان و دفعات مصرف : دارو ۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : فرآوردهای کندآزادشونده (قرص و کپسول) ۱-۲ بار در روز . آثار دارو ظرف یک ساعت بروز می‌کند و ۶-۸ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث گرفتگی ماهیچه‌ها و خوابآلودگی شود که باید به اطلاع پزشک رسانده شود - تا زمانی که از اثرات آن بر روی خودتان مطلع نیستید ، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی یا پورفیری حاد هستید و نیز در صورتی که از داروی دیگری استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو به صورت بلندمدت تجویز نمی‌شود مگر برای درمان بعضی بیماری‌های دستگاه گوارش که آن هم زیر نظر پزشک صورت می‌گیرد .
عوارض ناخواسته : خوابآلودگی ، ناآرامی و اسپاسم غیر قابل کنترل عضلات .

تداخل‌های دارویی : تمام داروهای دارای اثر آرامبخش ، اثر آرامبخشی دارو را افزایش می‌دهند - داروهای گروه فنتیازین آثار جانبی این دارو را افزایش می‌دهند - این دارو آثار جانبی لیتیم بر دستگاه عصبی مرکزی را نیز افزایش می‌دهد .

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده و مصرف مقادیر معمولی آن در شیردهی مشکلی ایجاد نمی‌کند . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Metronidazol مترونیدازول

گروه دارویی : ضدباکتری و ضدتکیاخته
میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود: قرص ، مایع ، تزریقی ، شیاف و ژل
زمان و دفعات مصرف : بسته به شرایط درمانی ۳ بار در روز به مدت ۱۰-۱۵ روز (بعد از غذا و با آب فراوان)
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : دارو ظرف یک ساعت اثر می‌کند اما اثر مفید آن ظرف ۱-۲ روز ظاهر می‌شود و ۶-۱۲ ساعت در بدن فعال است .

نحوه توجهداری از دارو : دارو در ظرف درسته ، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : دوره درمان باید کامل شود - اگر در اثر مصرف مقدار زیاد این دارو دچار علایمی چون بی‌حسی و احساس گزیدگی شدید ، پزشک را در جریان قرار دهید - تا زمانی که از اثرات آن بر روی خود آگاه نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون این دارو می‌تواند باعث خواب‌آوردن و سرگیجه شود - اگر دچار مشکلات بلندمدت کبدی ، بیماری‌های خونی و بیماری‌های دستگاه عصبی مرکزی مثل صرع هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث از بین رفتن موقت حس دست‌ها و پاها شود یا سلول‌های سفید خون را کاهش دهد .

عوارض ناخواسته : خشکی دهان ، تهوع ، کاهش اشتها ، طعم فلز در دهان ، تیره شدن رنگ ادرار سرگیجه و سرد درد .

تداخل‌های دارویی : این دارو اثر داروهای ضدانعقادی و فنی‌توئین را افزایش می‌دهد و نیز باعث افزایش اثر نامطلوب لیتیم روی کلیه‌ها می‌شود - سایمتدین سطح خونی مترونیدازول را بالا می‌برد - فنوباربیتال آثار این دارو را کاهش می‌دهد .

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است و در شیردهی مقادیر معمولی آن مشکلی ایجاد نمی‌کند .

Miconazole میکونازول

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدقارج

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : کرم واژینال ، کپسول واژینال ، کرم ، پماد ، ژل و شیاف واژینال
زمان و دفعات مصرف : ژل خوراکی ۴ بار در روز بعد از غذا - فرآوردهای واژینال و پوستی ۱-۲ بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۲-۳ روز اثر می‌کند و تا ۱۲ ساعت در بدن
 فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت ایجاد دانه‌های پوستی و خس‌خس سینه ، دوره درمان را کامل کنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع بهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به پورفیری و نیز استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : در اثر مصرف خوراکی تهوع و استفراغ و در صورت استفاده از شکل موضعی حریکات پوستی

تداخل‌های دارویی: ژل خوراکی این دارو سمیت سیکلوسپورین، ضدانعقادهای خوراکی، فنی‌توئین و ضددیابت‌ها را افزایش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی بی‌ضرر بودن آن ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Mineral Oil

مینرال اویل

گروه دارویی: نرم‌کننده مدفع، ملین

مقدار و روش صرف: مقدار صرف در بیوست و آمادگی برای (ادیوگرافی یا عمل جراحی) : ۳۰ - ۱۵ میلی‌لیتر از راه خوراکی یا ۹۰ - ۱۲۰ میلی‌لیتر از راه مقعد

موارد عدمه استعمال دارو: تسکین موقت بیوست، بهبود تراکم و سختی مدفع، به عنوان حلال و ناقل دارو.

عوارض جانبی مهم: خارش مقعد، بی‌اشتهاایی، تهوع و استفراغ، در صورت آسپیراسیون به داخل ریه: پنومونی چربی. همچنین ممکن است اختلال در جذب ویتامین‌های محلول در چربی در بلندمدت ایجاد شود.

Minocycline

مینوسیکلین

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک گروه تتراسیکلین

میزان خطر در صرف اضافی: کم نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: قرص، کپسول و ژل

زمان و دفعات صرف: ۱-۲ بار در روز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۴-۱۲ ساعت اثر می‌کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب: فرآورده‌های لبنی ممکن است باعث اختلال در جذب دارو شوند لذا یک ساعت قبل و دو ساعت بعد از صرف این دارو از صرف این فرآورده‌ها پرهیز کنید.

موارد منع صرف و احتیاط: دوره درمان را کامل کنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا صرف مقدار زیادی از این دارو، به پزشک اطلاع دهید - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید، چون می‌تواند باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود - در صورت ابتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی، داشتن سابقه حساسیت به آنتی‌بیوتیک تتراسیکلین و

نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث تیرگی پوست و تغییر رنگ دندان‌ها شود.

عوارض ناخواسته: تهوع، استفراغ، اسهال، افزایش حساسیت پوست به نور آفتاب و راش پوستی.

تداخل‌های دارویی: این دارو، اثر ضدانعقادهای خوراکی را افزایش می‌دهد - در فعالیت ضدباکتری پنی‌سیلین مداخله می‌کند - این دارو اثر ضدبارداری‌های خوراکی را کاهش می‌دهد - آهن و آنتی‌اسید در جذب گوارشی این دارو اختلال ایجاد می‌کنند و اثر آن را کم می‌کنند لذا بین مصرف این دارو و مصرف شیر یا آنتی‌اسیدها باید ۱-۲ ساعت فاصله باشد.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود، زیرا می‌تواند به استخوان‌ها و دندان‌های جنین در حال رشد آسیب برساند. در این خصوص با پزشک مشورت کنید. در شیردهی می‌تواند وارد شیر شده باعث تغییر رنگ دندان‌های کودک شیرخوار شود.

Minoxidil

مینوکسیدیل

گروه دارویی: ضدفسارخون، ضدریزش مو

نیاز به تجویز پزشک: دارد (به جز لوسيون جهت پوست سر که به تجویز پزشک نیاز ندارد)

اشکال دارویی موجود: قرص و لوسيون موضعی

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: ۱-۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر ضدفسارخون دارو ظرف یک ساعت ظاهر می‌شود و اثر آن در تحریک رویش مو ممکن است ظرف یک سال ظاهر شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت ایجاد تپش قلب، بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث تهوع، استفراغ، تپش قلب و سرگیجه شود که باید به اطلاع پزشک رسانده شود - قبل از آگاهی از اثرات آن بر روی خودتان از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه و احساس سبکی سر شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری قلبی، احتیاض مایعات در بدن و نیز استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث ورم ناحیه مج پا و تحریک رشد مو شود.

عوارض ناخواسته: در شکل لوسيون عوارض چندانی ندارد اما در شکل خوراکی باعث افزایش وزن، فرازیش رویش مو، تهوع، سرگیجه، حساسیت پستان‌ها، سبکی سر و دانه‌های پوستی می‌شود.

تداخل‌های دارویی: کاهش قدرت جنسی ناشی از مینوکسیدیل به وسیلهٔ ضدافسردگی‌ها تشدید می‌شود . استروژن‌ها و پروژسترون‌ها آثار مینوکسیدیل را کاهش می‌دهند .

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری بی‌ضرر بودن دارو به اثبات نرسیده و در شیردهی مقادیر معمولی آن اشکالی ندارد . در هر دو صورت با پزشک مشورت کنید .

Misoprostol

میزوپروستول

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدزخم معده

اشکال دارویی موجود: قرص

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: ۲-۴ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۲۴ ساعت اثر می‌کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز دانه‌های پوستی ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت احتمال بارداری ، سابقه حملهٔ مغزی ، مشکلات قلبی و عروقی ، فشارخون بالا ، مشکلات روده و نیز استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته: تهوع ، استفراغ ، اسهال ، شکم‌درد و خونریزی بین دو سیکل ماهیانه .

تداخل‌های دارویی: خداوسید محتوی منیزیم ، اسهال ایجاد شده در اثر مصرف میزوپروستول را تشدید می‌کند .

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری مصرف نشود زیرا می‌تواند باعث انقباض رحم شود . در شیردهی بی‌ضرر بودن آن به اثبات نرسیده و باید با پزشک مشورت کنید .

Mometasone

مومتازون

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: کورتون

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: کرم ، پماد ، لوسيون سر و اسپری بینی

زمان و دفعات مصرف : اسپری بینی ، دوپاف در هر بار استفاده از این دارو و فرآوردهای موضعی طبق دستور مصرف شود .

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۱۲ ساعت اثر درمانی آن شروع می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به تبخال ، سرخک ، آبله مرغان ، عفونت بینی یا پوست و آکنه ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت فرآوردهای موضعی این دارو می‌تواند باعث تغییرات ماندگار در پوست شود .

عوارض ناخواسته : تحریک بینی ، خونریزی از بینی ، درماتیت و آکنه در اطراف دهان ، افزایش وزن ، زخم گلو ، تغییرات خلقی و درماتیت ، افزایش اندازه مویرگ‌ها و نازک شدن و تغییر رنگ پوست تداخل‌های دارویی : ندارد .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری به اثبات نرسیده است اما مصرف آن در شیردهی اشکالی ندارد . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Montelukast

مونتلوكاست

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدآلرژی

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : قرص و قرص‌های جویدنی

زمان و دفعات مصرف : یک بار در شبانه‌روز هنگام خواب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آثار دارو ظرف دو ساعت شروع می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف این دارو را متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - قبل از آگاهی از اثر این دارو بر روی خودتان از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - در صورت ابتلا به « فنیل‌کتونوری » یا استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته: در صورت مصرف این دارو احتمال شیوع عفونت‌های قفسه سینه بیشتر می‌شود.
تداخل‌های دارویی: ندارد.

مصرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری و شیردهی ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Morphine/Diamorphine

مورفین - دیامورفین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضددرد اوپیوئیدی

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

اشکال دارویی موجود: قرص، کپسول، مایع، تزریقی، شیاف، قرص کندآزادشونده، کپسول کندآزادشونده و گرانول‌های کندآزادشونده

زمان و دفعات مصرف: هر ۴ ساعت یک بار ولی فرآوردهای کندآزادشونده هر ۱۲–۲۴ ساعت یک بار زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: مدت اثر دارو یک ساعت می‌باشد و تا ۴ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: اگر نیازی به مصرف این دارو ندارید می‌توانید با اطلاع پزشک مصرف آن را متوقف کنید – در همه موارد مصرف اضافی این دارو باید به اقدامات فوری پزشکی توجه داشت اما اگر در اثر مصرف اضافی این دارو دچار خواب آلودگی، کاهش هوشیاری یا کندی و بی‌نظمی تنفس شدید حتماً اقدامات اورژانس انجام دهید – صلاح نیست کسی که مورفین مصرف می‌کند اقدام به انجام کارهای حساس یا رانندگی نماید – اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری‌های قلب و دستگاه گردش خون، بیماری‌های ریه مثل آسم و برونشیت، بیماری‌های تیروئید هستید و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر یا داشتن سابقهٔ صرع، پزشک را در جریان قرار دهید – مصرف بلندمدت باعث اعتیاد و کاهش اثرات آن می‌شود.

عوارض ناخواسته: تهوع، استفراغ، بیوست، خواب آلودگی، سرگیجه و اغتشاش ذهنی.

تداخل‌های دارویی: این دارو اگر با داروهای ضدافسردگی گروه MAOIs مصرف شود باعث افزایش شدید فشارخون می‌شود. همچنین این دارو اثر آرامبخشی داروهای ضدسایکوز، ضدافسردگی و خواب‌آورها را تشدید می‌کند.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری به علت احتمال ایجاد مشکلات تنفسی در جنین تجویز نمی‌شود. در شیردهی مصرف مقادیر کم آن اشکالی ندارد.

Naphazolin HCL or Nitrate**نفازولین**

گروه دارویی: ضداحتقان، تنگ کننده رگ‌ها

اشکال دارویی موجود در ایران: محلول داخل بینی و قطره استریل چشمی

مقدار و روش مصرف: دو قطره از محلول ۰/۰۵ درصد در هر یک از سوراخ‌های بینی هر ۶ - ۳ ساعت به مدت ۵ - ۳ روز جهت احتقان بینی و ۳ - ۱ قطره از محلول یک دهم درصد هر ۴ - ۳ ساعت جهت احتقان چشم.

موارد عمده استعمال دارو: ضداحتقان بینی و منقبض کننده رگ‌های چشم.

عوارض جانبی مهم: خشکی مخاط بینی، حساسیت زیاد به دارو، گزش یا سوزش گذرا در بینی، سردرد، افزایش فشارخون، ضعف، تهوع، خواب آلودگی و کاهش ضربان قلب.

Naphazolin - Antazoline**نفازولین - آنتازولین**

اشکال دارویی موجود در ایران: قطره چشمی

گروه دارویی: ضداحتقان و آنتی‌هیستامین

مقدار و روش مصرف: ۱ - ۲ قطره بر روی ملتحمه چکانده شود و در صورت نیاز هر ۴ - ۳ ساعت یک بار تکرار شود.

موارد عمده استعمال دارو: کاهش تحریک یا احتقان چشم، آرژی و التهاب یا عفونت چشمی.

Nalidixic Acid**نالیدیکسیک اسید**

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک، ضد عفونت‌های مجرای ادراری

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص و سوسپانسیون خوراکی

مقدار و روش مصرف: در ابتدای درمان عفونت‌های مجرای ادراری یک گرم از راه خوراکی، هر ۶ ساعت یک بار به مدت ۱۴ - ۷ روز

موارد عمده استعمال دارو: عفونت‌های مجرای ادراری ناشی از میکروب‌های گرم منفی.

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد و کسالت، کهیر، ضعف عضلانی و اختلال دید.

Naloxone HCL**نالوکسان**

اشکال دارویی موجود در ایران: آمپول

گروه دارویی: آنتاگونیست داروهای مخدّر

مقدار و روش مصرف : ۰-۴ میلی‌گرم از راه وریدی و در صورت نیاز می‌توان هر ۳-۲ دقیقه یک بار آن را تکرار کرد.

موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان مصرف بیش از حد نارکوتیک‌ها (ترکیبات تریاک) عوارض جانبی مهم : افزایش فشارخون ، لرز ، خواب آلودگی ، احساس درد ، تهوع ، افزایش ضربان قلب و استفراغ .

Nandrolone ناندرولون

گروه دارویی : هورمون آنابولیک
اشکال دارویی موجود در ایران : آمپول (این دارو در ایران به صورت دو نوع ترکیب ناندرولون دکانوات و ناندرولون فن پروپیونات عرضه می‌شود)

مقدار و روش مصرف : ناندرولون دکانوات : ۲۰۰ - ۱۰۰ میلی‌گرم از راه عضلانی هر هفته یک بار در مردان و ۱۰۰ - ۵۰ میلی‌گرم از راه عضلانی هر هفته یک بار در زنان . ناندرولون فن پروپیونات : ۱۰۰ - ۵۰ میلی‌گرم هر هفته یک بار از راه عضلانی .

موارد عمدۀ استعمال دارو : ناندرولون دکانوات : درمان کم‌خونی ناشی از بسیاری کلیه ، درمان پوکی استخوان ، تحلیل بافت‌ها ، سوختگی و زخم بستر . ناندرولون فن پروپیونات : بعضی کم‌خونی‌ها ، قبل و بعد از عمل جراحی ، سوختگی ، پوکی استخوان و سرطان متاستاتیک پستان .

عوارض جانبی مهم : تهوع ، استفراغ ، اسهال ، بی‌اشتهاایی ، احساس پری شکم ، یرقان ، آکنه ، القاء صفات ثانویه جنسی نر و احتباس نمک و آب و پتابسیم .

Naproxen ناپروکسن

گروه دارویی : ضدنقرس ، ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)
نیاز به تجویز پزشک : دارد
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، گرانول و شیاف
زمان و دفعات مصرف : هر ۸-۶ ساعت یک بار برای تسکین درد ۱-۲ بار در روز جهت درمان آرتریت و درد عضلانی - هر ۸ ساعت یک بار برای درمان نقرس . این دارو باید همراه غذا مصرف شود .

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر ضددرد آن ظرف یک ساعت و اثر کامل ضدالتهابی آن ظرف دو هفته ظاهر می‌شود و تا ۱۲ ساعت در بدن فعال است .

نحوه نگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : در صورت مصرف کوتاه مدت هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را قطع کنید اما در صورت مصرف بلندمدت، جز در صورت بروز عوارض شدید، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - تا زمانی که از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید از راندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث کاهش تمرکز شود - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های خونریزی دهنده، فشارخون بالا، آلرژی نسبت به آسپیرین، ازوفاژیت، زخم معده، آسم، مشکلات گوارشی مرتبط با ترشح اسید هستید و نیز در صورتی که از داروهای دیگری استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید. مصرف بلندمدت آن خطر خونریزی از زخم‌های معده و روده را افزایش می‌دهد.

عوارض ناخواسته : تحریک معده که باعث دل درد و سوءهاضمه می‌شود، سردرد، عدم تمرکز، صدای زنگ در گوش و ورم پاهای راش پوستی (دانه‌های پوستی)، خس خس سینه یا تنگی نفس و مشاهده مدفعه تیره یا خونی رنگ.

تداخل‌های دارویی : با طیف وسیعی از داروها، این دارو تداخل می‌کند و احتمال زخم معده و نیز خونریزی دستگاه گوارش را بیشتر می‌کند - این دارو سطح خونی عنصر لیتیم را تغییر می‌دهد - آثار مفید ضدفسارخون‌ها و دیورتیک‌ها را کاهش می‌دهد.

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود. در ۳ ماه پایانی بارداری باعث عوارض نامطلوب روی قلب جنین می‌شود و زایمان را طولانی می‌کند و در شیردهی مصرف کم آن اشکالی ندارد اما در هر دو مورد با پزشک نیز مشورت کنید.

Niclosamide

نیکلوزامید

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص جویلنی

گروه دارویی : ضدکرم

مقدار و روش مصرف : در بزرگسالان و اطفال بیش از ۸ سال؛ دو گرم در یک یا دو دوز به فاصله یک ساعت

موارد عمده استعمال دارو : عفونت‌های گرم‌های نواحی (وده مثل)؛ کرم کدوی گاوی، کرم پهنه ماهی و کرم کدوی سگ یا گربه.

عوارض جانبی مهم : خواب آلودگی، سرگیجه، تحریک‌پذیری، تهوع، استفراغ، ناراحتی شکم، احساس طعم تلخ، خونریزی از مقعد، تپش قلب و خارش مقعد.

Nicorandil**نیکوراندیل**

نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: قرص

گروه دارویی: ضد آنژین

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: دو بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر می‌کند و ۱۲ ساعت در بدن
فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت وقوع تپش قلب ، مصرف این دارو را بدون اجازه پزشک متوقف
نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث سرگیجه غیرعادی و کاهش خطرناک فشارخون شود - قبل از اطلاع از
اثرات آن روی خود از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - در صورت
استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .
عوارض ناخواسته: سرگیجه ، تهوع ، سردرد و گرگرفتگی .

تداخل‌های دارویی: این دارو ، اثر ضدفشارخون‌ها را افزایش می‌دهد - ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای
اثر ضدفشارخون این دارو را افزایش داده و منجر به سرگیجه می‌شوند .

صرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن دارو در بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است . در
هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Nicotine**نیکوتین**

گروه دارویی: داروی مورد استفاده در ترک سیگار

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

اشکال دارویی موجود: پچ پوستی (چسب پوستی) ، اسپری بینی و آدامس جویدنی

زمان و دفعات مصرف: پچ پوستی هر ۲۴ ساعت یک بار تجویز می‌شود . هرگاه احساس نیاز به
سیگار داشتید از آدامس جویدنی استفاده کنید . لازم به ذکر است پچ پوستی ۱۶ ساعت بعد از
چسباندن روی پوست باید برداشته شود .

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر اسپری و آدامس در چند دقیقه و اثر
پچ پوستی در چند ساعت شروع می‌شود .

رژیم غذایی مناسب: پچ پوستی ۲۴ ساعت و اسپری و آدامس ۳۰ دقیقه در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: قطع مصرف این دارو به صورت تدریجی صورت می‌گیرد - مصرف مقدار زیاد این دارو که معمولاً در صورت استفاده از چند چسب پوستی به طور هم‌زمان، اتفاق می‌افتد نیازمند اقدامات پزشکی است اما مصرف تعداد بیشتری آدامس یا استفاده زیاد از اسپری مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، دیابت ملیتوس، بیماری‌های غده تیروئید، بیماری‌های قلبی و دستگاه گردش خون، فئوکرومومسیتوم، زخم معده، نوعی بیماری پوستی و نیز استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - نباید بیش از سه ماه از این دارو استفاده شود.

عوارض ناخواسته: تحریک پوست در مصرف چسب‌های پوستی، تحریک موضعی گلو یا بینی و افزایش ترشح بزاق در مصرف آدامس و اسپری، سرگیجه، تهوع، علایم شبیه به آنفلوآنزا، سوء هاضمه و بی‌خوابی.

تداخل‌های دارویی: این دارو نباید همراه با سیگار مصرف شود. توقف مصرف سیگار باعث افزایش سطح خونی داروهایی مانند: وارفارین و تئوفیلین می‌شود، لذا با پزشک مشورت کنید.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی مصرف نمی‌شود.

اسید نیکوتینیک (Niacin) (Nicotinic Acid)

گروه دارویی: ویتامین B₃، پایین‌آورنده چربی خون، گشادکننده رگ‌های محیطی

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص معمولی و قرص پوشش‌دار

مقدار و روش مصرف: درمان کمبود نیاسین (ویتامین B₃) : روزانه ۲۰ - ۱۰ میلی‌گرم از راه خوراکی.

درمان هایپرلیپیدمی (چربی بالای خون) : روزانه ۳ - ۱/۵ گرم از راه خوراکی چند نوبت در روز

موارد عمده استعمال دارو: پیشگیری و درمان بیماری پلاگر و درمان کمکی هایپرلیپیدمی (چربی بالای خون).

عوارض جانبی مهم: فعال شدن زخم معده و روده، یرقان، آرژی، بثورات جلدی، خارش، تهوع، ترش کردن و کاهش تحمل گلوکز.

Nifedipine

نیفیدیپین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدآنژین، ضدفسارخون

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود: قرص ، کپسول ، کپسول های کندآزادشونده و قرص های کندآزادشونده زمان و دفعات مصرف : ۳ بار در روز اما فرآورده های کندآزادشونده ۲ - ۱ بار در روز . در حمله آنژین ممکن است یک کپسول شکسته شده و محتويات آن در دهان نگه داشته یا بلعیده شود .

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۶۰ - ۳۰ دقیقه اثر دارو شروع می شود و ۶ ساعت در بدن فعال است . در صورت شکستن کپسول و نگه داشتن مایع موجود در کپسول در دهان ، اثرات آن ظرف چند ثانیه شروع می شود .

رژیم غذایی مناسب : این دارو را همراه با عصاره گریپ فروت مصرف نکنید .

نحوه نگهداری از دارو : دارو را در ظرف دربسته ، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بدتر شدن آنژین ، مصرف آن را بدون مشورت با پزشک متوقف نکنید - مقدار زیاد این دارو می تواند باعث سرگیجه شود که باید به پزشک اطلاع داده شود - تا زمانی که از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید ، چون می تواند باعث سرگیجه ناشی از افت فشارخون شود - در صورت ابتلاء به مشکلات کبدی یا کلیوی ، نارسایی قلبی ، دیابت ، تنگی آئورت و در صورتی که اخیراً دچار حمله قلبی شده اید و یا از داروی دیگری استفاده می کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : سردرد ، گرگرفتگی ، ورم مج پا ، تکرر ادرار ، سرگیجه و سبکی سر .

تداخل های دارویی : این دارو اثر داروهای ضد آنژین ، ضد فشارخون ، فنی توئین و دیگوکسین را افزایش می دهد - ریفارمیسین اثر این دارو را کاهش می دهد - عصاره میوه گریپ فروت می تواند اثر این دارو را افزایش دهد .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی شود ، زیرا می تواند باعث اختلالاتی در تکامل جنین شود یا زایمان را به تأخیر اندازد . در شیردهی وارد شیر شده و باعث تأثیراتی روی شیرخوار می شود . در هر دو مورد با پزشک مشورت شود .

Nitrofurantoin

نیتروفورانتوئین

گروه دارویی : ضد عفونت مجاری ادراری

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص پوشش دار و سوسپانسیون خوارکی

مقدار و روش مصرف: درمان پیلوفریت (عفونت کلیه و لگنچه) : ۱۰۰ - ۵۰ میلی گرم از راه خوراکی ، چهار بار در روز . درمان بلندمدت عفونت مجاری ادراری UTI : ۱۰۰ - ۵۰ میلی گرم از راه خوراکی قبل از خواب

موارد عمدۀ استعمال دارو: درمان طولانی مدت عفونت مجاری ادراری ، عفونت مثانه ، عفونت لگنچه ، عفونت بافت کلیه (پیلوفریت) .

عوارض جانبی مهم: آسیب دیدگی اعصاب محیطی ، خواب آلودگی ، بی اشتہایی ، تهوع ، اسهال ، شکم درد ، رنگی شدن دندان‌ها در اطفال ، زرد تیره یا قهوه‌ای شدن رنگ ادرار و حساسیت ریوی .

Nitrofurazone

نیتروفورازون

اشکال دارویی موجود در ایران: کرم

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک موضعی

مقدار و روش مصرف: به طور مستقیم روی ضایعات یا پانسمان‌ها مالیده می‌شود .

موارد عمدۀ استعمال دارو: درمان کمکی در سوختگی‌های درجه ۲ و ۳ در مواردی که نسبت به سایر داروها مقاومت میکروبی وجود دارد .

عوارض جانبی مهم: عفونت‌های اضافی ، حساس شدن پوست و تحریک پوست .

Nitroglycerin

نیتروگلیسرین

گروه دارویی: ضد آنژین صدری ، گشادکننده رگ‌ها

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص جویدنی ، قرص زیرزبانی ، کپسول رتارد ، قرص رتارد ، قرص کندآزادشونده ، پماد ، تزریقی و چسب

مقدار و روش مصرف: همت درمان آنژین : قرص زیرزبانی هر ۵ - ۳ دقیقه یک بار ، حداکثر تا ۳ دقیقه در مدت ۱۵ دقیقه - خوراکی ۹ - ۱/۳ میلی گرم هر ۸ - ۱۲ ساعت - وریدی ۵ میکرو گرم در دقیقه به صورت آنفوزیون داخل وریدی

موارد عمدۀ استعمال دارو: پیشگیری ، کنترل و درمان آنژین صدری - پماد در درمان کمکی رینود - نیتروگلیسرین وریدی برای کنترل فشارخون حین عمل جراحی .

عوارض جانبی مهم: سردرد ، تاری دید ، سرگیجه ، غش ، کاهش فشارخون وضعیتی ، تهوع ، تپش قلب و تشدید آنژین .

Nooxy nol - 9

نانوکسی نول - ۹

اشکال دارویی موجود در ایران: کرم واژینال

گروه دارویی: اسپرم کش ، ضد بارداری

مقدار و روش مصرف : به طور موضعی ۶۰ - ۳۰ دقیقه قبل از مقاومت بوسیله اپلیکاتور استعمال می شود و اثر اسپرم کش آن حداقل یک ساعت باقی می ماند.

موارد عمدۀ استعمال دارو : به عنوان ضد بارداری به تنها یی یا همراه دیافراگم یا کاندوم عوارض جانبی مهم : کاندیدیاز ، تحریک واژن یا آلت تناسلی مرد ، خشکی واژن ، افزایش عفونت های واژن .

Norepinephrine Bitartarate نوراپینفرین

گروه دارویی : تنگ کننده عروق ، آگونیست آلفا و بتا - آدرنرژیک
اشکال دارویی موجود در ایران : آمپول (به صورت محلول یک در هزار)
مقدار و روش مصرف : جهت درمان افت ناگهانی فشار در شرایطی مثل شوک : ۱۲ - ۸ میکروگرم در هر دقیقه از طریق انفوزیون وریدی و سپس دوز نگهدارنده بین ۴ - ۲ میکروگرم در دقیقه .

موارد عمدۀ استعمال دارو : برای نگهداری فشارخون در حالات خاص کاهش فشار مثل شوک ، سکته قلبی ، واکنش های دارویی و سپتی سمی تجویز می شود . به عنوان داروی کمکی در درمان ایست قلبی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

عوارض جانبی مهم : افزایش فشارخون ، طیش قلب ، سردرد ، بی نظمی های کشنده قلب ، بی قراری ، اضطراب ، لرز ، بی خوابی ، خونریزی مغزی ، تشنج و تاری دید .

Nortriptyline HCL نورتریپتیلین

گروه دارویی : خدافتسردگی سه حلقه ای
اشکال دارویی موجود در ایران : کپسول و قرص شیاردار
مقدار و روش مصرف : جهت درمان افسردگی : ۲۵ میلی گرم از راه خوراکی ۳ - ۴ بار در روز و تا ۱۵۰ - ۱۰۰ میلی گرم در روز نیز می تواند افزایش یابد .

موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان افسردگی درون زا عوارض جانبی مهم : احتباس ادرار ، افت فشار وضعیتی ، خواب آلودگی ، اغتشاش ذهنی ، خشکی دهان ، تاری دید و حساسیت به نور .

Nystatin

نیستاتین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدقارچ‌ها

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: قرص ، مایع ، کرم ، پماد ، ژل ، شیاف واژینال و پاستیل

زمان و دفعات مصرف: برای عفونت گلو و دهان ۴ بار در روز - شکل مایع دارو قبل از بلعیدن باید چند دقیقه در دهان نگه داشته شود. برای عفونت‌های روده‌ای ۴ بار در روز - برای عفونت‌های پوستی ۴ - ۲ بار در روز - برای عفونت‌های مجرای تناسلی زنانه یک بار در روز به مدت دو هفته.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: آثار دارو زودتر از ۱۴ - ۷ روز بعد از شروع مصرف آن ظاهر نمی‌شود. دارو تا ۶ ساعت در بدن فعال است.

نحوه تگهداری از دارو: دارو در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: حتی در صورت بهبود علایم بیماری ، دوره درمان را کامل کنید - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو ، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید. پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد اما این دارو در چارچوب دوره زمانی مشخص جهت عفونت‌های قارچی تجویز می‌شود.

عوارض ناخواسته: عوارض دارو مانند تهوع و استفراغ ، ناشایع ، خفیف و گذرا هستند.

تداخل‌های دارویی: ندارد.

صرف در شیردهی و بارداری: در شیردهی و بارداری اشکالی ایجاد نمی‌کند.

Ofloxacin

اُفلوکسازین

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک از دسته کینولون‌ها

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش دار دارای شیار

مقدار و روش مصرف: هشت درمان عفونت مجازی اداری : ۲۰۰ میلی‌گرم از راه خوراکی هر ۱۲ ساعت یک بار. هشت درمان عفونت مجازی تنفسی داخلی (یه و پوست) : ۴۰۰ میلی‌گرم از راه خوراکی هر ۱۲ ساعت ، به مدت ۱۰ روز

موارد عمده استعمال دارو : درمان عفونت‌های مجاری ادراری ، پوست ، بیماری‌های منتقل شونده ، از طریق تماس جنسی و مجاری تنفسی داخل ریه .
عوارض جانبی مهم : تهوع ، استفراغ ، اسهال ، سردود ، بی‌خوابی و ناراحتی شکمی .

تری کلیسرید امکا - ۳ مارین Omega - 3 Marine Triglyceride

اشکال دارویی موجود در ایران : مایع و کپسول
گروه دارویی : چربی اشباع نشده
مقدار و روش مصرف : جهت پیشگیری از فطر بیماری عروق کرونر قلب : ۲ - ۱ کپسول از راه خوراکی ، ۳ بار در روز به همراه غذا
عوارض جانبی مهم : اسهال .

Omeprazol امپرازول

نیاز به تجویز پزشک : دارد
گروه دارویی : ضدزخم معده
اشکال دارویی موجود : کپسول
میزان خطر در مصرف اضافی : کم
زمان و دفعات مصرف : ۱-۲ بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۲-۵ ساعت آثار دارو شروع می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رزیم غذایی مناسب : رژیم خاصی نیاز ندارد . اگرچه غذاهای پرادویه و الکل دار می‌توانند باعث بدتر شدن بیماری اصلی شوند .

نحوه تگهداری از دارو : این دارو در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود . دارو نسبت به رطوبت حساس است و نباید به ظرف دیگری منتقل شود و بعد از باز شدن در ظرف حاوی کپسول‌ها ، بیش از سه ماه نمی‌توان از این کپسول‌ها استفاده کرد .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت ایجاد دانه‌های پوستی ، قطع مصرف این دارو نباید بدون اجازه پزشک صورت گیرد - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مشکل کبدی دارید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : سردود ، اسهال خفیف ، راش پوستی ، تهوع و یبوست .

تداخل‌های دارویی: این دارو، اثر وارفارین را افزایش می‌دهد. سطح خونی سیکلوسپورین را بالا می‌برد. باعث افزایش اثر فنی توثیق شود.
صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی، بی‌ضرر بودن آن ثابت نشده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Ondansetron اوندانسترون

نیاز به تجویز پزشک: دارد
گروه دارویی: ضداستفراغ
اشکال دارویی موجود: تزریقی و قرص
میزان خطر در صرف اضافی: کم
زمان و دفعات صرف: دو بار در روز تجویز می‌شود اما دفعات صرف دارو متناسب با بیماری می‌تواند تغییر کند.
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: آثار دارو ظرف یک ساعت شروع می‌شود و تا ۱۲ ساعت در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو: دارو در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع صرف و احتیاط: هر وقت بخواهید می‌توانید صرف آن را متوقف کنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا صرف مقدار زیادی از این دارو پزشک را در جریان قرار دهید - صرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مشکل کبدی دارید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - معمولاً این دارو به صورت بلندمدت تجویز نمی‌شود.
عوارض ناخواسته: دارو عوارض خاصی ندارد اما گاه عوارضی مانند: یبوست و احساس گرمی در سر و معده به وجود می‌آید.

تداخل‌های دارویی: ندارد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود و در شیردهی به داخل شیر ترشح شده و روی شیرخوار اثر می‌گذارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Orlistat اورلیستات

نیاز به تجویز پزشک: دارد
گروه دارویی: درمان چاقی
اشکال دارویی موجود: کپسول
میزان خطر در صرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: روزی ۳ بار (قبل از غذا ، در طی غذا خوردن یا یک ساعت بعد از غذا) مصرف می شود . اگر یک وعده غذایی حذف شده باشد و یا حاوی چربی نباشد لازم نیست از دارو استفاده شود .
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۳۰ دقیقه اثر می کند و ۴۸ - ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

نحوه نگهداری از دارو : رژیم غذایی متعادل حاوی کربوهیدرات ، پروتئین و چربی مصرف شود و از سبزی و میوه فراوان استفاده شود . کربوهیدرات ، پروتئین و چربی به طور متعادل در سه وعده غذا توزیع شود .

نحوه نگهداری از دارو : این دارو باید در ظرف درسته ، در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می توانید مصرف آن را متوقف کنید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکال ندارد - در صورت ابتلا به دیابت ، سندروم سوء جذب مزمن ، مشکلات کبدی و صفرایی ، استفاده از داروهای پایین اورنده خون یا داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - در صورتی که بعد از ۱۲ هفته از آغاز درمان با این دارو به اندازه ۵٪ از وزن بدن شما کم نشود مصرف آن را باید متوقف کنید .

عوارض ناخواسته : مدفعه آبکی و چرب ، تکرار دفع مدفعه ، درد مقعد و شکم ، سردرد ، تهوع ، نفخ ، بی نظمی در قاعده ای ، اضطراب و خستگی .

تداخل های دارویی : اکاربوس ، متفورمین و فیبرات ها اثر این دارو را افزایش می دهند .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن دارو در بارداری و شیردهی ثابت نشده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

ا- آر- اس (سرم خوراکی) ORS

گروه دارویی : الکتروولیت خوراکی

اشکال دارویی موجود در ایران : پودر برای تهییه یک لیتر محلول خوراکی
مقدار و روش مصرف : به مقدار مورد نیاز بیمار ، مصرف می شود .

موارد عمده استعمال دارو : جبران آب و الکتروولیت های از دست رفته در اسهال حاد ، جانشین کردن الکتروولیت ها و مایعات در افرادی که باید از غذا و مایعات پرهیز کنند .

Oxazepam اگزازپام

گروه دارویی : ضد اضطراب ، خواب آور ، آرامبخش اشکال دارویی موجود در ایران : قرص

مقدار و روش مصرف : در درمان اضطراب : ۳۰ - ۱۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ۴ - ۳ بار در روز
موارد عدمه استعمال دارو : درمان اضطراب و تنفس ، کنترل نشانه‌های حاد قطع مصرف الكل در
 الکلیسم مزمن .

عوارض جانبی مهم : خواب آلودگی ، سرگیجه ، سردرد ، لرز ، صحبت کردن مبهم ، تغییر قدرت
 جنسی ، تهوع ، خشکی دهان و کاهش فشارخون .

Oxybutynin

اکسی بوتینین

گروه دارویی : مورد استفاده در بیماری‌های ادراری **نیاز به تجویز پزشک :** دارد

اشکال دارویی موجود : مایع و قرص **میزان خطر در مصرف اضافی :** متوسط

زمان و دفعات مصرف : ۲-۴ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف یک ساعت اثر می‌کند و تا ۱۰ ساعت در
 بدن فعال است .

نحوه نگهداری از دارو : دارو در جای خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان و در ظرف
 دربسته نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد این دارو
 می‌تواند باعث ناآرامی ، رفتارهای جنون‌آمیز ، افت فشارخون ، اختلالات تنفسی ، فلنج و یا کما شود که
 باید بی‌درنگ به پزشک اطلاع دهید - قبل از آگاهی از اثر این دارو روی خودتان از رانندگی و کارهای
 حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خواب آلودگی ، اختلال دید ، عدم تمرکز و کاهش هوشیاری
 شود - در صورتی که مبتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی ، پرکاری تیروئید ، بیماری‌های قلبی ، بزرگی
 پروستات ، فتق هیاتوس ، کولیت اولسراتیو ، پورفیری ، گلوکوم و میاستنی گراو هستید یا از داروهای
 دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : این دارو باعث تسهیل گلوکوم می‌شود . عوارض آن عبارتند از خشکی دهان ،
 بیوست ، تهوع ، قرمزی پوست و خشکی آن و اختلال در دفع ادرار .

تداخل‌های دارویی : مصرف این دارو همراه با داروهای آنتی کولینرژیک ، عوارض جانبی ناشی از
 آثار آنتی کولینرژیک آن را افزایش می‌دهد .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است . در
 هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Oxybutynin Chloride**اکسی بوتینین کلراید**

گروه دارویی: ضد اسپاسم، آنتی کولینرژیک
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص دارای شیار
مقدار و روش مصرف: ۵ میلی گرم از راه خوراکی، دو یا سه بار در روز
موارد عمدۀ استعمال دارو: تسکین نشانه‌های همراه با تخلیۀ ادرار در بیماران مبتلا به مثانۀ نوروزنیک، تسکین درد اسپاسم مثانه به دنبال اقدامات جراحی از طریق میزراه.
عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، سرگیجه، طپش قلب، تاری دید، خشکی دهان، بیوست، احتباس ادراری و ناتوانی جنسی.

Oxytetracycline**اکسی تتراسیکلین**

گروه دارویی: آنتی بیوتیک گروه تتراسیکلین
اشکال دارویی موجود در ایران: کپسول و تزریقی
مقدار و روش مصرف: دارمان عفونت: ۵۰۰ - ۲۵۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۱۲ - ۶ ساعت، ۱۰۰ میلی گرم از راه تزریق عضلانی هر ۱۲ - ۸ ساعت، ۵۰۰ - ۲۵۰ میلی گرم از راه وریدی هر ۱۲ ساعت
موارد عمدۀ استعمال دارو: موارد مصرف آن شبیه تتراسیکلین است.
عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، سمیت کلیه و دانه‌های پوستی.

Oxytocin**اکسی توسین**

اشکال دارویی موجود در ایران: تزریقی
مقدار و روش مصرف: جهت القاء و تحریک زایمان: در ابتدا ۲ - ۱ میلی یونیت در دقیقه از راه انفوژیون وریدی سپس به تدریج به مقدار آن افزوده می‌شود تا نتیجه مطلوب به دست آید.
موارد عمدۀ استعمال دارو: تحریک رفلکس خروج شیر در مادران شیرده، تسريع سقط اجتناب ناپذیر یا ناقص یا فراموش شده، تحریک انقباضات رحمی در مرحلۀ سوم زایمان، کنترل خونریزی پس از زایمان و تسريع کوچک شدن رحم پس از زایمان.

عوارض جانبی مهم : در جلین : برادی کاردی و سایر بی نظمی های قلبی ، خونریزی داخل جمجمه ، یرقان و ترومای (آسیب) ناشی از خروج سریع از لگن . در ماده : پارگی رحم ، بی نظمی های قلبی ، تهوع ، استفراغ ، افزایش جریان خون ، خونریزی پس از زایمان و حساسیت شدید به دارو .

Pancreatin پانکراتین

گروه دارویی : آنزیم پانکراس ، هضم کننده
اشکال دارویی موجود در ایران : قرص پوشش دار روهدای
مقدار و روش مصرف : در بی کفایتی پانکراس : ۱-۳ قرص از راه خوراکی قبل از هر وعده غذا یا همراه وعده های غذایی و خوراک مختصر
موارد عمدۀ استعمال دارو : کمک به هضم غذا در وضعیت های همراه با کمبود آنزیم های پانکراس نظیر برداشتن پانکراس یا معده و نیز پانکراتیت مزمن .
عوارض جانبی مهم : بی اشتهاایی ، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، حساسیت شدید به دارو و زخم دهانی و مقعدی .

(Para Amino Benzoic Acid) PABA پارا آمینو بنزوئیک اسید

گروه دارویی : ضد آفات
اشکال دارویی موجود در ایران : لوسيون و بالک (Bulk)
مقدار و روش مصرف : هر ۲ ساعت یک بار مقداری از لوسيون روی نواحی پوستی در معرض آفتاب مالیده شود .
موارد عمدۀ استعمال دارو : جلوگیری از آفتاب سوختگی ، کاهش احتمال پیری زودرس و کاهش احتمال سرطان پوست .
عوارض جانبی مهم : درماتیت تماسی (التهاب پوست ناشی از تماس) آلرژیک .

Paracetamol (استامینوفن) پاراستامول

نیاز به تجویز پزشک : ندارد
گروه دارویی : ضد درد غیر اوپیوئیدی
میزان خطر در مصرف اضافی : بالا
اشکال دارویی موجود : قرص ، کپسول ، مایع و شیاف

زمان و دفعات مصرف : هر ۶-۴ ساعت یک بار - برای بچه‌ها کمتر از چهار بار در روز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو ظرف ۶۰-۱۵ دقیقه شروع می‌شود و تا ۶ ساعت در بدن فعل است.

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - گرچه همه کسانی که مقدار زیادی استامینوفن خورده‌اند نیاز به توجه جدی دارند اما در صورت مشاهده تهوع، استفراغ و درد معده اقدامات اورژانس لازم است - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی دارید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن مشکلی ایجاد نمی‌کند اما بدون اجازه پزشک بیش از ۴۸ ساعت از این دارو استفاده نکنید.

عوارض ناخواسته : اگر طبق دستور پزشک مصرف شود به ندرت ممکن است دچار عوارض شوید، گرچه ممکن است مصرف این دارو باعث تهوع شود.

تداخل‌های دارویی : کلستیرامین می‌تواند باعث کاهش جذب گوارشی و آثار دارویی استامینوفن شود - اگر دارو به طور منظم و با دوز بالا مصرف شود باید دوز وارفارین تصحیح شود.
صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی خطری ندارد.

پارومومایسین Paromomycin Sulfate

گروه دارویی : ضدآمیب، آنتی‌بیوتیک آمینوگلیکوزیدی
اشکال دارویی موجود در ایران : کپسول و شربت
مقدار و روش مصرف : در درمان عفونت آمیبی هاد و مزمد (۹۰دله؛ روزانه ۳۵-۲۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از راه خوراکی بعد از غذا هر ۸ ساعت یک بار و به مدت ۱۰-۵ روز

موارد عمده استعمال دارو : عفونت آمیبی حاد و مزمد، آلدگی با کرم‌های پهنه (ماهی، گاو، سگ و خوک)، سرکوب میکروب‌های روده و قبل از عمل جراحی.

عوارض جانبی مهم : سردرد، اسهال، درد شکم، تهوع، استفراغ، خارش، سمیت گوش و کلیه و سوزش سردهل.

پاروكستین Paroxetine

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدافسردگی

میزان خطر در مصرف اضافی : قرص
زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز (هنگام صبح)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آثار درمانی آن ظرف ۷-۱۴ روز ظاهر می‌شود اما آثار کامل ضدافسردگی دارو ۳ تا ۴ هفته طول می‌کشد . دارو تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز دانه‌های پوستی یا درد مفاصل ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث خواب آلودگی شود که باید بی‌درنگ به پزشک اطلاع دهید - تا زمانی که از اثرات آن بر روی خودتان مطلع نیستید ، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خواب آلودگی شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، ناراحتی قلبی و داشتن سابقه خانوادگی یا شخصی تشنج و نیز استفاده از داروهای دیگر پزشک را در جریان قرار دهید .

عوارض ناخواسته : تهوع ، خواب آلودگی ، تعریق ، لرز ، ضعف ، اختلالات جنسی ، اضطراب ، آشفتگی ، کاهش وزن ، اختلال در اشتها و عصبی شدن .

تداخل‌های دارویی : این دارو باعث افزایش اثر داروهای ضدانعقادی ، سمیت ضدافسردگی‌ها و اثر آرامبخشی آرامبخش‌ها می‌شود - در مصرف همزمان با (MAOIs) احتمال وقوع واکنش‌های خطرناک وجود دارد .

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است و در شیردهی نیز می‌تواند وارد شیر شود . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Pediatric Gripe

پدیاتریک گریپ

گروه دارویی : ضدسرماخوردگی کودکان

اشکال دارویی موجود در ایران : شربت
مقدار و روش مصرف : برای کودکان ۱۲-۶ سال : ۸ میلی‌لیتر ۴-۳ بار در روز . برای کودکان ۶-۱ سال : ۴ میلی‌لیتر ۴-۳ بار در روز . برای کودکان ۱۲-۶ ماه : ۲ میلی‌لیتر ۴-۳ بار در روز

موارد عمده استعمال دارو : رفع احتقان بینی و شیپور استاش در سرماخوردگی‌ها ، سینوزیت - عفونت‌های حاد مجاری تنفسی فوقانی و رفع علائم رینیت .

عوارض جانبی مهم : سرگیجه ، تپش قلب ، تهوع ، رخوت ، رنگ‌پریدگی ، بی‌قراری ، بی‌نظمی قلبی ، خواب آلودگی ، خشکی دهان ، تاری دید و بی‌اشتهاایی .

Penicilamine**پنی سیلامین**

گروه دارویی: شلات کننده ، ضدروماتیسم
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش دار دارای شیار
مقدار و روش مصرف: درمان (وماتیسم مفصل) : ۱۲۵ - ۲۵۰ میلی گرم در روز . در درمان مسلامه میت با هلازات سنگین : ۱۵۰۰ - ۵۰۰ میلی گرم در روز به مدت یک ماه
موارد عمدۀ استعمال دارو: بیماری ویلسون ، جهت کاهش دفع سیستئین به داخل ادرار در بیماری سیستینوری و درمان مرحله حاد روماتیسم مفصلی .
عوارض جانبی مهم: خستگی ، بی قراری ، علائم خارج هرمی ، کاهش فشارخون ، اسهال ، بیوست ، ناتوانی جنسی و عدم آگاهی نسبت به زمان و مکان .

Penicillin 6.3.3**پنی سیلین ۶-۳-۳**

اشکال دارویی: پنی سیلین طبیعی ، آنتی بیوتیک
مقدار و روش معرف: عفونت های شدید و هاد : یک ویال پنی سیلین ۳-۳-۶ از راه تزریق عضلانی عمیق . **عفولت های مزمن عارضه دار:** یک ویال پنی سیلین ۳-۳-۶ از راه تزریق عمیق عضلانی هر ۵-۴ روز یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو: عفونت های ناشی از باکتری های حساس به پنی سیلین مخصوصاً استرپتوکوک گروه A و پنوموکوک .
عوارض جانبی مهم: حساسیت شدید به این دارو ، بی نظمی و ایست قلبی ، تب ، کهیر ، عفونت های اضافی به ویژه عفونت کاندیدایی ، درد و التهاب و آبسه در محل تزریق ، سرفه و احساس ناخوشی .

Penicillin G**پنی سیلین جی**

گروه دارویی: پنی سیلین طبیعی ، آنتی بیوتیک بتالاکتان
اشکال دارویی موجود در ایران: ویال تزریقی (به صورت ملح یک میلیون واحد و ۵ میلیون واحد پتابسیم و ملح ۵ میلیون واحد سدیم)
مقدار و روش مصرف: در درمان عفولت های شدید تا متوسط : ۵ میلیون واحد در روز از راه تزریق عضلانی یا وریدی

موارد عمده استعمال دارو : عفونت‌های متوسط تا شدید ناشی از باکتری‌های حساس به پنی‌سیلین - به عنوان درمان پیشگیری در مبتلایان به روماتیسم قلبی .

عوارض جانبی مهم : افزایش سطح پتاسیم خون ، حساسیت شدید به این دارو ، بی‌نظمی و ایست قلبی ، تب ، کهیز ، عفونت‌های اضافی به ویژه عفونت کاندیدایی ، درد و التهاب و آبسه در محل تزریق ، سرفه و احساس ناخوشی .

پنی‌سیلین جی بنزاتین (پنی‌سیلین بلند اثر)

Penicillin G Benzathin (Penicillin L . A)

گروه دارویی : پنی‌سیلین طبیعی ، آنتی‌بیوتیک بتالاکتم

اشکال دارویی موجود در ایران : ویال تزریقی

مقدار و روش مصرف : در درمان عفونت‌های خفیف تا متوسط : یک عدد ویال ۱/۲۰۰/۰۰۰ واحدی به صورت دوز واحد . **جهت پیشگیری از تب (روماتیسم) :** یک عدد ویال ۱/۲۰۰/۰۰۰ واحدی هر ماه یک بار به صورت عضلانی .

موارد عمده استعمال دارو : عفونت‌های بسیار حساس به پنی‌سیلین G نظیر : عفونت‌های استافیلوکوکی ، پنوموکوکی و اسپرپتوکوکی - بیماری‌های آمیزشی مثل سیفلیس و سوزاک - درمان پیشگیری برای تب روماتیسمی .

عوارض جانبی مهم : درد موضعی ، عفونت‌های اضافی ، حساسیت بیش از حد به این دارو ، لرز ، تب ، حساسیت و تب همراه با تزریق عضلانی .

Penicillin G Procaine

پنی‌سیلین جی پروکائین

گروه دارویی : آنتی‌بیوتیک بتالاکتم ، پنی‌سیلین طبیعی

اشکال دارویی موجود در ایران : ویال تزریقی (به صورت ویال ۴۰۰/۰۰۰ و ۸۰۰/۰۰۰ واحد)

مقدار و روش مصرف : در درمان عفونت‌های متوسط تا شدید ۱۲۰۰۰۰ - ۶۰۰۰۰ واحد (U) از راه عضلانی یک بار در روز

موارد عمده استعمال دارو : عفونت‌های متوسط تا شدید ناشی از باکتری‌های حساس به پنی‌سیلین جی که به غلظت سرمی پائین اما درازمدت پنی‌سیلین حساس هستند .

عوارض جانبی مهم: آشفتگی‌های روانی، ترس از مرگ قریب الوقوع، ضعف، وزوز گوش، طعم‌های غیرعادی، طپش قلب و حساسیت بیش از حد به این دارو.

Penicillin V Potassium پنی‌سیلین وی

گروه دارویی: پنی‌سیلین طبیعی، آنتی‌بیوتیک بتالاکتان
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش‌دار و سوسپانسیون خوراکی
مقدار و روش مصرف: درمان عفونت‌های خفیف تا متوسط ۱۲۵-۵۰۰ میلی‌گرم از راه خوراکی هر ۶ ساعت یک بار
موارد عمده استعمال دارو: جهت درمان عفونت‌های خفیف تا متوسط ناشی از استرپتوکوک‌ها و پنوموکوک‌ها و استافیلوکوک‌های حساس و پیشگیری از تب روماتیسمی.
عوارض جانبی مهم: حساسیت بیش از حد به این دارو، ناراحتی سردل، تهوع، اسهال، استفراغ، بثورات جلدی و عفونت‌های اضافی.

Permethrin پرمترین

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

گروه دارویی: ضدانگل پوستی
میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: کرم و شکل مایع با کاربرد موضعی
زمان و دفعات مصرف: یک بار در روز و دوز بعدی آن، یک هفته بعد تکرار شود. از تماس دارو با چشم و پوست عفونی یا آسیب‌دیده جلوگیری شود.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: شکل مایع برای درمان شیش بعد از ۱۰ دقیقه شسته شود. کرم برای درمان جرب باید ۸-۱۲ ساعت بعد شسته شود و تا زمان شسته شدن دارو در بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو: دارو در ظرف درسته، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورت بلعیده شدن مقداری از این دارو، اقدامات اورژانس لازم است - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو معمولاً برای مدت محدودی تجویز می‌شود و نباید به صورت بلندمدت از آن استفاده کرد.

عوارض ناخواسته: تحریک پوستی ، قرمزی ، احساس گزش در پوست و دانه‌های پوستی .
تداخل‌های دارویی : ندارد .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی بی‌ضرر بودن آن به اثبات نرسیده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Perphenazine پرفنازین

گروه دارویی: ضداستفراغ ، ضدجنون
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش‌دار و آمپول
مقدار و روش صرف: در افتلالات سایکوتیک (ناشی از جنون) : ۱۶-۴ میلی‌گرم از راه خوراکی ۴-۲ بار در روز . در روش عضلانی ۵ میلی‌گرم هر ۶ ساعت . **جهت تهوع:** ۱۶-۸ میلی‌گرم از راه خوراکی ۴-۲ بار در روز
موارد عمده استعمال دارو: کنترل علامتی اسهال و استفراغ شدید ، سکسکه بهبود نیافتنی و اختلالات سایکوتیک .

عوارض جانبی مهم: علائم خارج هرمی ، کاهش فشارخون وضعیتی ، تاری دید ، یبوست ، خشکی دهان ، افزایش اشتها و درد در محل تزریق .

Phenazopyridine HCL فنازوپیریدین

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش‌دار
مقدار و روش صرف: ۲۰۰-۱۰۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ۳ بار در روز
موارد عمده استعمال دارو: تسکین درد ، سوزش ، تکرار و اضطرار در هنگام ادرار کردن در اثر عفونت ، تحریک مجرای ادرار ، ضربه و جراحی .
عوارض جانبی مهم: سردرد ، اختلالات خفیف گوارشی ، ایجاد سنگ‌های کلیوی و تغییر رنگ ادرار .

Phenobarbital فنوباربیتال

نیاز به تجویز پزشک: دارد
اشکال دارویی موجود: مایع ، تزریقی و قرص
گروه دارویی: ضدتشنج دسته باربیتورات
میزان خطر در صرف اضافی: بالا

زمان و دفعات مصرف : ۳-۱ بار در روز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : شکل خوراکی ظرف ۶۰-۳۰ دقیقه شروع به اثر می‌کند و ۲۴-۴۸ ساعت در بدن فعال است .
نحوه نگهداری از دارو : دارو باید در جای خشک و خنک ، در ظرف دربسته و دور از دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت ایجاد راش یا تورم ، بدون هماهنگی با پزشک مصرف این دارو را متوقف نکنید - همه موارد مصرف اضافی این دارو نیازمند توجه جدی است اما در صورت ایجاد ضعف شدید ، بی‌ثبتاتی ، اغتشاش ذهنی و کاهش هوشیاری ، اقدامات اورژانس لازم است - کاهش دقت و هوشیاری ناشی از مصرف اضافی آن ، منع برای مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس است - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، بیماری‌های قلبی ، ضعف گردش خون ، پورفیری و مشکلات تنفسی ، پزشک را در جریان قرار دهید - بعد از شروع مصرف این دارو ممکن است شخص دچار خواب آلودگی و کرختن بیش از حد شوید که مصرف بلندمدت می‌تواند باعث افزایش تطابق بدن با این دارو و کاهش اثرات آن شود .

عوارض ناخواسته : خواب آلودگی ، ناپایداری ، سرگیجه ، غش و اغتشاش ذهنی .

تداخل‌های دارویی : این دارو باعث کاهش اثر کورتون‌ها ، ضدانعقادها و ضدبارداری‌های خوراکی می‌شود - ضدجنون‌ها و ضدافسردگی‌ها اثر ضدتشنج این دارو را کاهش می‌دهند - همه آرامبخش‌ها اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می‌دهند .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری ممکن است با اثر روی جنین تمایل به خونریزی را در نوزاد گسترش دهد . در این خصوص باید با پزشک مشورت کنید . در شیردهی می‌تواند وارد شیر شده باعث خواب آلودگی شیرخوار شود .

Phenylephrine Compound

فنیل افرین کامپاند

اشکال دارویی موجود در ایران : قطره چشمی

گروه دارویی : ضداحتقان

مقدار و روش مصرف : چکاندن ۱-۲ قطره ۳ بار در روز به داخل ملتحمه چشم

موارد عمده استعمال دارو : التهاب خفیف ملتحمه چشم ، تحریک چشم و آرژی‌ها .

Phenylephrine HCL

فنیل افرین (مخصوص بینی)

گروه دارویی : آگونیست آلفا - آدرنرژیک ، ضداحتقان

اشکال دارویی موجود در ایران: قطره بینی

مقدار و روش مصرف: جهت رفع احتقان بینی ۳ - ۲ قطره از محلول ۰/۵ - ۰/۲۵٪ داخل هر سوراخ بینی
موارد عمدۀ استعمال دارو: برطرف ساختن احتقان بینی، رینیت ناشی از سرماخوردگی یا آلرژی و
 احتقان سینوس‌ها یا شیپوراستاش.

عوارض جانبی مهم: درد ابرو، اشک ریزش، تاری دید، سوزش، گزکز، طپش قلب، لرز، تعریق،
 رنگ پریدگی، احساس پری در سر، اضطراب و سوزن سوزن شدن انتهاهایا.

Phenyephrine HCL فنیل افرین (چشمی)

گروه دارویی: آگونیست آلفا - آدرنرژیک، گشادکننده مردمک‌ها، ضداحتقان، تنگ‌کننده رگ‌ها

اشکال دارویی موجود در ایران: قطره استریل چشمی

مقدار و روش مصرف: چکاندن یک قطره از محلول قبل از انجام معاینه به داخل چشم
موارد عمدۀ استعمال دارو: به عنوان گشادکننده مردمک در معاینات افتالموسکوپیک یا جراحی و
 برای تسکین التهاب عنیبه (یووئیت).

عوارض جانبی مهم: اشک ریزش، درد ابرو، تاری دید، آلرژی ملتحمه چشم، عطسه، طپش قلب،
 افراش فشارخون، لرز، رنگ پریدگی، اضطراب و سوزن سوزن شدن انتهاهایا.

Phenylpropanolamine فنیل پروپانول آمین

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

گروه دارویی: ضداحتقان

میزان خطر در مصرف اضافی: بالا

اشکال دارویی موجود: قرص، مایع، کپسول و قرص کندآزادشونده

زمان و دفعات مصرف: ۴ - ۳ بار در روز - قرص‌های کندآزادشونده دو بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: دارو ظرف ۳۰ دقیقه اثر می‌کند و ۶ - ۴ ساعت
 در بدن فعال است. کپسول‌های کندآزادشونده ۱۲ ساعت در بدن فعالند.

موارد منع مصرف و احتیاط: هر وقت خواستید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - همه موارد
 مصرف اضافی این دارو نیازمند توجه جدی است اما در صورت وقوع تشنج یا کاهش هوشیاری و
 هذیان، اقدامات اورژانس لازم است - تا از اثرات آن بر روی خودتان مطلع نیستید از رانندگی و

کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود . در صورت ابتلا به فشارخون بالا . بیماری‌های قلبی ، گلوكوم ، پرکاری تیروئید ، دیابت ، ناراحتی‌های ادراری و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن تجویز نمی‌شود چون ممکن است باعث افزایش فشارخون و بزرگ شدن قلب شود .

عوارض ناخواسته : دوز بالای این دارو می‌تواند باعث اضطراب ، سرگیجه ، تهوع و به ندرت افزایش فشارخون ، تپش قلب ، سردرد و اشکال در تنفس شود .

تداخل‌های دارویی : مصرف آن همراه با سمپاتومیمتیک‌ها ، باعث افزایش آثار جانبی این دارو می‌شود - مصرف همزمان با بتابلوکرها باعث افزایش فشارخون می‌شود - مصرف همزمان ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای با این دارو ، احتمال ایجاد ریتم غیرطبیعی قلب و افزایش فشارخون را افزایش می‌دهد .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری به اثبات نرسیده و در شیردهی وارد شیر می‌شود . در هر مورد با پزشک مشورت کنید .

Phenytoin

فنی‌توئین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدتشنج

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : مایع ، تزریقی ، قرص و کپسول

زمان و دفعات مصرف : ۱-۳ بار در روز همراه با غذا یا مقداری آب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر کامل ضدتشنج آن ظرف ۱۰-۷ روز نمایان می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب : در صورت ادامه درمان با این دارو ممکن است کمبود ویتامین D و اسید فولیک ایجاد شود لذا رژیم متعادل شامل سبزیجات تازه رعایت شود .

نحوه نگهداری از دارو : این دارو را در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مصرف اضافی آن ممکن است باعث خواب‌آلودگی غیرعادی ، اغتشاش ذهنی و بریده‌بریده شدن تکلم شود که باید به پزشک اطلاع دهید - بیماری اصلی شما در کنار عوارض فنی‌توئین امکان انجام کارهای حساس و رانندگی را منتفی می‌سازد که باید به پزشک اطلاع دهید - در صورت ابتلا به پورفیری و مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و

نیز استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث ناهنجاری‌های خونی و عوارض نامطلوب روی پوست، لثه‌ها و استخوان‌ها شود.

عوارض ناخواسته: سرگیجه، سردرد، اغتشاش ذهنی، تهوع، بی‌خوابی، افزایش رویش مو در بدن، رشد بیش از حد لثه‌ها و دانه‌های پوستی از عوارض مصرف بلندمدت این دارو هستند.

تداخل‌های دارویی: بسیاری از داروها با این دارو تداخل کرده سطح خونی آن را کاهش یا افزایش می‌دهند. قدرت اثر وارفارین به وسیله این دارو تغییر می‌کند - این دارو سطح خونی سیکلوسپورین را کاهش می‌دهد - ضدافسردگی‌ها و ضدجنون‌ها اثر فنی تؤیین را کاهش می‌دهند.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری باعث اختلالاتی در جنین می‌شود و تمایل به خونریزی را در نوزاد افزایش می‌دهد. در شیردهی نیز می‌تواند وارد شیر شود که باید در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Pilocarpine پیلوکارپین

گروه دارویی: میوتیک‌ها (مورد استفاده در درمان گلوکوم (آب سیاه))

میزان خطر در مصرف اضافی: کم
نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: قرص، قطره چشمی و اکوسرت (SR - Inserts) Ocusert

زمان و دفعات مصرف: قطره چشمی ۶-۳ بار در روز برای گلوکوم مزمم - در گلوکوم حاد هر پنج دقیقه تکرار می‌شود تا بیماری تحت کنترل قرار گیرد - اکوسرت (Ocuserts) هر هفت روز یک بار هنگام خواب - قرص ۳ بار در روز بعد از غذا همراه مقدار زیادی آب.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۱۵-۳۰ دقیقه اثر دارو شروع می‌شود. قرص ۴-۸ هفته، قطره چشمی ۳-۸ ساعت و اکوسرت ۷ روز در بدن فعال است.

نحوه تهداری از دارو: قطره چشمی یک ماه بعد از باز شدن خراب می‌شود. قطره و قرص را در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقدار زیاد آن می‌تواند باعث قرمزی، افزایش ترشح بزاق و افزایش ترشح عرق شود که باید به پزشک اطلاع دهید - تا زمانی که از اثر این دارو بر روی خود مطلع نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث کوتاه شدن دید و ضعف در دید شبانه شود - در صورت ابتلا به آسم، ورم چشم‌ها،

ناراحتی‌های قلبی یا گوارشی یا کبدی و در صورت استفاده از داروهای دیگر یا استفاده از لنزهای تماسی، پزشک را در جریان قرار دهید - اثرات جانبی آن در اثر مصرف بلندمدت کاهش می‌یابند.

عوارض ناخواسته: تاری دید، ضعف دید در شب، چشم درد، درد در ناحیه ابرو، حرکت پلک‌ها، قرمزی و آبریزش چشم.

تداخل‌های دارویی: بتابلوکرهای اثر این دارو را کاهش می‌دهند - طیف وسیعی از داروها مثل آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی، کلیندامایسین، کلروکین، کلیستین، کینین و پروکائین آمید می‌توانند آثار این دارو را بلوکه کنند - مسدود کننده‌های کانال کلسیم، اثرات سیستمیک پیلوکارپین را افزایش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری جهت درمان گلوكوم اشکالی ندارد. در شیردهی مقدار معمولی دارو اشکالی ایجاد نمی‌کند.

Piperazine Hexahydrate

پیپرازین

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص و شربت

گروه دارویی: ضدکرم

مقدار و روش مصرف: درمان گرد گرد: روزانه ۳/۵ گرم از راه خوراکی به مدت ۲ روز. درمان گرد های سنجاقی: ۶۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۷-۸ روز

موارد عمده استعمال دارو: آلودگی با کرم سنجاقی (اکسیور یا کرمک) و آلودگی با کرم گرد یا آسکاریازیس (آسکاریس لومبریکوئیدس).

عوارض جانبی مهم: در صورت مصرف زیاد می‌تواند باعث عوارضی مثل ضعف عضلانی، لرز، آب مروارید، آبریزش بینی، تهوع، استفراغ، کهیر و حساسیت به نور شود.

Piracetam

پیراستام

گروه دارویی: محرک مغزی

اشکال دارویی موجود در ایران: مایع و قرص پوشش‌دار

مقدار و روش مصرف: ۸۰۰ میلی‌گرم از قرص یا ۱ گرم از شربت از راه خوراکی سه بار در روز قبل از غذا

موارد عمده استعمال دارو: شوک بعد از ضربه مغزی، سرگیجه حقیقی با منشا مرکزی، صدمات عروقی مغز و اختلال در دقت و توجه و یادآوری در افراد مسن.

عوارض جانبی مهم: تشنجه، سردرد، بی‌قراری، تهوع، استفراغ و بی‌اشتهاای.

Piroxicam

پیروکسیکام

گروه دارویی: ضدالتهاب غیراستروئیدی، داروی ضدنقرس

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: قرص، کپسول، تزریقی، ژل و شیاف

زمان و دفعات مصرف: ۱-۳ بار در روز همراه غذا یا مقدار فراوان آب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: اثر ضددرد ظرف ۳-۴ ساعت، اثر کامل ضدالتهاب در آرتربیت ظرف ۲-۴ هفته و اثر ضدنقرس ظرف ۴-۵ روز ظاهر می‌شود. دارو ۲ روز در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: در صورت مصرف کوتاه مدت، هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را قطع کنید اما در صورت مصرف بلندمدت برای درمان آرتربیت، بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث تهوع و استفراغ شود که باید با پزشک مشورت کنید - تا زمانی که از اثر آن بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - در صورت ابتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی، مشکلات قلبی، فشارخون بالا، پورفیری، آسم، حساسیت به آسپیرین و نیز اگر سابقه ازوفاژیت یا زخم معده دارید یا از داروی دیگری استفاده می‌کنید پزشک را در جریان قرار دهید - در صورت مصرف بلندمدت آن، خطر خونریزی از زخم معده و روده افزایش می‌یابد.

عوارض ناخواسته: سرگیجه، سردرد، درد و ورم پا، مشکلات گوارشی و شکم درد.

تداخل‌های دارویی: مصرف هم‌زمان این دارو با داروهایی مانند افلوکساسین، نورفلوکساسین و سیپروفلوکساسین خطر تشنج را افزایش می‌دهد - این دارو با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، کورتون‌ها و خدائعقادهای خوراکی تداخل کرده باعث افزایش احتمال خونریزی گوارشی و زخم معده می‌شود - این دارو باعث افزایش سطح خونی لیتیم می‌شود - این دارو توانایی کاهش آثار مفید دیورتیک‌ها و خدفشارخون‌ها را دارد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود اما با پزشک مشورت شود و در شیردهی گرچه می‌تواند وارد شیر شود اما مصرف معمولی آن اشکالی ندارد.

Pizotifen

پیزوتیفن

نیاز به تجویز پزشک: ندارد

گروه دارویی: ضدمیگرن

اشکال دارویی موجود: مایع و قرص

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: یک بار هنگام شب یا ۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: آثار مفید دارو چندین روز بعد از شروع مصرف ظاهر می‌شود و دارو چندین هفته در بدن فعال باقی می‌ماند.

رزیم غذایی مناسب: از مصرف غذاهایی که باعث شروع میگرن می‌شوند پرهیز کنید.

نحوه نگهداری از دارو: دارو را در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقدار زیاد آن می‌تواند باعث خوابآلودگی، تهوع، تپش قلب و تشنج شود که باید با پزشک در میان بگذارید - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خوابآلودگی شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کلیوی، بیماری‌های پروستات، گلوکوم و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث افزایش وزن شود.

عواض ناخواسته: خوابآلودگی، افزایش اشتها، افزایش وزن، تاری دید، خشکی دهان، تهوع، سرگیجه و درد عضلانی.

تداخل‌های دارویی: اثر دارو با ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای و سایر داروهای آرامبخش، افزایش می‌باید - مصرف هم‌زمان با ضدافسردگی‌های مهارکننده مونوآمینو اکسیداز (MAOIs) باعث بالا رفتن خطرناک فشارخون می‌شود - همه داروهای دارنده اثر آرامبخش، اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می‌دهند - اثر آنتی‌کولینرژیک این دارو توسط دیگر داروهای ضدکولینرژیک تشدید می‌شود.

صرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده و مصرف مقادیر معمولی آن در شیردهی اشکالی ندارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Podophyllin**پودوفیلین**

اشکال دارویی موجود در ایران: بالک (Bulk)

گروه دارویی: داروی پوستی، کراتولیتیک

مقدار و روش مصرف: درمان **زگیل مقابله‌ای:** محلول ۱۰ درصد ۲-۱ بار در هفته و حداقل تا ۴ بار.

درمان زگیل محمولی: محلول ۵ درصد ۵ - ۱ بار در روز به طور موضعی

موارد عمده استعمال دارو: توده‌های دارای (شد فوش فیم مثل: زگیل‌های ناحیه تناسلی خارجی، زگیل‌های اطراف مقعد، پاییلوم‌ها و فیبروئیدها).

عوارض جانبی مهم : مسمومیت شدید و حتی کشنده ، سرکوب مغز استخوان ، اغتشاش ذهنی ، پریشانی ، خواب آلودگی پیشرونده ، اغما ، توهمات بینایی و شنوایی ، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، درد شکمی و احتباس ادراری .

Polymyxin B Sulfate

پلی میکسین

گروه دارویی : آنتی بیوتیک

اشکال دارویی موجود در ایران : پودر جهت تهیه محلول تزریقی وریدی و پودر جهت تهیه محلول موضعی چشمی

مقدار و روش مصرف : قطره چشمی : چکاندن ۳ - ۱ قطره از محلول ۲۵ - ۱۰ هزار واحد در هر میلی لیتر ، هر ساعت یک بار تا حصول نتیجه مناسب در داخل چشم . شکل تزریقی : روزانه ۲۵ - ۱۵ هزار واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ، به صورت وریدی ، هر ۱۲ ساعت یک بار یا روزانه ۲۵ - ۳۰ هزار واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ، هر ۶ - ۴ ساعت یک بار به صورت عضلانی

موارد عمده استعمال دارو : در درمان عفونت‌های حاد مجرای ادراری ، جریان خون و منژ (پرده‌های مغز) تجویز می‌شود - شکل موضعی آن در درمان عفونت‌های چشم مصرف می‌شود .

عوارض جانبی مهم : تحریک پذیری ، برافروختگی صورت ، خواب آلودگی ، سرگیجه ، بی‌حسی اطراف دهان ، تاری دید ، صحبت کردن مبهم ، تشنج ، تضعیف تنفس ، سردد ، خارش ، کهیز ، اختلالات الکترولیتی و اختلالات گوارشی .

Povidone Iodine

پوویدون آیودین (بتادین)

گروه دارویی : ضد عفونی کننده موضعی

اشکال دارویی موجود در ایران : دهان‌شویه ، شامپو ، پماد موضعی ، محلول موضعی ، ژل واژینال و دوش واژینال

مقدار و روش مصرف : پیشگیری و درمان عفونت‌های سطحی : مقدار کافی از دارو به طور موضعی استعمال شود . درمان التهاب واژن یا شستشوی آن قبل از هر آن : دوش و ژل واژینال به مدت ۴ - ۲ هفته حتی در خلال عادت ماهیانه

موارد عمده استعمال دارو : پیشگیری و درمان عفونت‌های سطحی - ضد عفونی کردن موضعی سوختگی‌ها ، خراشیدگی‌ها ، بریدگی‌ها و جراحات کوچک - درمان واژینت (عفونت و التهاب مجرای تناسلی زنانه) .

عوارض جانبی مهم : در سوختگی‌های وسیع می‌تواند جذب بدن شده باعث اسیدوز متابولیک و اختلال فعالیت کلیه شود.

Pravastatine

پراواستاتین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : پایین‌آورنده چربی خون

اشکال دارویی موجود : قرص

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : یک بار در شبانه‌روز (هنگام شب)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف دو هفته دارو اثر می‌کند و ۲۴ ساعت در بدن فعال است.

رژیم غذایی مناسب : رژیم غذایی کم چربی توصیه می‌شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک، مصرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث مشکلات کبدی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مشکلات کبدی دارید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند روی کارکرد کبد اثر کند.

عوارض ناخواسته : تهوع، سردرد و خستگی، عوارض شایع اما خفیف هستند.

تداخل‌های دارویی : این دارو می‌تواند اثر ضدانعقادها را افزایش دهد - مصرف همزمان دارو با ضدقارچ‌ها مانند کتونازول و ایتراکونازول و دیگر داروهای ضدچربی مانند فیبرات‌ها و مهارکننده‌های ایمنی، خطر آسیب‌دیدگی عضلانی را افزایش می‌دهند - اورلیستات می‌تواند باعث افزایش سطح خونی و در نتیجه سمیت پراواستاتین شود.

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن دارو در بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Prazosin

پرازوسین

گروه دارویی : ضدفسارخون، آنتاگونیست آلفا - آدرنرژیک، گشادکننده عروق

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص و قرص دارای شیار

مقدار و روش مصرف : جهت درمان هشدارهای خوابی: ابتدا ۱ میلی‌گرم از راه خوراکی قبل از خواب و سپس

۱ میلی‌گرم هر ۸-۱۲ ساعت یک بار

موارد عمده استعمال دارو: درمان فشارخون، درمان پدیده رینود و درمان بزرگی خوشخیم پروستات (BPH).

عوارض جانبی مهم: سرگیجه، سردرد، خواب آلودگی، طپش قلب، تهوع، خشکی دهان، اسهال، استفراغ، تاری دید، احتقان و خونریزی بینی.

Prednisolone

پردنیزولون

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: کورتون

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: قرص، تزریقی، شیاف، قطره چشمی و گوش، شکل مورد استفاده از راه تنقیه و کف

زمان و دفعات مصرف: شکل خوراکی ۱-۲ بار در روز همرا غذا و قطره چشم یا گوش: ۲-۴ بار در روز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: دارو ظرف ۲-۴ روز اثر می‌کند و ۱۲-۷۲ ساعت در بدن فعال است.

رزیم غذایی مناسب: در مصرف بلندمدت دارو رژیم غذایی کم سدیم و پرپتاسیم توصیه می‌شود.

نحوه نگهداری از دارو: این دارو باید در جای خشک و خنک، در ظرف دربسته و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به زخم معده، گلوکوم، بیماری سل، افسردگی، انواع عفونتها، پوکی استخوان و نیز استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث دیابت، گلوکوم، آب مروارید، اختلال رشد در بچه‌ها و پوکی استخوان شود.

عوارض ناخواسته: اختلال در هضم غذا، آکنه، افزایش وزن، ضعف عضلانی، تغییرات خلقی و افسردگی.

تداخل‌های دارویی: این دارو روی اثر ضدانعقادها تأثیر دارد - اثر دیورتیک‌ها را افزایش می‌دهد - در صورت تجویز همزمان با واکسن‌ها احتمال واکنش‌های خطرناک و جدی وجود دارد - اثر انسولین، ضدفسارخون‌ها و ضددیابت‌های خوراکی را کاهش می‌دهد - ضدتشنج‌های کاریامازپین، فتوباربیتال و فنی تؤین اثر این دارو را کاهش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری : در شیردهی و بارداری ، مصرف قطره ، تزریق موضعی یا استفاده از دوز پایین دارو اشکالی ندارد . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Procainamide HCL

پروکائین آمید

گروه دارویی : ضدآریتمی‌های بطنی و فوق بطنی (ضدبی‌نظمی‌های قلبی)
اشکال دارویی موجود در ایران : کپسول ، قرص رتارد ، محلول تزریقی
مقدار و روش مصرف : در درمان تاکیکارדי بطنی : دوز مقدماتی ۱ گرم و دوز نگهدارنده ۶ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۳ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان فیبریلاسیون دهلیزی ، تاکیکارדי حمله‌ای دهلیزی و تاکیکارדי بطنی .
عوارض جانبی مهم : سرگیجه ، افسردگی ، جنون ، توهمندی ، افت شدید فشارخون ، برافروختگی ، تاکیکارדי ، تهوع ، درد عضلات ، درد مفاصل و تب .

Prochlorperazine

پروکلرپرازین

گروه دارویی : ضدجنون (سایکوز) ، ضداستفراغ
نیاز به تجویز پزشک : دارد
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط
اشکال دارویی موجود : قرص ، کپسول ، مایع ، پودر ، تزریقی ، شیاف و کپسول‌های کندآزادشونده
زمان و دفعات مصرف : شکل تزریقی ، شیاف و قرص ۲-۳ بار در روز و کپسول‌های کندآزادشونده (SR - Cap) ۱-۲ بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : خوراکی و شیاف در ۶۰ دقیقه و شکل تزریقی ظرف ۲۰ - ۱۰ دقیقه در بدن تأثیر می‌کنند . دارو ۶ - ۳ ساعت در بدن فعال است و فرآورده‌های کندآزادشونده آن تا ۱۲ ساعت در بدن فعال هستند .
تحوّه نگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته ، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : در صورتی که برای کنترل استفراغ از آن استفاده می‌کنید ، هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید ولی در صورتی که برای درمان بیماری‌های روانی از این دارو استفاده می‌کنید ، بدون مشورت با پزشک مصرف آن را قطع نکنید - تا زمانی که از اثرات آن بر روحی خود مطلع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث کاهش دقت ،

تمرکز و هوشیاری شود - در صورتی که مبتلا به مشکلات قلبی ، مشکلات کبدی یا کلیوی ، بیماری پارکینسون ، کم کاری تیروئید ، بیماری های پروستات و گلوكوم هستید یا اگر سابقه تشنج صرعی دارید یا از داروی دیگری نیز استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن (بیش از چند ماه) می تواند باعث اختلال حرکتی « تاردیودیسکنزی » شود .
عوارض ناخواسته : خواب آلودگی ، کرختی ، خشکی دهان و سرگیجه . بارزترین عارضه جانبی آن پارکینسونیزم است که در مصرف دوز بالای دارو ایجاد می شود .

تداخل های دارویی : آثار مفید داروهای ضدپارکینسون را مهار می کند - اثر داروهای آنتی کولینرژیک را تشدید می کند - اثر آرامبخشی داروهای دارای آرامبخش را افزایش می دهد .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن آن در بارداری به اثبات نرسیده و در شیردهی نیز نمی تواند وارد شیر شود . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Progesterone

پروژسترون

گروه دارویی : پروژستین (هورمون جنسی زنانه) **اشکال دارویی موجود در ایران :** آمپول مقدار و روش مصرف : درمان **توقف عادت ماهیانه** : ۱۰ - ۵ میلی گرم از راه تزریق عضلانی ، به مدت ۸ روز متوالی . درمان **فولریزی (همی)** : روزانه ۱۰ - ۵ میلی گرم از راه عضلانی ، به مدت ۶ روز موارد عمده استعمال دارو : توقف ثانویه عادت ماهیانه ، خونریزی فونکسیونل رحم ، اندومتریوز ، سندروم پیش از قاعده‌گی ، کنترل بارداری (به همراه استروژن‌ها) .

عوارض جانبی مهم : سردرد میگرنی ، سرگیجه ، خواب آلودگی ، دوبینی ، یرقان ، تهوع ، دردهای کرامپی شکم ، توقف خونریزی ، عادت ماهیانه دردناک ، آکنه ، ریزش مو و تغییرات وزن .

Promazine

پرومازین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضداضطراب

اشکال دارویی موجود : مایع ، قرص و تزریقی

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : ۴ بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۳۰ دقیقه تا یک ساعت اثر آن شروع می شود و ۶ - ۴ ساعت در بدن فعال است .

نحوه نگهداری از دارو: این دارو در ظرف دربسته، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث خوابآلودگی، سرگیجه، ناپایداری، تشنج و کما شود که باید به پزشک اطلاع دهید - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید، چون می‌تواند باعث خوابآلودگی و کاهش تمکن و هوشیاری شود - اگر مبتلا به بیماری‌های قلبی، مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، میاستنی گراو، فئوکروموموستیوم، بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های پروستات، گلوکوم، پارکینسونیزم و دیابت هستید یا سابقهٔ تشنج صرعی دارید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن (بیش از چند ماه) ممکن است منجر به برقان و حرکات غیرعادی شود.

عوارض ناخواسته: خوابآلودگی، خشکی دهان، بیوست و تاری دید. بارزترین عارضه در مصرف زیاد این دارو پارکینسونیزم می‌باشد.

تداخل‌های دارویی: پرومازین اثر ضدتشنج‌ها و ضدپارکینسون‌ها را کاهش می‌دهد - تمام داروهای آرامبخش، اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می‌دهند - در صورت مصرف همزمان با ضداستفراغ‌ها مانند متوكلوپرامید، خطر پارکینسونیزم افزایش می‌یابد.

صرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده، ولی مقادیر کم آن در شیردهی مشکلی ایجاد نمی‌کند. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

promethazine

پرومتازین

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضداستفراغ و آنتی هیستامین

اشکال دارویی موجود: قرص، مایع و تزریقی

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: برای درمان تهوع و استفراغ هر ۶-۴ ساعت - برای درمان علایم آلرژی هر روز ۱-۳ بار و یا یک بار هنگام شب - برای بیماری مسافت، شب قبل از سفر و صبح فردا و نیز در صورت نیاز هر ۸-۶ ساعت یک بار

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف یک ساعت اثر می‌کند و ۸-۱۶ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث خواب‌آلودگی، تشنجه، آشفتگی، ناپایداری و اغما شود که باید با پزشک مشورت کنید - تا زمانی که از اثرات این دارو بر روی خود مطلع نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خواب‌آلودگی شود - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری قلبی، گلوکوم، آسم، اختلالات ادراری، بیماری پارکینسون و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر یا داشتن سابقه تشنجه صرعی، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت این دارو می‌تواند باعث پارکینسونیزم شود.

عوارض ناخواسته: خواب‌آلودگی، کرختی، خشکی دهان و تاری دید.

داخل‌های دارویی: تمام داروهای دارنده اثر آرام‌بخش، اثر آرام‌بخشی این دارو را افزایش می‌دهند. مصرف هم‌زمان ضدافسردگی‌های گروه MAOIs و پرومتازین می‌تواند به واکنش‌های شدیدی منجر شود.

صرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده و در شیردهی مصرف مقادیر معمولی آن اشکالی ندارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Propranolol

پراپرونولول

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضداضطراب ، بتابلوکر

میزان خطر در مصرف اضافی : بالا

اشکال دارویی موجود: قرص ، مایع ، تزریقی و کپسول کندآزادشونده (SR - Cap)

زمان و دفعات مصرف : ۲-۴ بار در روز - کپسول‌های کندآزادشونده یک بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : قرص‌ها ۱-۲ ساعت بعد از استفاده اثر می‌کنند و ۱۲-۲۴ ساعت در بدن فعال هستند. کپسول‌ها ۳۰-۴۵ ساعت در بدن فعال هستند.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - تمامی موارد مصرف اضافی آن نیاز به توجه دارد اما در صورت ایجاد مشکلات تنفسی، کلاپس یا کاهش هوشیاری، اقدامات اورژانس لازم است - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، بیماری‌های تنفسی نظیر برونشیت یا آسم یا آمیزیم، دیابت، بیماری‌های قلبی، اختلال در گردش خون پاهای و نیز استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : سردی دست‌ها، سردی پاهای، خشکی چشم‌ها، درد عضله‌ها، خواب‌های پریشان، خستگی و تهوع .

تداخل‌های دارویی: سایمیدین و هیدرالازین اثر این دارو را افزایش می‌دهند - این دارو، اثر ضدفسارخون داروهای ضدفسارخون را تشدید می‌کند - مصرف هم‌زمان دارو با دیلتیازم یا وراپامیل باعث ایجاد عوارض نامطلوب روی قلب می‌شود - NSAID‌ها اثر ضدفسارخون این دارو را کم می‌کنند.

مصرف در شیردهی و بارداری: این دارو ممکن است روی جنین اثر بگذارد اما مصرف مقادیر معمولی آن در شیردهی اشکالی ندارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت شود.

Propylthiouracil

پروپیل تیوراسیل

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدتیروئید

اشکال دارویی موجود: قرص

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف: ۱-۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۲۰-۱۰ روز اثر دارو شروع می‌شود و ۳۶-۳۴ ساعت در بدن فعال است.

رزیم غذایی مناسب: از غذاهای حاوی ید کمتر استفاده شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث تهوع، استفراغ و سردرد شود که باید با پزشک در میان بگذارید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث کاهش گلbul‌های سفید خون شود.

عوارض ناخواسته: راش پوستی، خارش، تهوع، استفراغ، سردرد، درد مفاصل.

تداخل‌های دارویی: این دارو اثر داروهای ضدانعقادی را افزایش می‌دهد که در این صورت نیاز به تصحیح دوز دارو است.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری با احتیاط مصرف شود، زیرا مقدار زیاد آن می‌تواند باعث کم‌کاری تیروئید در جنین شود. در شیردهی وارد شیر شده روی شیرخوار اثر می‌گذارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Pseudoephedrine HCL

سودوافدرین

گروه دارویی: آگونیست آلفا و بتا آدرنرژیک، ضداحتقان

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص و مایع
مقدار و روش مصرف : ۰.۶ میلی‌گرم از راه خوراکی هر ۶-۴ ساعت
موارد عمدۀ استعمال دارو : تسکین احتقان بینی همراه با رینیت، زکام و سینوزیت -
 تسکین احتقان لوله استاش.

عوارض جانبی مهم : لرز، اختلال در ادرار کردن، طپش قلب، عصبی شدن، بی‌خوابی، بی‌حسی
 انتهایها، بی‌اشتهاای و خشکی دهان.

Psyllium پسیلیوم

گروه دارویی : ملین حجیم‌کننده مدفع
اشکال دارویی موجود در ایران : پودر (در بسته‌های ۳/۵ گرمی)
مقدار و روش مصرف : ۱-۲ قاشق چایخوری و در صورت نیاز ۳-۱ بار در روز
موارد عمدۀ استعمال دارو : بیوست مزمن، بیوست همراه با اختلالات رکتوم (راست روده)،
 سندرم کولون تحریک‌پذیر.

عوارض جانبی مهم : تهوع، استفراغ، اسهال، دردهای کرامپی شکم، انسداد مجرای گوارشی
 هنگامی که دارو به صورت خشک مصرف شود.

Pyrantel Pamoate پیرانتل پاموات

گروه دارویی : ضدکرم
اشکال دارویی موجود در ایران : قرص و سوسپانسیون خوراکی
مقدار و روش مصرف : جهت درمان اکسیور و کرم‌های گرد ۱۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن
 بدن از راه خوراکی به صورت دوز واحد
موارد عمدۀ استعمال دارو : آلدگی‌های کرم سنجاقی (اکسیور یا کرمک) و کرم گرد (آسکاریس).
عوارض جانبی مهم : سرگیجه، خواب‌آلودگی، بی‌اشتهاای، تهوع، استفراغ، اتساع شکم و دانه‌های پوستی.

Pyrithione Zinc زینک پیریتیون

گروه دارویی : ضدسبوره
اشکال دارویی موجود در ایران : شامپو کرم و شامپو لوسيون

مقدار و روش مصرف : ۱ یا ۲ بار در هفته روی پوست سر مالیده شود.

موارد عمدۀ استعمال دارو : برای کنترل شوره سر و درماتیت سبوره‌ای پوست سر

Pyrvinium Pamoate

پیروینیوم پاموات

گروه دارویی : ضدکرم

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص پوشش‌دار و سوسپانسیون خوارکی

مقدار و روش مصرف : ۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت دوز واحد

موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان آلدگی به کرمک (اکسیور)

عوارض جانبی معم : تهوع ، استفراغ ، اسهال ، تغییر رنگ مدفوع و استفراغ به قرمز روشن .

Quinine

کینین

گروه دارویی : ضدمالاریا و شلکننده عضلات

نیاز به تجویز پزشک : دارد

میزان خطر در مصرف اضافی : بالا

اشکال دارویی موجود : تزریقی و قرص

زمان و دفعات مصرف : برای درمان مalaria ، هر ۸ ساعت یک بار و برای کرامپ عضلانی یک بار در روز (هنگام خواب)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر ضدمالاریای آن ۱-۲ روز بعد و اثر شلکننده عضلانی آن ۲-۳ ساعت بعد از مصرف دارو ظاهر می‌شود.

نحوه تگهداری از دارو : در جای خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان و در ظرف دربسته نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : در صورت استفاده از آن برای بیماری مalaria ، بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورتی که مصرف مقادیر زیاد این دارو ، باعث اشکالات تنفسی ، تشنج و کاهش هوشیاری شود ، اقدامات اورژانس لازم است - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید ، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کلیوی ، نوریت اپتیک ، میاستنی گراو ، G6PD ، بیماری‌های قلبی و تینیتوس (شنیده شدن صدای زنگ در گوش‌ها) هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن برای گرفتگی شبانه پا و با دوز پایین مشکلی ایجاد نمی‌کند .

عوارض ناخواسته: سردرد، تاری دید، سرگیجه، صدای زنگ در گوش، کری موقت، تهوع و اسهال.

תداخل‌های دارویی: این دارو سطح خونی دیگوکسین را افزایش می‌دهد - سایمتیدین سطح خونی این دارو را افزایش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود. در شیردهی مصرف معمولی و کم دارو اشکالی ندارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Raloxifene

رالوكسیفین

گروه دارویی: مورد استفاده در بیماری‌های استخوانی
نیاز به تجویز پزشک: دارد
میزان خطر در مصرف اضافی: کم
اشکال دارویی موجود: قرص
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۱-۴ ساعت اثر دارو شروع می‌شود و ۴۸-۲۴ ساعت در بدن فعال است.
رزیم غذایی مناسب: بهتر است از فرآورده‌های حاوی کلسیم استفاده شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به خونریزی رحم و مشکلات کبدی یا کلیوی هستید یا سابقه لخته شدن خون در یکی از سیاهرگ‌های بدن را دارید و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو معمولاً به صورت بلندمدت مصرف می‌شود و مشکلی نیز ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته: گرگفتگی، گرفتگی پا و ورم پا. درد، حساسیت و ورم در پاهای می‌تواند نشانه ترومبوز در سیاهرگ‌های عمقی پا باشد که به اقدامات اورژانس نیاز دارد.

تداخل‌های دارویی: این دارو، اثر وارفارین و آسنوكومارل را کاهش می‌دهد - کلستیرامین جذب این دارو را به وسیله بدن کاهش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: برای زنانی که هنوز یائسه نشده‌اند تجویز نمی‌شود.

Ranitidine

رانیتیدین

گروه دارویی: ضدزخم معده
نیاز به تجویز پزشک: فقط شکل تزریقی نیاز به تجویز پزشک دارد.

میزان خطر در مصرف اضافی : کم اشکال دارویی موجود : قرص ، کپسول ، مایع خوراکی و تزریقی زمان و دفعات مصرف : یک بار در شبانه روز هنگام خواب و یا ۲-۳ بار در روز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف یک ساعت اثر می کند و تا ۱۲ ساعت در بدن فعال است .

نحوه تگهداری از دارو : در ظرف دربسته ، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن ، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و نیز استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : عبارتند از : سرگیجه ، تهوع ، استفراغ ، بیوست و اسهال که چندان نیز شایع نیستند .
تداخل های دارویی : این دارو جذب کتونازول را کاهش می دهد لذا باید بین مصرف این دو حداقل دو ساعت فاصله باشد - سوکرالفات (با دوز بالا) جذب این دارو را کاهش می دهد ، به همین دلیل باید بین مصرف این دو ، دو ساعت فاصله باشد .

صرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن آن در بارداری مشخص نیست و در شیردهی نیز به داخل شیر ترشح می شود ؛ لذا در هر دو مورد با پزشک مشورت شود .

Rifampicin ریفامپیسین

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدسل

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : تزریقی ، مایع ، قرص و کپسول

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز نیم ساعت قبل از صبحانه برای سل و جذام یا یک بار در ماه برای جذام - دو بار در روز برای پیشگیری از منژیت منگوکوکی - ۲-۴ بار در روز ۳۰ دقیقه قبل یا دو ساعت بعد از غذا ، برای درمان عفونت های جدی دیگر

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف چند روز اثر می کند و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

نحوه نگهداری از دارو : دارو را در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید و دوره درمانی آن را کامل کنید - مقادیر زیاد آن می تواند باعث تهوع ، استفراغ ، کرختی و آسیب دیدگی کبد شود که باید به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلاء به مشکلات بلندمدت کبدی ، استفاده از لنزهای تماسی و نیز استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می تواند باعث آسیب های کبدی شود .

عوارض ناخواسته : تغییر رنگ بدون ضرر قرمز - نارنجی در مایعات بدن ، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، گرفتگی و درد عضلات و یرقان .

تداخل های دارویی : این دارو می تواند اثر طیف وسیعی از داروها را کاهش دهد که برخی از آن ها عبارتند از فنی تئین ، ضدبارداری های خوراکی ، کورتون ها ، ضددیابت های خوراکی ، دیزوپیرامید و ضدانعقاد های خوراکی .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن بودن آن در بارداری ثابت نشده است و در شیردهی مصرف مقادیر معمولی آن اشکالی ندارد . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Ringers

رینکر

گروه دارویی : جانشین مایعات و الکترولیت ها

اشکال دارویی موجود در ایران : محلول قابل انفوژیون نیم و یک لیتری

مقدار و روش مصرف : گرچه مقدار مصرفی بر حسب وزن و وضعیت بالینی بیمار فرق می کند اما دوز معمول ۳-۱/۵ لیتر است که در مدت ۲۴-۱۸ ساعت از راه وریدی انفوژیون می شود .

موارد عمده استعمال دارو : به صورت انفوژیون وریدی برای مداوای از دست رفتن شدید آب و نمک در مواردی که پتاسیم بین سلولی کاهش یافته است .

عوارض جانبی مهم : افزایش بار مایعات ، افزایش سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و کلر خون .

Ringer Lactated

رینکر لاکتات

گروه دارویی : جانشین مایعات و الکترولیت ها

اشکال دارویی موجود در ایران : محلول قابل انفوژیون نیم و یک لیتری

مقدار و روش مصرف : براساس وزن بیمار و شرایط بالینی فرق می‌کند اما دوز معمول آن $3 - 5/1$ لیتر ($2 - 2$ درصد وزن بدن) است که از راه وریدی طی $18 - 24$ ساعت انفوژیون می‌شود.

موارد عمدۀ استعمال دارو : برقرار کردن تعادل آب و الکتروولیت بدن مخصوصاً قبل و بعد از جراحی.

عوارض جانبی مهم : افزایش بار مایعات، افزایش سدیم، پتاسیم، کلسیم و کلر در خون.

Rivastigmine**ریواستیگمین**

نیاز به تجویز پزشک : دارد	گروه دارویی : ضددمانس (زوال عقل)
اشکال دارویی موجود : کپسول	میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف $60 - 30$ دقیقه آثار دارو شروع می‌شود و $12 - 9$ ساعت در بدن فعال است.	زمان و دفعات مصرف : دو بار در روز

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث تهوع، استفراغ و اسهال شود که باید با پزشک در میان گذاشته شود - بیماری اصلی شما (دمانس) ممکن است امکان انجام کارهای حساس و رانندگی را منتفی سازد - اگر مبتلا به مشکلات قلبی، مشکلات کلیوی یا کبدی، آسم یا دیگر مشکلات تنفسی هستید یا قبل از دچار زخم معده بوده‌اید و نیز در صورتی که به طور مرتب از ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی (NSAIDs) استفاده می‌کنید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : آشفتگی، اغتشاش ذهنی، افسردگی، خواب‌آلودگی، سرگیجه، ضعف، تعریق، سردرد و مشکلات گوارشی مثل کاهش اشتها.

تدخّل‌های دارویی : دارو اثر برخی شل‌کننده‌های عضلانی را افزایش می‌دهد - آمینو گلیکوزیدها، کلیندامایسین، کلیستین، برخی داروهای ضدمالاریا و نیز برخی داروهای ضدآریتمی، اثر این دارو را افزایش می‌دهند.

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود، چون بی‌ضرر بودن آن ثابت نشده است.

Saccharin Sodium**ساخارین سدیم**

اشکال دارویی موجود در ایران : پلت

گروه دارویی : شیرین کننده مصنوعی

مقدار و روش مصرف : روزانه ۲/۵ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به طور موقت موارد عمدۀ استعمال دارو : به عنوان جانشین ساکاراز (قند معمولی) در بیماران چاق و دیابتی یا سایر مواردی که مصرف ساکاراز مطلوب نمی‌باشد به کار می‌رود . ساخارین سدیم فقط یک شیرین کننده است و هیچگونه ارزش غذایی ندارد .

Salbutamol**سالبوتامول**

گروه دارویی : گشادکننده‌های مجاري هوایی ریه (برونکودیلاتورها)
میزان خطر در مصرف اضافی : کم
نیاز به تجویز پزشک : دارد

اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، تزریقی ، استنشاقی ، پودر استنشاقی و قرص‌های کندآزادشونده
زمان و دفعات مصرف : مایع ، قرص و شکل استنشاقی ۳-۴ بار در روز و قرص‌های کندآزادشونده ۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : شکل استنشاقی ظرف ۱۵-۱۵ دقیقه و شکل خوراکی ظرف ۶۰-۳۰ دقیقه اثر می‌کند . شکل استنشاقی تا ۶ ساعت و اشکال خوراکی تا ۸ ساعت در بدن فعال است .

نحوه تهدیاری از دارو : دارو در ظرف درسته ، در جای خشک و خنک ، دور از نور و دور از دسترس کودکان نگهداری شود . از سوراخ کردن یا سوزاندن دستگاه اینهالر (Inhaler) پرهیز شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن ، به پزشک اطلاع دهید - تا از اثرات آن بر روی خودتان اطلاع ندارید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث لرز شود - اگر مبتلا به بیماری قلبی ، فشارخون بالا ، دیابت و پرکاری تیروئید هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عواضن ناخواسته : لرز ماهیچه‌ها ، اضطراب ، ناآرامی ، کرامپ عضلانی و سردرد .

تداخل‌های دارویی : در صورت مصرف همزمان با پتاسیم ، خطر کاهش پتاسیم خون وجود دارد - مهارکننده‌های مونوآمینوکسیداز ممکن است با این دارو تداخل کرده ، باعث افزایش فشارخون شوند - داروهای سمپاتومیمتیک ، آثار این دارو را افزایش می‌دهند - بتابلوکرها با فعالیت دارو مقابله می‌کنند لذا باید بتابلوکرها را با سالبوتامول مصرف کرد .

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری اشکالی ندارد . در شیردهی نیز مقادیر معمولی آن مشکلی ایجاد نمی‌کند . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Salmeterol سالمترول

گروه دارویی: گشادکننده‌های مجاری هوایی ریه (برونکودیلاتورها)

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود: استنشاقی و پودر استنشاقی

زمان و دفعات مصرف: دو بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۱۰-۲۰ دقیقه اثر دارو شروع می‌شود و تا ۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت ایجاد اختلال تنفسی و خس خس سینه، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، پزشک را آگاه سازید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به بیماری قلبی، فشارخون بالا، پرکاری تیروئید و دیابت هستید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن ممکن است باعث کاهش سطح پتابسیم خون شود.

عواض ناخواسته: لرز شایع‌ترین عارضه است. سردرد و تپش قلب نیز از عوارض دیگر دارو هستند.

تداخل‌های دارویی: مصرف زیاد با کورتون‌ها، تئوفیلین و دیورتیک‌ها، خطر کاهش پتابسیم خون را افزایش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: مصرف آن در بارداری جهت درمان آسم اشکالی ندارد اما با پزشک مشورت شود. مصرف آن در شیردهی اشکالی ندارد.

Selenium Sulfide سلنیم سولفاید

گروه دارویی: ضدغفونت، آنتی‌بیوتیک، ضدقارچ

اشکال دارویی موجود در ایران: شامپو و لوسيون

مقدار و روش مصرف: جهت کنترل شوءه سر و درمان درماتیت سبوروهای ۱۰-۵ میلی‌لیتر از محلول ۲/۵-۱٪ را به پوست مرطوب مالیده ماساژ دهید و بعد از ۳-۲ دقیقه آن را بشوئید؛ یک بار دیگر شامپو را روی سرتان بمالید و سپس کاملاً آن را بشوئید؛ در ابتدا شامپو را دو بار در هفته برای دو هفته استفاده کنید آنگاه می‌توانید مصرف آن را به یک بار در هر ۴-۱ هفته کاهش دهید. جهت

درمان تیلناؤ(سیکالا) : محلول ۲/۵ درصد را به همراه کمی آب به ناحیه مبتلا بمالید و بعد از ۱۰ دقیقه آن را بشوئید این کار باید مدت ۷ روز تکرار شود.

موارد عمده استعمال دارو : خارش و پوسته‌ریزی سر همراه با شوره، درماتیت سبوره‌ای پوست و کچلی قرمز رنگ (تینتاورسیکالا).

عوارض جانبی مهم : تحریک پوستی، تغییر رنگ مو و ریزش برگشت‌پذیر مو.

Sildenafil سیلدنافایل

گروه دارویی : مورد استفاده در کاهش قدرت جنسی

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

نیاز به تجویز پزشک : دارد

اشکال دارویی موجود : قرص

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز و قبل از شروع فعالیت جنسی

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۳۰ دقیقه اثر می‌کند و ۴ ساعت در بدن فعال است.

رزیم غذایی مناسب : رژیم خاصی نیاز ندارد اما دارو (در صورت مصرف هنگام غذا) به همراه غذاهای چرب کندتر اثر می‌کند، لذا بهترین حالت مصرف با معده خالی است.

موارد منع مصرف و احتیاط : هر وقت بخواهید می‌توانید مصرف آن را متوقف کنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث سردرد، سرگیجه، گرگرفتگی، تغییر در دید چشم و احتقان بینی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - تا زمانی که از اثرات این دارو بر روی خود آگاهی ندارید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - اگر دچار مشکلات قلبی، کم‌خونی «سلول داسی شکل»، مالتیپل میلوما، لوسمی، مشکلات کبدی یا کلیوی، مشکلات ارثی چشم، ناهنجاری‌های آلت تناسلی مردانه، سابقه حمله قلبی و مغزی هستید و نیز در صورتی که از یک ترکیب دارویی نیتراتی استفاده می‌کنید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : سردرد، گرگرفتگی، سرگیجه، گرفتگی بینی، دیدن رنگ آبی و سفت شدن طولانی و دردناک آلت تناسلی مردانه.

تداخل‌های دارویی : این دارو اثر نیترات‌ها را افزایش می‌دهد - سایمتدین، اریترومایسین و کتوکونازول خوراکی غلظت خونی و سمیت این دارو را افزایش می‌دهند - این دارو، اثر خدفشارخون‌ها را تشدید می‌کند - مصرف داروهای دیگر ضدناتوانی جنسی همراه این دارو جایز نیست.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود.

Silver Sulfadiazine**سولفادیازین نقره**

اشکال دارویی موجود در ایران: کرم موضعی

گروه دارویی: ضد عفونت، سولفانامید

مقدار و روش مصرف: پس از برداشتن بافت‌های زايد و مرده، لایه‌ای از کرم به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر - ۲ بار در روز روی زخم مالیده می‌شود.

موارد عمدۀ استعمال دارو: پیشگیری و درمان سپسیس در سوختگی‌های درجه دو و سه.

عوارض جانبی مهم: درد، سوزش، خارش، دانه‌های پوستی، احتمال مسمومیت در صورتی که روی سطح وسیعی از بدن مالیده شود.

Simfibrate**سیم فیبرات**

اشکال دارویی موجود در ایران: کپسول

گروه دارویی: پایین‌آورنده کلسترول سرم

مقدار و روش مصرف: ۵۰۰ - ۲۵۰ میلی‌گرم از راه خوراکی ۳ بار در روز همراه با غذا یا بعد از آن

موارد عمدۀ استعمال دارو: دمان (بیادی چربی فون همراه با آرتريواسکلروز، آرتريواسکلروز مغزی، آرتريواسکلروز کرونر، زیادی فشارخون و دیابت).

عوارض جانبی مهم: سرد درد، سرگیجه، طپش قلب، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهاایی، یرقان، کاهش میل جنسی، درد عضلانی، طاسی و دانه‌های پوستی.

Simple Eye Ointment**پماد ساده چشمی**

اشکال دارویی موجود در ایران: پماد چشمی

گروه دارویی: نرم‌کننده چشم

مقدار و روش مصرف: ۱ بار در روز، روی چشم مالیده شود.

موارد عمدۀ استعمال دارو: به عنوان محافظت کننده یا نرم‌کننده برای جلوگیری از تحریک بیشتر یا برطرف نمودن خشکی چشم.

Simvastatin**سیمواستاتین**

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: پایین‌آورنده چربی خون

اشکال دارویی موجود: قرص

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

زمان و دفعات مصرف : یک بار در شب‌انه‌روز (هنگام شب)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۲ هفته دارو اثر می‌کند و ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رزیم غذایی مناسب : رژیم غذایی کم چربی توصیه می‌شود .

نحوه نگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته ، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز دانه‌های پوستی ، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مصرف زیاد آن می‌تواند باعث مشکلات کبدی شود که باید پزشک را مطلع سازید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی ، مشکلات چشمی یا بینایی ، ضعف ماهیچه‌ها ، بیماری‌های غده تیروئید ، پورفیری ، آنژین و فشارخون بالا هستید و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر یا سابقه اعتیاد به الكل ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن ممکن است اثرات خطرناکی روی کارکرد کبد بگذارد .

عوارض ناخواسته : نفخ و دل درد ، بیوست ، اسهال ، سردرد ، راش و مشکلات تنفسی مثل ضعف و درد .

تداخل‌های دارویی : مصرف هم‌زمان دارو با کتوکونازول ، ایتراکونازول ، اریتروماکسین ، دیگر پایین‌آورنده‌های چربی خون و داروهای مهار کننده ایمنی بدن باعث افزایش مسمومیت عضلانی می‌شود . مصرف هم‌زمان دارو با داروهای ضدانعقاد خون ، اثر این داروها را افزایش می‌دهد .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود و در شیردهی نیز بی‌ضرر بودن آن ثابت نشده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Sodium Chloride

کلرید سدیم (نرمال سالین)

گروه دارویی : جانشین سدیم و کلر

اشکال دارویی موجود در ایران : محلول جهت انفوژیون وریدی به صورت محلول ۹/۰ درصد نیم و یک لیتری - محلول ۴۵/۰ درصد نیم و یک لیتری - محلول ۵ درصد ۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری

مقدار و روش مصرف : محلول ۹/۰ درصد : ۶-۲ درصد وزن بدن متناسب با میزان کمبود الکترولیت‌ها یا ۳-۱/۵ لیتر هر ۲۴-۱۸ ساعت انفوژیون می‌شود . محلول ۵ درصد : حداکثر ۱۰۰ میلی‌لیتر ظرف یک ساعت تزریق می‌شود .

موارد عمده استعمال دارو: به عنوان جانشین در موارد از دست دادن آب و یون سدیم و کلر از بدن ، جهت شستشوی بافت‌ها و حفرات بدن ، محلول غلیظ کلرید سدیم (۵ درصد) جهت درمان کاهش غلظت سدیم و کلر ناشی از ازدست دادن الکترولیتها و رقیق شدن شدید آب بدن به علت مصرف زیاد آب .

عوارض جانبی مهم: مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث اختلال الکترولیتها ، احتباس آب ، خیز (ایدم) ، از دست دادن پتاسیم و تشدید اسیدوز موجود شود .

Sodium Cromoglicate

سدیم کروموجلیکات

گروه دارویی: ضدآلرژی

نیاز به تجویز پزشک: برخی فرآورده‌های آن نیاز به تجویز پزشک ندارد .

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

اشکال دارویی موجود: کپسول ، پماد چشمی ، استنشاقی ، قطره چشم و بینی و اسپری بینی .

زمان و دفعات مصرف: کپسول‌ها (در آب حل شود یا به طور کامل بلعیده شود) ۴ بار در روز - استنشاقی و قطره بینی ۶ - ۴ بار در روز ، قطره چشم ۴ بار در روز - پماد چشمی ۳ - ۴ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: زمان آغاز تأثیر آن براساس شکل دارویی ، دوز مصرفی و نوع بیماری متفاوت است . در بیماری‌های چشم و رینیت آلرژیک ممکن است بعد از چند روز اثرات آن ظاهر شود . در صورتی که از قطره برای درمان رینیت آلرژیک مزمن و آسم استفاده می‌کنید ، اثرات آن ممکن است ۶ - ۲ هفته بعد ظاهر شود . ۶ - ۴ ساعت در بدن فعال است و بعضی اثرات آن ممکن است چند روز بعد از توقف مصرف باقی بماند .

رژیم غذایی مناسب: ممکن است توصیه شود از مصرف برخی داروها اجتناب کنید .

نحوه نگهداری از دارو: دارو را در ظرف درسته ، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک ، مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده عالیم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از دارو ، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته: استفاده از شکل استنشاقی باعث بروز سرگیجه ، سرفه و گرفتگی صدا می‌شود . اسپری بینی باعث عطسه می‌شود .

تداخل‌های دارویی : ندارد.

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

Sodium Fluoride

سدیم فلوراید

گروه دارویی : مادهٔ معدنی پیشگیری کننده از فساد دندان‌ها

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص و دهان‌شویه

مقدار و روش صرف : جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان ۱۲-۶ ساله روزانه ۵ میلی‌لیتر از محلول ۰/۰ درصد دهان‌شویه به صورت موضعی - در کودکان بالای ۱۲ سال ۱۰ میلی‌لیتر از محلول ۰/۰ درصد به صورت موضعی.

موارد عمدۀ استعمال دارو : درمان کمکی استتوپوروز - تثبیت پیشرفت فقدان شناوی در تعدادی از بیماران دچار اتواسکلروز - پیشگیری از پوسیدگی دندان - پایین بودن غلظت یون فلوراید در آب آشامیدنی - کنترل پوسیدگی دندان.

عوارض جانبی مهم : التهاب غیرطبیعی پوست ، آرژی گوارشی و تنفسی ، طعم نمکی یا صابونی ، ضعف عضلات ، تشنجی ، ازدیاد بzac ، لرز ، لکه‌های سفید مینای دندان و دانه‌های پوستی.

Sodium valproate

والپروات سدیم

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : ضدتشنج

میزان خطر در صرف اضافی : متوسط

اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، کپسول و تزریقی

زمان و دفعات صرف : ۱-۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۶۰ دقیقه دارو اثر می‌کند و تا ۱۲ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع صرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک ، صرف آن را متوقف نکنید - مقادیر زیاد آن می‌تواند باعث اغما شود که لازم است به پزشک اطلاع دهید - بیماری اصلی شما (تشنج) ممکن است امکان انجام کارهای حساس و رانندگی را منتفی سازد - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - صرف بلندمدت آن ممکن است باعث آسیب‌دیدگی کبد شود.

عوارض ناخواسته: تهوع ، سوءهاضمه ، افزایش وزن و ریزش مو . نارسایی کبدی و اختلالات پلاکتی و خونی نیز به ندرت ممکن است روی دهدن .

تداخل‌های دارویی: ضدتشنج‌های دیگر سطح خونی این دارو را کاهش می‌دهند - ضدافسردگی‌ها و ضدجنون‌ها تأثیر این دارو را کاهش می‌دهند - آسپیرین اثر دارو را افزایش می‌دهد - کلستیرامین می‌تواند جذب گوارشی والپروات سدیم خوراکی را کاهش دهد - سایمیدین می‌تواند آثار این دارو را افزایش دهد - کلروکین و مفلوکین آثار این دارو را کاهش می‌دهند .

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی‌شود . در شیردهی مقادیر معمولی آن مشکلی ایجاد نمی‌کند . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Somatropin سوماتروپین

گروه دارویی: هورمون ، محرک رشد
اشکال دارویی موجود در ایران: ویال تزریقی
مقدار و روش مصرف: مجهت درمان کمبود هورمون (شد در گودکان : ۲ واحد (۰/۱ - ۰/۰۵) واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) سه بار در هفته به فواصل حداقل ۴۸ ساعت به صورت عضلانی تزریق شده و هر بار محل تزریق تغییر داده شود .

موارد عمده استعمال دارو: نارسایی رشد ناشی از کمبود هورمون رشد - به عنوان درمان جایگزین پیش از بسته شدن اپی‌فیزها در بیمارانی که دچار کمبود هورمون رشد با علل نامشخص هستند - کمبود هورمون رشد ناشی از تومور هیپوفیز یا کمکاری هیپوفیز .

عوارض جانبی مهم: درد و تورم در محل تزریق ، درد عضلانی ، بالا رفتن غلظت کلسیم در ادرار ، بالا رفتن غلظت چربی خون و رشد سریع تومور داخل جمجمه .

Sorbitol سوربیتول

گروه دارویی: شیرین‌کننده ، ملین
اشکال دارویی موجود در ایران: پودر
مقدار و روش مصرف: ملین از (اه فوراکی : ۵۰ - ۳۰ گرم . ملین از (اه تنقیه : ۱۲۰ میلی‌لیتر از محلول ۳۰ - ۲۵ درصد . شیرین‌کننده (در دیابتی‌ها) : روزانه تا ۳۰ گرم
موارد عمده استعمال دارو: جانشین قند در بیماران دیابتی و به عنوان مسهل .
عوارض جانبی مهم: مقادیر زیاد آن ممکن است باعث نفخ ، اتساع شکم و اسهال شود .

Spectinomycin HCL**اسپکتینومایسین**

گروه دارویی: آنتی بیوتیک
اشکال دارویی موجود در ایران: ویال تزریقی
مقدار و روش مصرف: در درمان سوزاک بدون عارضه: ۲ گرم به صورت دوز واحد به صورت تزریق عضلانی . هشت درمان سوزاک متاثر: ۲ گرم هر ۱۲ ساعت یک بار به صورت تزریق عضلانی
موارد عمده استعمال دارو: درمان سوزاک بدون عارضه در بیمارانی که به پنی سیلین مقاوم هستند یا به آن حساسیت دارند، درمان سوزاک متشر توسط نایسیریا گنوره .
عوارض جانبی مهم: درد و زخم در محل تزریق ، کهیر ، خارش ، تهوع ، استفراغ ، عصبی شدن و به ندرت کاهش بروند ادراری .

Streptokinase**استرپتوکیناز**

گروه دارویی: مورد استفاده در درمان لخته شدن خون در رگها
نیاز به تجویز پزشک: دارد
میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط
اشکال دارویی موجود: پودر و تزریقی
زمان و دفعات مصرف: پهلو: ۱-۲ بار در روز - تلایقی: به صورت یک دوز واحد یا تزریق مداوم در یک دوره ۲۴-۷۲ ساعته
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف چند دقیقه اثر می کند و بعد از توقف مصرف دارو چند دقیقه بعد ، اثر دارو ناپدید می شود .
موارد منع مصرف و احتیاط: این دارو معمولاً تا سه روز تجویز می شود - از آن جا که تحت کنترل های دقیق پزشکی مصرف می شود ، احتمال مصرف مقدار زیاد آن کم است - در هنگام رانندگی یا کارهای حساس این دارو در دستریس شخص نیست - استرپتوکیناز هرگز به صورت بلندمدت مورد استفاده قرار نمی گیرد .
عوارض ناخواسته: خونریزی بیش از حد (مهمنترین عارضه) ، تهوع ، استفراغ ، دانه های پوستی ، خارش ، تب ، خس خس ریه و ریتم غیر طبیعی قلب .

تداخل های دارویی: اگر دارو با ضد انعقادها و ضد پلاکت ها مصرف شود ، خطر خونریزی را افزایش می دهد .
صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نمی شود زیرا در ۱۸ هفتۀ اول بارداری باعث کنده شدن جفت از دیواره رحم می شود . مصرف آن در شیردهی اشکالی ندارد .

Streptomycin Sulfate**استرپتومایسین**

گروه دارویی: آنتی بیوتیک ، ضدسلسله باکتری

اشکال دارویی موجود در ایران: پودر جهت تهییه محلول تزریقی

مقدار و روش مصرف: جهت درمان سل : یک گرم در روز به صورت دوز واحد - درمان عفونت های شدید : روزانه ۲ - ۴ گرم هر ۱۲ - ۶ ساعت یک بار - درمان عفونت های هنگام خواب : روزانه ۱ - ۲ گرم

موارد عدمه استعمال دارو : درمان سل همراه با داروهای دیگر ، درمان اندوکارдیت میکروبی ، درمان عفونت های مجاري تنفسی و درمان بروسلوز (تب مالت) .

عوارض جانبی مهم : راش ، خارش ، بزرگی غدد لنفاوی ، شوک آنافیلاکتیک ، سمیت کبدی ، سمیت کلیوی ، آسیب دستگاه شنوایی ، ضعف عضلانی و ایست قلبی .

Sucralfate**سوکرالفات**

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی: ضدزخم معده

میزان خطر در مصرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : مایع و قرص

زمان و دفعات مصرف: ۲-۴ بار در روز (یک ساعت قبل از غذا و هنگام خواب)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر دارو یک یا دو روز بعد مشاهده می شود ، ولی اثر کامل آن چند هفته زمان می برد و تا ۵ ساعت در بدن فعال است .

رزیم غذایی مناسب : به رژیم غذایی که پزشک توصیه می کند عمل کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مصرف مقدار زیادی از این دارو یا مشاهده علایم غیرعادی ، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اغلب بی اشکال است اما این دارو در برخی افراد می تواند باعث سرگیجه شود - در صورت ابتلاء به مشکلات بلندمدت کلیوی یا استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می تواند باعث کمبود ویتامین های A ، D ، E و K شود .

عوارض ناخواسته: بیوست (مهم ترین عارضه) ، تهوع ، اسهال ، خشکی دهان ، سرگیجه و راش پوستی .

تدخلات دارویی : آنتی اسیدها اثر این دارو را کاهش می دهند لذا نیم ساعت بعد یا قبل از این دارو مصرف شوند - در صورت مصرف همزمان این دارو با فنی تئین ، آنتی بیوتیک های تتراسیکلین ، سیپروفلوکساسین ، نورفلوکساسین ، اوپلوفلوكساسین ، تیروکسین ، دیگوکسین و وارفارین اثر این داروها کاهش می یابد .

صرف در شیردهی و بارداری : در شیردهی خطری ندارد و در بارداری بی‌ضرر بودن این دارو مشخص نیست ، با پزشک مشورت کنید .

Sulfacetamide Sodium

سولفاتامید

گروه دارویی : آنتی‌بیوتیک چشمی

اشکال دارویی موجود در ایران : قطره استریل چشمی

مقدار و روش صرف : درمان التهاب ملتحمه : چکاندن ۳ - ۱ قطره از محلول ۱۰ درصد هر ۳ - ۲ ساعت به داخل کیسه ملتحمه

موارد عمده استعمال دارو : برای درمان ورم ملتحمه ، زخم‌های قرینه و سایر عفونت‌های سطحی چشم به کار می‌رود .

عوارض جانبی مهم : احساس سوزش یا گزش گذرا ، واکنش‌های حساسیت شدید ، عفونت اضافی با باکتری‌های غیر حساس به این آنتی‌بیوتیک .

Sulfasalazine

سولفاسالازین

گروه دارویی : مورد استفاده در بیماری‌های التهابی روده ، ضدروماتیسم

نیاز به تجویز پزشک : دارد

اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، شیاف و شکل دارویی مورد استفاده از راه تنقیه

زمان و دفعات صرف : شیاف ۲ بار در روز ، قرص ۲-۴ بار در روز (بعد از غذا همراه با آب) و شکل مورد استفاده از راه تنقیه یک بار در روز هنگام خواب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آثار دارو ظرف ۱-۳ روز ظاهر می‌شود و تا ۲۴ ساعت در بدن فعال است .

رزیم غذایی مناسب : هنگام مصرف دارو روزانه ۱/۵ لیتر آب مصرف شود - این دارو اسید فولیک بدن را کاهش می‌دهد ، لذا مقدار فراوانی سبزیجات مصرف شود .

موارد منع صرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن ، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، کمبود آنزیم G6PD ، بیماری‌های خونی ،

پورفیری و حساسیت به سولفات‌امیدها یا آسپیرین هستید و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر، پزشک ر در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن ممکن است باعث بیماری‌های خونی شود.

عوارض ناخواسته: سردرد، کاهش اشتها، درد مفاصل و صدای زنگ در گوش شایع هستند که با کاهش دوز دارو از بین می‌روند. تهوع و استفراغ در صورت مصرف دارو با غذا، کمتر می‌شود.

تداخل‌های دارویی: این دارو اثر ضدانعقادهای خوراکی، ضددیابت‌های خوراکی، ضدتشنج‌ها و متوترکسات را افزایش می‌دهد. این دارو باعث کاهش جذب گوارشی و آثار داروهایی مانند آهن، اسیدوفولیک و دیگوکسین می‌شود.

معرف در شیردهی و بارداری: در بارداری اشکالی ندارد و در شیردهی وارد شیر می‌شود که باید با پزشک خود مشورت کنید.

Sulfur سولفور

گروه دارویی: ضدآکنه، ضدسبوره، ضد گال (جرب)

اشکال دارویی موجود در ایران: صابون، لوسيون، بالک (Bulk)

مقدار و روش مصرف: صابون: به عنوان کراتولیتیک یا ضدآکنه بر روی پوست استفاده می‌شود.

لوسيون: برای رفع خارش و شوره سر، لوسيون ۵ - ۲ درصد را روی سر بمالید تا موها خیس شود، سپس با فشار پوست را ماساژ دهید، بعد از آن موها را آب کشیده مجدداً لوسيون بزنید و آن را ماساژ داده بشویید. لوسيون معمولاً دو بار در هفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد عمدۀ استعمال دارو: درمان آکنه، درماتیت سبورهای و گال (جرب)

Sumatriptan سوماتریپتان

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدمیگرن

میزان خطر در مصرف اضافی: متوسط

اشکال دارویی موجود: اسپری بینی، قرص و تزریقی

زمان و دفعات مصرف: تا آن‌جا که ممکن است دارو بعد از شروع حمله میگرنی تجویز شود و قرص‌ها همراه مقداری آب مصرف شود. برای یک حمله میگرنی نباید دو بار از این دارو استفاده کنید.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: قرص ظرف ۳۰ دقیقه و شکل تزریقی ظرف ۱۰-۱۵ دقیقه اثر می‌کند. حداقل اثر قرص‌ها بعد از ۲-۴ ساعت و حداقل اثر شکل تزریقی بعد از ۱/۵-۲ ساعت ظاهر می‌شود.

نحوه نگهداری از دارو : دارو را در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط : این دارو فقط در درمان حمله میگرن تجویز می‌شود - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از آن به پزشک اطلاع دهید - در هنگام وقوع حمله میگرنی امکان انجام کارهای حساس یا رانندگی وجود ندارد - اگر مبتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی، بیماری‌های قلبی، فشارخون بالا و حساسیت به بعضی داروها هستید و نیز اگر سابقه حمله قلبی یا آنژین دارید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - این دارو به صورت مستمر و بلندمدت جهت پیشگیری از حمله میگرنی تجویز نمی‌شود و فقط هنگام وقوع حمله میگرنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عوارض ناخواسته : درد در محل تزریق، گرگفتگی، سرگیجه و احساس سنگینی، ضعف، خستگی و خواب آلودگی (عوارض بعد از یک ساعت ناپدید می‌شوند).

تداخل‌های دارویی : مهارکننده‌های مونوآمینوکسیداز MAOIs و برخی ضدافسردگی‌ها، خطر عوارض جانبی دارو را تشدید می‌کنند - اگر از لیتیم استفاده می‌کنید، هرگز این دارو را مصرف نکنید چون با ارگوتامین تداخل دارویی دارد.

مصرف در شیردهی و بازداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری و شیردهی ثابت نشده است : در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

تمپازepam Tempazepam

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : خواب‌آور گروه بنزودیازپین

اشکال دارویی موجود : مایع و قرص

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز نیم ساعت قبل از خواب

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۱۵-۴۰ دقیقه اثر می‌کند و ۸-۶ ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : در صورت استفاده بیش از دو هفته، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - مصرف مقدار زیاد آن می‌تواند باعث خواب‌آلودگی غیرعادی شود که باید به پزشک اطلاع دهید - تا زمانی که از اثرات آن بر روی خودتان آگاه نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید، چون می‌تواند باعث کندی واکنش‌ها و کاهش تمرکز و هوشیاری شود - اگر مبتلا به

مشکلات کبدی یا کلیوی ، مشکلات شدید تنفسی ، پورفیری ، افسردگی و میاستنی گراو هستید یا بر داروی دیگری نیز استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن باعث تطابق بدن با دارو و در نتیجه کاهش اثرات آن می شود .

عوارض ناخواسته : سرگیجه ، خواب آلودگی هنگام روز ، سردرد ، اغتشاش ذهنی ، خواب های آشفته و بی ثباتی .

תداخل های دارویی : ضداضطرابها ، خواب آورها ، مسکن های اوپیوئیدی ، ضدجنون ها ، آنتی هیستامین ها و ضدافسردگی ها اثر آرامبخشی این دارو را افزایش می دهند .

صرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن آن در بارداری اثبات نشده اما مصرف مقادیر معمولی آن مشکلی در شیردهی ایجاد نمی کند . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Terbutaline تربوتالین

گروه دارویی : گشادکننده های مجاري هوایی
نیاز به تجویز پزشک : دارد
میزان خطر در صرف اضافی : کم

اشکال دارویی موجود : استنشاقی ، مایع ، قرص و تزریقی

زمان و دفعات صرف : استنشاقی در موقع نیاز و قرص ۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : قرص ظرف ۱-۲ ساعت و استنشاقی ظرف چند دقیقه اثر می کند . قرص ۴ ساعت در بدن فعال است .

نحوه تگهداری از دارو : این دارو را در ظرف دربسته ، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری کنید . همچنین از پاره کردن یا سوراخ کردن ظرف محتوی داروی استنشاقی بپرهیزید .

موارد منع صرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک صرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرطبیعی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلاء به مشکلات قلبی ، فشارخون بالا ، پرکاری تیروئید ، دیابت و نیز استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می تواند باعث افزایش تحمل بدن در مقابل این دارو و در نتیجه کاهش اثرات آن شود .

عوارض ناخواسته : گرگرفتگی عضله ها ، تهوع ، استفراغ ، ناآرامی ، اضطراب ، سردرد و تپش قلب .

تداخل های دارویی : این دارو می تواند با ضدافسردگی های گروه MAOIs تداخل کرده و باعث افزایش خطرناک فشارخون شود - داروهای سمپاتومیمتیک اثر این دارو را افزایش می دهند و عوارض آن را بیشتر می کنند .

صرف در شیردهی و بارداری : بی ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است اما شکل استنشاقی مشکلی ایجاد نمی کند . در شیردهی نیز شکل استنشاقی اشکالی ایجاد نمی کند .

Terfenadine ترفناپیدین

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص شیاردار
گروه دارویی : آنتی هیستامین
مقدار و روش صرف : جهت درمان رینیت آлерژیک : ۶۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۱۲ ساعت یک بار
موارد عمدۀ استعمال دارو : تسکین نشانه های همراه با رینیت آлерژیک فصلی و دائمی مثل : عطسه ،
 آبریزش بینی ، وزوز گوش و اشک ریزش .
عوارض جانبی مهم : آرامش ، سردرد ، ضعف ، بی نظمی قلبی ، تهوع ، استفراغ ، خشکی دهان و
 بینی و گلو ، یبوست ، راش پوستی .

Testosterone تستوسترون

نیاز به تجویز پزشک : دارد
گروه دارویی : هورمون جنسی مردانه
میزان خطر در صرف اضافی : کم
اشکال دارویی موجود : پچ (چسب) ، کپسول ، تزریقی و پلت های کاشتنی
زمان و دفعات صرف : کپسول ۲ بار در روز - تزریقی یک بار در ۳ هفته تا دو بار در هفته -
 پلت های کاشتنی هر ۶ ماه یک بار - پچ روزی یک بار
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : دارو ظرف ۲-۳ روز اثر می کند . کپسول و پچ
 ۱-۲ روز ، تزریقی ۱-۳ هفته و کاشتنی حدود ۶ ماه در بدن فعال هستند .
موارد منع صرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک صرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده
 علایم غیرعادی یا صرف مقدار زیادی از این دارو ، به پزشک اطلاع دهید - صرف آن در رانندگی و
 کارهای حساس اشکالی ندارد - در صورت ابتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، بیماری قلبی ،
 مشکلات پرستوتات ، فشارخون بالا ، صرع ، میگرن ، دیابت و نیز استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را
 در جریان قرار دهید - صرف بلندمدت آن می تواند باعث کاهش رشد در افراد جوان شود .
عوارض ناخواسته : اختلال در دفع ادرار ، راست شدن غیرعادی آلت تناسلی ، احتباس مایعات در بدن و
 ورم پا . در خانمها ریزش غیرعادی موها ، تغییرات صدا و بزرگی کلیتوریس ممکن است رخدهد .

تداخل‌های دارویی: در مصرف هم‌زمان با این دارو، باید دوز داروهای ضدیابت کاهش یابد. این دارو اثر داروهای ضدانعقادی را افزایش می‌دهد.
مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود.

Tetracycline

تتراسیکلین

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک گروه تتراسیکلین
نیاز به تجویز پزشک: دارد
میزان خطر در مصرف اضافی: کم
اشکال دارویی موجود: قرص، کپسول، پماد، پماد چشمی و گوشی
زمان و دفعات مصرف: شکل خوراکی ۴ بار در روز و برای درمان آکنه یک بار در روز زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: دارو ظرف ۱۲–۱۶ ساعت اثر می‌کند و تا ۶ ساعت در بدن فعال است.

رزیم غذایی مناسب: فرآورده‌های شیر را نباید یک ساعت قبل یا بعد از این دارو مصرف کرد؛ زیرا باعث کاهش جذب آن می‌شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: دوره درمان را کامل کنید – در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از دارو، به پزشک اطلاع دهید – مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد – اگر مشکل بلندمدت کبدی یا کلیوی دارید و نیز در صورت سابقه حساسیت به تتراسیکلین و استفاده داروهای دیگر، پزشک را در جریان قرار دهید – مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته: در مصرف شکل خوراکی تهوع، استفراغ و اسهال می‌تواند عارض شود.
فرآوردهای پوستی عوارض خاصی ندارند.

تداخل‌های دارویی: آهن اثر این دارو را کاهش می‌دهد – ضدانعقادهای خوراکی و رتینوئید اثر این دارو را افزایش می‌دهند – شیر و ضداسیدها (هیدروکسید آلومینیم) اثر این دارو را کاهش می‌دهند، برای جلوگیری از این تداخل ۱–۲ ساعت بین مصرف آن‌ها فاصله باشد – این دارو اثر ضدبارداری‌های خوراکی را کاهش می‌دهد.

مصرف در شیردهی و بارداری: در بارداری تجویز نشود زیرا باعث تغییر رنگ دندان‌ها و آسیب‌های استخوانی در جنین می‌شود، در شیردهی هم وارد شیر شده و باعث تغییر رنگ دندان‌های شیرخوار می‌شود.

Theophylline / Aminophylline

تئوفیلین / آمینوفیلین

گروه دارویی: گشادکننده مجرای هوایی ریه
نیاز به تجویز پزشک: ندارد

میزان خطر در مصرف اضافی : بالا

اشکال دارویی موجود : قرص ، مایع ، تزریقی ، قرص کندآزادشونده و کپسول کندآزادشونده زمان و دفعات مصرف : قرص و مایع ۳-۴ بار در روز - قرص کندآزادشونده و کپسول کندآزادشونده هر ۱۲ یا ۲۴ ساعت

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : شکل خوراکی ظرف ۳۰ دقیقه اثر می‌کند و تا ۸ ساعت در بدن فعال است . کپسول‌ها و قرص‌های کندآزادشونده ظرف ۹۰ دقیقه اثر می‌کند و ۱۲-۲۴ ساعت در بدن فعال هستند .

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت وقوع تپش قلب ، بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در تمام موارد مصرف آن اقدامات فوری لازم است اما در صورت ایجاد درد قفسه سینه ، اغتشاش ذهنی و یا کاهش هوشیاری ، اقدامات اوژانس لازم است - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - مصرف بلندمدت آن بلامانع است - اگر مشکل مزمن کبدی دارید یا مبتلا به آنژین ، بی‌نظمی در ضربان قلب ، صرع و زخم معده هستید و نیز اگر سیگار می‌کشید یا از داروی دیگری استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید .

عواضن ناخواسته : سردرد ، آشفتگی ، بی‌خوابی ، تهوع ، استفراغ ، اسهال و تپش قلب .

تدالع‌های دارویی : بسیاری از داروها مانند : اریترومایسین و سایمتیدین آثار این دارو را افزایش می‌دهند و برخی دیگر از داروها مانند : فنیتوئین ، کاربامازپین و ریفامپین آثار این دارو را کاهش می‌دهند .

صرف در شیردهی و بارداری : دارو می‌تواند وارد شیر مادر شود ، بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده است . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Thiabendazole

تیابندازول

اشکال دارویی موجود در ایران : قرص جویدنی

گروه دارویی : ضدکرم

مقدار و روش مصرف : درمان آلودگی به آسکاریس ، کرمک و کرم قلاب‌دار : ۲۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ، دو بار در روز به مدت دو روز موارد عمده استعمال دارو : آلودگی به کرمک ، آلودگی به آسکاریس ، آلودگی به کرم قلاب‌دار و کرم نخی شکل .

عواضن جانبی معمم : خستگی ، سرگیجه ، خوابآلودگی ، کاهش فشارخون ، بی‌اشتهاایی ، تهوع ، یرقان ، بوی بد ادرار ، افزایش غلظت قندخون و خارش .

Thiamine HCL تیامین (ویتامین B₁)

گروه دارویی : ویتامین گروه B
اشکال دارویی موجود در ایران : قرص و قرص پوشش دار
مقدار و روش مصرف : مکمل غذایی : روزانه ۲ - ۱ میلی گرم از راه خوراکی - درمان کمبود ویتامین B₁ : روزانه ۳۰ - ۵ میلی گرم از راه خوراکی در یک یا سه دوز به مدت یک ماه
موارد عمدۀ استعمال دارو : پیشگیری و درمان بیماری بری بری - تصحیح بی اشتہایی ناشی از کمبود ویتامین .
عوارض جانبی مهم : احساس گرما ، ضعف ، تهوع ، تعریق ، خونریزی گوارشی و آنافیلاکسی .

Thyroxine تیروکسین

نیاز به تعویز پزشک : دارد
اشکال دارویی موجود : قرص
گروه دارویی : هورمون غده تیروئید
میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط
زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : ظرف ۴۸ ساعت اثر دارو شروع می شود و ۳ - ۱ هفته در بدن فعال است .

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقادیر زیاد آن ، به پزشک اطلاع دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به فشارخون بالا ، بیماری قلبی و دیابت هستید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : اضطراب ، آشفتگی ، اسهال ، کاهش وزن ، تعریق ، گرگرفتگی و کرامپهای عضلانی . کاهش زیاد دوز این دارو می تواند باعث ایجاد علایم کم کاری تیروئید شود .
تداخل های دارویی : این دارو باعث افزایش اثر داروهای ضدانعقادی خوراکی می شود - کلستیرامین و سوکرالفات باعث کاهش جذب این دارو می شوند .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری اشکالی ندارد . در شیردهی نیز مصرف مقادیر معمولی دارو اشکالی ندارد . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Tibolone

تیبولن

گروه دارویی: هورمون جنسی زنانه
میزان خطر در مصرف اضافی: کم
زمان و دفعات مصرف: هر روز یک بار قرص‌ها بلعیده شوند و سعی شود مصرف دارو در زمان ثابتی از روز باشد.

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: علایم بهبودی در چند هفته بروز می‌کند و دارو چند روز در بدن فعال است.

نحوه تگهداری از دارو: دارو را در ظرف درسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط: بدون مشورت با پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورتی که تعداد زیادی از این قرص‌ها با هم بلعیده شوند ممکن است باعث ناراحتی معده شوند - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکال ندارد - اگر دچار مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، صرع، میگرن، دیابت، تومور، خونریزی از رحم و سطح بالای کلسترول خون هستید یا سابقه بیماری‌های قلبی - عروقی و مغزی - عروقی دارید و یا اگر از داروی دیگری هم استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - در صورت مصرف بلندمدت، بررسی و معاينة دوره‌های توسط پزشک ضرورت دارد.

عوارض ناخواسته: افزایش وزن، ورم مج پا، سرگیجه، آکنه، سردرد، ناراحتی معده و رشد مو.

تداخل‌های دارویی: فنی‌توئین، فنوباربیتال، پریمیدون، کاربامازپین و ریفامپیسین، سوخت و ساز این دارو را بالا برده و آثار دارویی آن را کاهش می‌دهند.

صرف در شیردهی و بارداری: در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود.

Timolol

تیمولول

گروه دارویی: بتابلوکر (مورد استفاده در درمان بیماری گلوکوم (آب سیاه))
میزان خطر در مصرف اضافی: بالا
نیاز به تجویز پزشک: دارد
اشکال دارویی موجود: قرص و قطره چشمی
زمان و دفعات مصرف: ۱-۳ بار در روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: شکل خوراکی ظرف ۳۰ دقیقه اثر می‌کند و تا ساعت در بدن فعال است.

موارد منع مصرف و احتیاط : مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - همه موارد مصرف زیادی این دارو نیازمند توجه جدی است اما در صورت وقوع اختلالات تنفسی ، تپش قلب یا کاهش هوشیاری اقدامات اورژانس لازم است - تا زمانی که از اثرات این دارو بر روی خودتان با اطلاع نیستید از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون شکل خوراکی آن می‌تواند باعث خواب آلودگی و قطره چشمی آن نیز می‌تواند باعث تاری دید شود - اگر مبتلا به بیماری‌های ریه نظیر آسم ، برونشیت و آمفیزم و نیز مبتلا به آلرژی هستید و یا از داروهای دیگر استفاده می‌کنید ، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن اشکالی ندارد .

عوارض ناخواسته : کرتی ، خستگی ، سردرد ، خواب‌های پریشان ، سردی دست و پا ، بدتر شدن آسم و مشکلات قلبی . قطره چشم عوارض ندارد اما ممکن است باعث تحریک چشم ، سردرد و تاری دید شود .

تداخل‌های دارویی : سمپاتومیمتیک‌ها باعث افزایش خطرناک فشارخون در مصرف همزمان با این دارو می‌شوند - سالبوتامول و سالمترول و دیگر آگونیست‌های بتا که دارای اثر مقابل بتابلوکرها می‌باشند ، اثر این دارو را کاهش می‌دهند .

مصرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن آن در بارداری ثابت نشده و در شیردهی وارد شیر می‌شود که مقادیر معمولی آن اشکالی ندارد . در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید .

Tranexamic Acid

ترانکزامیک اسید

گروه دارویی : بندآورنده خون

اشکال دارویی موجود در ایران : کپسول ، قرص دارای شیار و تزریقی

مقدار و روش مصرف : درمان فونریزی از بینی : محلول تزریقی را می‌توان به صورت موضعی در مخاط بینی تزریق کرد یا ۱ گرم از راه خوراکی هر ۸ ساعت ، به مدت یک هفته مصرف کرد .

موارد عمده استعمال دارو : درمان کوتاه مدت خونریزی یا خطر خونریزی در موقع افزایش تجزیه رشته‌های فیبرین (فیبرینولیز) ، درمان خونریزی از بینی و خونریزی زیاد قاعده‌گی .

عوارض جانبی مهم : خونریزی در حفره‌های بدن و اختلال ترومبوامبولیک .

Trazodone

ترازودون

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : خدافتسردگی

اشکال دارویی موجود : مایع ، قرص و کپسول

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : ۱-۳ بار در روز همراه غذا زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : آثار مفید دارو ظرف چند روز و آثار کامل آن ظرف چند هفته بعد از مصرف ظاهر می‌شود. آثار جانبی ۲۴ ساعت بعد از توقف مصرف و در مصرف بلندمدت اثرات ضدافسردگی آن تا ۶ هفته بعد از قطع مصرف دارو باقی می‌ماند.

نحوه نگهداری از دارو : دارو در ظرف دربسته، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : جز در صورت بروز دانه‌های پوستی، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو به پزشک اطلاع دهید - تا زمانی که از اثرات این دارو بر روی خودتان مطلع نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خواب آلودگی شود - اگر مبتلا به تشنج صرعی، مشکلات بلندمدت کلیوی یا کبدی و بیماری‌های قلبی هستید یا به تازگی یک حمله قلبی را پشت سر گذاشته‌اید و نیز در صورتی که از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد.

عوارض ناخواسته : خواب آلودگی (شایع‌ترین عارضه)، بیوست، اسهال، خشکی دهان، سردرد، سرگیجه و غش. راست شدن طولانی و دردناک آلت تناسلی در مردان به ندرت اتفاق می‌افتد.

داخل‌های دارویی : این دارو، اثر داروهای ضدتشنج را کاهش می‌دهد - مصرف هم‌زمان ترازودون با داروهای مهارکننده مونوآمینو اکسیداز (MAOIs) می‌تواند باعث عوارض ناخواسته جدی شود - همه داروهای آرام‌بخش، اثر آرام‌بخشی این دارو را تشدید می‌کنند.

صرف در شیردهی و بارداری : بی‌ضرر بودن دارو در بارداری به اثبات نرسیده است. در شیردهی وارد شیر می‌شود اما مقادیر معمولی آن اشکالی ندارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Tretinoin ترتینوئین

گروه دارویی : ضدآکنه، ضدپسوریازیس

اشکال دارویی موجود در ایران : کرم موضعی و لوسيون

مقدار و روش مصرف : یک بار در روز قبل از خواب روی ضایعات مالییده شود.

موارد عمده استعمال دارو : درمان موضعی آکنه ولگاریس، به عنوان داروی کمکی در درمان زگیل‌های صاف.

عوارض جانبی مهم : التهاب موضعی ، احساس گزش یا گرما در موضع ، قرمزی و پوسته ریزی در موضع ، تاول زدن و کمرنگ شدن موقت پوست .

تریامسینولون استوناید (سیستمیک)

گروه دارویی : هورمون ، ضدالتهاب ، کورتون
اشکال دارویی موجود در ایران : سوسپانسیون تزریقی
مقدار و روش مصرف : ۴۰ میلی گرم از راه عضلانی هر ۴ هفته یک بار - ۱۵ - ۲/۵ میلی گرم به صورت داخل مفصلی - در صورت نیاز حداقل ۱ میلی گرم به صورت تزریق داخل ضایعه
موارد عمده استعمال دارو : به عنوان ضدالتهاب یا سرکوب کننده دستگاه ایمنی .
عوارض جانبی مهم : ضعف عضلانی ، سوزش و خارش ، کمرنگ شدن پوست .

تریامسینولون استوناید (موضعی)

گروه دارویی : ضدالتهاب ، آدرنوکورتیکوئید موضعی
اشکال دارویی موجود در ایران : کرم و پماد موضعی
مقدار و روش مصرف : درمان التهاب
موارد عمده استعمال دارو : مقدار کافی از پماد یا کرم ، تا چهار بار در روز
عوارض جانبی مهم : بی رنگ شدن پوست ، نازک شدن پوست و سوزش و خارش در محل استعمال دارو .

تریامسینولون ان . ان . جی

گروه دارویی : ضدقارچ ، ضدبacterی موضعی ، آدرنوکورتیکوئید (کورتون)
اشکال دارویی موجود در ایران : پماد موضعی
مقدار و روش مصرف : ۳-۲ بار در روز روی موضع مالیده می شود .
موارد عمده استعمال دارو : درمان کاندیدیاز پوستی ، التهاب پوستی همراه با عفونت کاندیدایی و التهاب پوستی همراه با عفونت باکتریایی .
عوارض جانبی مهم : بی رنگ شدن پوست ، نازک شدن پوست و سوزش و خارش در محل استعمال دارو .

Trifluoperazine Dihydrochloride**تری فلوپرازین**

گروه دارویی: ضدجنون، آرامبخش

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش دار و تزریقی

مقدار و روش مصرف: بیما ان سلپایی: ۲ - ۱ میلی گرم از راه خوراکی دو بار در روز. بیما ان بستایی:

ابتدا ۵ - ۲ میلی گرم دو بار در روز از راه خوراکی و افزایش تدریجی تا ۲۰ - ۱۵ میلی گرم در روز
موارد عمده استعمال دارو: کنترل اضطراب و تنفس زیاد و کنترل علائم ناشی از جنون.

عوارض جانبی مهم: احتقان بینی، خشکی دهان، تاری دید، خواب آلودگی، کاهش فشارخون،
بزرگ شدن پستان در مردان و سرگیجه.

Trihexyphenidyl HCl**تری هکزیفنیدیل**

گروه دارویی: ضدپارکینسون، ضداسپاسم، ضد موسکارین

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص و قرص پوشش دار

مقدار و روش مصرف: جهت پارکینسون: ۱ میلی گرم از راه خوراکی در روز اول، دو میلی گرم در روز دوم،
سپس هر ۵ - ۳ روز ۲ میلی گرم اضافه می شود تا به ۱۰ - ۶ میلی گرم در روز برسد. **جهت پیشگیری و**

درمان علائم فارجه هرمی: ۱۵ - ۵ میلی گرم در روز از راه خوراکی در چند نوبت

موارد عمده استعمال دارو: درمان علائم پارکینسون و پیشگیری از علائم اختلالات خارج هرمی
ناشی از دارو.

عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، تاری دید، خواب آلودگی، احتباس ادرار، استفراغ، سردرد و
تحریک اعصاب مرکزی.

Trimethoprim**تریمتوپریم**

نیاز به تجویز پزشک: دارد

گروه دارویی: ضدباکتری

اشکال دارویی موجود: تزریقی، مایع و قرص

میزان خطر در مصرف اضافی: کم

زمان و دفعات مصرف: ۱-۲ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۱-۴ ساعت اثر می کند و تا ۲۴ ساعت در
بدن فعال است.

نحوه نگهداری از دارو: دارو در ظرف دربسته، جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت بروز عوارض شدید، مصرف آن را بدون اجازه پزشک متوقف نکنید - در صورت بروز علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، به پزشک اطلاع دهید -

صرف آن در رانندگی و کارهای حساس اشکالی ندارد - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی، انواع بیماری‌های خونی و پورفیری هستید یا از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بلندمدت آن می‌تواند باعث کمبود اسیدفولیک و در نتیجه ناهنجاری‌های خونی شود.

عوارض ناخواسته: مصرف این دارو به تنها یی، عارضه چندانی جز تهوع ندارد اما در صورت مصرف با سولفامتوکسازول عوارض بیشتری ایجاد می‌کند.

تداخل‌های دارویی: مصرف هم‌زمان با فنی‌توئین خطر کمبود اسیدفولیک را افزایش داده، منجر به بیماری‌های خونی می‌شود - این دارو اثر ضدانعقادی وارفارین و نیز خطر آسیب‌های کلیوی به وسیله سیکلوسپورین را هم افزایش می‌دهد.

صرف در شیردهی و بارداری: بی‌ضرر بودن دارو در بارداری به اثبات نرسیده و در شیردهی مصرف مقادیر معمولی اشکالی ایجاد نمی‌کند. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Triple Sulfa

تریپل سولفا

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک، سولفانامید
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص واژینال و کرم واژینال

مقدار و روش مصرف: ۵۰۰ واژینال : یک اپلیکاتور پر، دو بار در روز قبل از خواب و بعد از بیداری به مدت ۶ - ۴ روز. قرص واژینال : یک قرص واژینال دو بار در روز قبل از خواب و بعد از بیداری به مدت ۱۰ روز

موارد عمده استعمال دارو: درمان التهاب ولۇواژینال (دستگاه تناسلی خارجی و واژن در زن) در اثر کاندیدا، تریکومونا و هموفیلوس .

عوارض جانبی مهم: خارش، سوزش، دانه‌های پوستی، قرمزی و تورم .

Vancomycin HCL

وانکومایسین

اشکال دارویی موجود در ایران: ویال تزریقی

گروه دارویی: ضدغفونت، آنتی‌بیوتیک

مقدار و روش مصرف : ۵۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت یا ۱ گرم هر ۱۲ ساعت به صورت انفوزیون وریدی طی ۹۰ - ۶۰ دقیقه

موارد عدم استعمال دارو : از راه تزریقی جهت درمان عفونت‌های خطربناکی که نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های دیگر حساس هستند یا به آن‌ها پاسخ نمی‌دهند یا نسبت به آن‌ها مقاوم هستند.

عوارض جانبی مهم : سمیت گوشی و کلیوی، حساسیت مفرط به دارو، درد شدید در محل تزریق، افت فشار، برافروختگی و دانه‌های پوستی.

Verapamil وراپامیل

گروه دارویی : ضدآثرین، ضدفسارخون، ضدآریتمی قلبی

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط نیاز به تجویز پزشک: دارد

اشکال دارویی موجود : قرص، مایع، تزریقی، قرص‌های کندآزادشونده و کپسول‌های کندآزادشونده

زمان و دفعات مصرف : قرص و مایع ۲-۳ بار در روز

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : قرص در ۱-۲ ساعت و تزریقی در ۳-۲ دقیقه اثر می‌کند و ۶-۸ ساعت در بدن فعال است.

رزیم غذایی مناسب : از مصرف عصاره گریپ‌فروت خودداری شود، زیرا باعث بالا رفتن سطح خونی وراپامیل می‌شود.

موارد منع مصرف و احتیاط : بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - در صورت مشاهده علایم غیرعادی یا مصرف مقدار زیادی از این دارو، پزشک را باخبر کنید - تا از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید، چون می‌تواند باعث سرگیجه شود - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و پورفیری هستید و در صورتی که از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید، پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف آن در بلندمدت مشکلی ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته : تهوع، بیوست، سردرد، ورم مج پا، گرگرفتگی و سرگیجه.

داخل‌های دارویی : اثر جانبی کاربامازپین به وسیله این دارو تشدید می‌شود - این دارو باعث افزایش غلظت خونی سیکلوسپورین و افزایش آثار دیگوکسین می‌شود - همراه با بتابلوکرها باعث ضربان غیرطبیعی قلب و نارسایی قلبی می‌شود - در صورت مصرف همزمان وراپامیل با ضدفسارخون‌های دیگر، فشارخون هرچه بیشتر کاهش می‌یابد.

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود. در شیردهی مصرف مقدار کم آن اشکالی ندارد. در هر دو مورد با پزشک مشورت کنید.

Vasopressin وازوپرسین

گروه دارویی: ضد ادرار، هورمون هیپوفیز خلفی
اشکال دارویی موجود در ایران: تزریقی
مقدار و روش مصرف: جهت دیابت بی‌مزه: ۱۰ - ۵ واحد از محلول آبکی از راه عضلانی یا زیر جلدی ۴ - ۲ بار در روز و یا ۲/۵ - ۱/۲۵ واحد از محلول رونگی هر ۳ - ۲ روز یک بار
موارد عمده استعمال دارو: درمان دیابت بی‌مزه و از بین بردن سایه‌های گاز در رادیوگرافی شکم.
عوارض جانبی مهم: کهیر، رنگ پریدگی اطراف دهان و لب، آروغ زدن، سردرد کوبنده، مسمومیت با آب، ایست قلبی و انفارکتوس میوکارد (MI).

Vitamin A ویتامین - آ (رتنیول)

گروه دارویی: ویتامین A، ویتامین محلول در چربی
اشکال دارویی موجود در ایران: کپسول یا قرص پوشش‌دار جویدنی، قرص یا کپسول معمولی، محلول تزریقی، قطره خوراکی و پماد چشمی
مقدار و روش مصرف: در کمبود شدید این ویتامین: در ابتدا ۵۰۰/۰۰۰ واحد از راه خوراکی به مدت ۳ روز، سپس ۵۰/۰۰۰ واحد به مدت دو هفته و بعد از آن ۲۰ - ۱۰ هزار واحد در هر روز، به مدت دو ماه. **مکمل غذایی:** روزانه ۸ هزار واحد تجویز می‌شود. **شکل موضعی دارو (پماد چشمی):** یک سانتی‌متر از پماد، ۳ - ۲ بار در روز روی چشم مالیده شود.

موارد عمده استعمال دارو: کمبود ویتامین A - مکمل غذایی در شرایطی مثل بارداری، شیردهی و ابتلا به عفونت‌ها درمان جایگزین در بیماری‌هایی که روی جذب و ذخیره این ویتامین اثر می‌گذارند مثل انسداد شدید صفوایی، برداشت کامل معده و سیروز کبدی - درمان اختلالات پوستی - درمان عوارض چشمی کمبود ویتامین A مثل زخم‌های قرنیه.

عوارض جانبی مهم: تحریک پذیری، سردرد، افزایش فشار داخل جمجمه، بی‌اشتهاایی، ناخوشی، ناراحتی شکمی، درد مفاصل (به صورت مهاجر)، تأخیر در رشد، التهاب لثه، یرقان و مرگ بعد از مصرف وریدی.

Vitamin A + D ویتامین آ + د

گروه دارویی: ویتامین محلول در چربی
اشکال دارویی موجود در ایران: پماد موضعی و قطره خوراکی

مقدار و روش مصرف : پماد را به مقدار لازم روی موضع بمالید و در صورت نیاز موضع را پانسمان کنید ، **قطله** : روزانه یک میلی لیتر (یک قطره چکان پُر) به شیرخوار یا کودک خورانده شود **موارد عمدۀ استعمال دارو :** تسکین درد ناشی از سوختگی‌های خفیف ، تسکین تحریکات پوستی ناشی از ادرار سوختگی نوزادان ، قطره ویتامین A + D به عنوان مکمل ویتامین در رژیم غذایی نوزادان شیرخوار و کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد .

Vitamin B₆ (Pyridoxin) ویتامین B₆

گروه دارویی : ویتامین گروه B
اشکال دارویی موجود در ایران : قرص و آمپول
مقدار و روش مصرف : به عنوان مکمل غذایی : روزانه ۲۰ - ۱۰ میلی گرم به مدت ۳ هفته و سپس چند هفته دیگر استفاده از مولتی ویتامین‌هایی که حاوی ۵ - ۲ میلی گرم از این ویتامین در مصرف روزانه هستند . همراه با داروی ایزوونیازید : ۱۰۰ میلی گرم روزانه ، به مدت سه هفته و سپس ۵۰ میلی گرم در روز
موارد عمدۀ استعمال دارو : کمبود ویتامین B₆ به علل مختلف .
عوارض جانبی مهم : تهوع ، سردرد ، خواب آلودگی ، کاهش میزان اسید فولیک و سوزش و درد در محل تزریق عضلانی یا زیر جلدی .

Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin) ویتامین B₁₂

گروه دارویی : ویتامین گروه B
اشکال دارویی موجود در ایران : آمپول
مقدار و روش مصرف : روزانه ۳۰ میکروگرم به صورت زیرجلدی یا داخل عضلانی به مدت ۱۰ - ۵ روز ، سپس ۲۰۰ - ۱۰۰ میکروگرم یک بار در ماه به صورت عضلانی
موارد عمدۀ استعمال دارو : کمبود ویتامین B₁₂ در اثر سوء تغذیه ، کمبود ویتامین B₁₂ در اثر سوء جذب ، افزایش نیاز به این ویتامین در هنگام بارداری ، تیروتوکسیکوز ، کم خونی همولیتیک ، خونریزی ، بیماری کبد و کلیه .
عوارض جانبی مهم : اسهال گذرا ، خارش ، خیز (ادم) ، نارسایی قلبی ، شوک آنافیلاکتیک و ترومبوز رگ‌های محیطی .

Vitamin E ویتامین ای

گروه دارویی : ویتامین

اشکال دارویی موجود در ایران: قرص پوشش دار، تزریقی و قطره خوراکی
مقدار و روش مصرف: مهت کمبود ویتامین E: روزانه ۷۵ - ۶۰ واحد از راه خوراکی یا عضلانی. مهت
 پیشگیری از کمبود ویتامین E: روزانه ۱۵ - ۱۲ واحد از راه خوراکی
موارد عمده استعمال دارو: پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین E، به عنوان یک ماده
 آنتی اکسیدان از سلول‌ها در مقابل رادیکال‌های آزاد و از گلبول‌ها قرمز در مقابل همولیز محافظت می‌کند.
عوارض جانبی مهم: در صورت مصرف زیاد و بلندمدت می‌تواند باعث عوارضی مثل سردرد، تاری
 دید، اختلال فعالیت غدد جنسی، ترومبوفیلیت، خستگی، تهوع و اسهال شود.

Vitamin K₁ (فیتوفنادیون)

گروه دارویی: شکل مصنوعی ویتامین K، آنتی دوت
اشکال دارویی موجود در ایران: قرص و آمپول
مقدار و روش مصرف: ۱۰ - ۲/۵ میلی‌گرم از راه خوراکی، عضلانی یا زیر جلدی
موارد عمده استعمال دارو: آنتی دوت مصرف زیاد داروهای ضدانعقادی، پیشگیری و درمان
 بیماری‌های خونریزی دهنده در نوزادان، کمبود ویتامین K.
عوارض جانبی مهم: سردرد، ناراحتی معده، ایست قلبی، شوک، سرگیجه، احساس طعم
 مخصوص، برافروختگی صورت و حساسیت شدید به دارو.

Warfarin وارفارین

نیاز به تجویز پزشک: دارد
اشکال دارویی موجود: قرص
میزان خطر در مصرف اضافی: بالا
زمان و دفعات مصرف: یک بار در روز و در ساعت ثابتی از روز
زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن: ظرف ۴۸ - ۲۴ ساعت اثر دارو شروع می‌شود و
 ۳ - ۲ روز در بدن فعال است.
نحوه نگهداری از دارو: دارو را در ظرف دربسته، در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس
 اطفال نگهداری کنید.
موارد منع مصرف و احتیاط: جز در صورت ایجاد تهوع، استفراغ، تب، مصرف آن را بدون اجازه
 پزشک متوقف نکنید - گرچه در همه موارد مصرف اضافی این دارو توجه جدی لازم است اما در

صورت خونریزی شدید یا کاهش هوشیاری ، اقدامات اورژانس لازم است — در رانندگی و کارهای حساس باید احتیاط کنید چون در افرادی که از این دارو استفاده می‌کنند یک ضربه کوچک می‌تواند باعث خونریزی شدید شود — اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی ، فشارخون بالا و زخم معده هستید یا اگر به آسانی دچار خونریزی می‌شوید و نیز در صورت استفاده از داروهای دیگر ، پزشک را در جریان قرار دهید — مصرف آن به صورت بلندمدت مشکلی ایجاد نمی‌کند.

عوارض ناخواسته : شایع‌ترین عارضه آن خونریزی است . عوارض دیگر عبارتند از شکم‌درد ، اسهال ، راش پوستی و ریزش موها .

تداخل‌های دارویی : طیف وسیعی از داروها مانند آسپیرین ، باریتورات‌ها ، ضدبارداری‌های خوراکی ، سایمتدین ، دیورتیک‌ها ، بعضی مسهل‌ها ، آنتی‌بیوتیک‌ها و ضدافسردگی‌ها می‌توانند با این دارو تداخل کنند و اثر خذانعقادی آن را کاهش یا افزایش دهند — در صورتی که این دارو را مصرف می‌کنید قبل از استفاده از داروهای بدون نسخه (OTC) با پزشک یا داروشناس مشورت کنید .

صرف در شیردهی و بارداری : در بارداری تجویز نمی‌شود و در شیردهی مقدار معمولی دارو اشکال ندارد اما با پزشک نیز مشورت کنید .

Zinc Oxide

زینک اکساید (اکسید روی)

گروه دارویی : محافظ و ضدعفونی کننده پوست

اشکال دارویی موجود در ایران : پماد موضعی

مقدار و روش مصرف : بر حسب نیاز ، روزانه چندین بار برابر روی ضایعات مالیده شود .

موارد عمده استعمال دارو : درمان بیماری‌ها و عفونت‌های پوستی مثل : سوختگی‌های خفیف ، اگزما ، زردخم ، زخم‌های واریسی ، خراشیدگی‌ها ، آکنه ولگاریس ، ادرار سوختگی و گزش حشرات .

Zinc Sulfate

زینک سولفات (سولفات روی)

گروه دارویی : مکمل غذایی ، ضدعفونی کننده پوست

اشکال دارویی موجود در ایران : کپسول ، بالک (Bulk)

مقدار و روش مصرف : به عنوان مکمل : ۱۱۰ - ۲۲۰ میلی‌گرم از راه خوراکی . در درمان بیماری

ویلسون : روزانه ۲۰۰ - ۱۳۵ میلی‌گرم از راه خوراکی

موارد عمده استعمال دارو : به عنوان مکمل در پیشگیری و درمان : کمبود روى ، روماتیسم مفصلی .
اکنه ، تاخیر در اتیام زخم در اثر کمبود روى و نیز بیماری ویلسون

Zopiclone**زوپیکلن**

نیاز به تجویز پزشک : دارد

گروه دارویی : داروی خوابآور

اشکال دارویی موجود : قرص

میزان خطر در مصرف اضافی : متوسط

زمان و دفعات مصرف : یک بار در روز (هنگام خواب)

زمان آغاز تأثیر دارو و مدت فعالیت آن در بدن : اثر آن ظرف ۳۰ دقیقه شروع می‌شود و ۴-۶ ساعت در بدن فعال است .

رژیم غذایی مناسب : دارو را در ظرف دربسته ، دور از نور و دسترس کودکان و در جای خشک و خنک نگهداری کنید .

موارد منع مصرف و احتیاط : در صورت مصرف بیش از یک هفته ، بدون اجازه پزشک مصرف آن را متوقف نکنید - مصرف مقدار زیادی از این دارو می‌تواند باعث طولانی شدن خواب ، خوابآلودگی ، کرختی ، هماهنگی ضعیف عضلات مختلف بدن و عارضه برگشت محتویات معده به روده (ریفلaks) شود که باید بی‌درنگ به پزشک اطلاع داده شود - تا زمانی که از اثرات آن بر روی خود مطلع نیستید ، از رانندگی و کارهای حساس دوری کنید چون می‌تواند باعث خوابآلودگی ، کندی عکس العمل و کاهش دقت و هوشیاری شود - اگر مبتلا به مشکلات بلندمدت کبدی یا کلیوی و میاستنی گراو هستید و نیز اگر سابقه اعیاد به الكل و داروهای دیگر دارید یا از داروهای دیگری نیز استفاده می‌کنید و نیز اگر سابقه تشنج ناشی از صرع دارید پزشک را در جریان قرار دهید - مصرف بیش از یک هفتة آن می‌تواند باعث وابستگی به این دارو شود .

عوارض ناخواسته : خوابآلودگی در روز ، سرگیجه ، ضعف ، تهوع ، اسهال ، اختلال در هماهنگی فعالیت‌های بدن و خوابآلودگی مقاوم .

تداخل‌های دارویی : داروهای دارای اثر آرامبخش مانند خدافتسردگی‌ها و خوابآورها ، اثر آرامبخشی این دارو را تشدید می‌کنند .

مصرف در شیردهی و بارداری : در بارداری و شیردهی تجویز نمی‌شود .

